



# తృణధాన్యములు

[రెండవ భాగము]

చిరుధాన్యములు

[జొన్న, గొర్రె. చోడి, భామ వగైరా]

కర్త

గోపీటీ ట్రోగిరాజు

సమీక్షకర్త

బొమ్మరంటి లక్ష్మీనరసింహమూర్తి, బి. యన్.సి. (అగ్రి.)

సహాయ చిరుధాన్య ప్రవీణులు, నంద్యాల

: ప్రకాశకులు :

ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ట్రస్టు

పటమట పోస్టు, కృష్ణాజిల్లా.

హాక్కులు  
ప్రకాశకులవి

రెండవ కూర్పు  
1,000 ప్రతులు

ఏప్రిల్, 1958

సర్వోదయ ట్రెస్  
పటమటలంగ

వెల  
రూ 3-0-0

## మనవి మాటలు

హృదయము శ్రీ గోపీజి శోగిరాజుగారు బీవాచి యున్నంతవరకు వారి గ్రంథప్రచురణ కార్యము మాకెక్కువ శ్రమగా తోచలేదు. కాని వారు దివంగతులైన పిదప మాపని చాల చిక్కుల పరిణమించినది. ఒక్క అచ్చువేయించు సనితప్ప మిగిలిన అన్ని బాధ్యతలను వారు స్వయముగ నిర్వహించుచు, వారివలన బదుగవలసిన సమలను ఆలస్యము లేకుండ పూర్తిచేయుచు, యెప్పటికీ పప్పుడు మాకు కావలసిన సమాచారమును, సాధనములను అందించుచు, ఈ పనిలో యెంతో శ్రద్ధను చూపుచుండెడివారు.

శ్రీ బొమ్మకంటి లక్ష్మీనరసింహమూర్తిగారు తమ ఉచ్యోగ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూ, ఎట్లో తీరిక చేసుకొని, మేము కోరినంతనే ఈ గ్రంథమును సాకల్యముగ పరిశీలించి, పరిష్కరించి ముద్రించుటయేగాక, పుస్తకం అచ్చైన పిమ్మట సవరణల సట్టికను తయారుచేయుటలోకూడ మాకు ప్రేమతో తోడ్పడినారు. ఆఖరు క్షణములో మేము లేఖ వ్రాయుట తోడనే ఆవరములో పీఠికను కూడ వ్రాసి పంపినారు. వీరి సహాయంతో ఎట్లో యీ గ్రంథము అచ్చుపని నిష్పాదించి పూర్తిచేయుటకవకాశము చిక్కినది. కనుక మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతను వీరికి ముందుగ తెలుపుట విధిగ నెంచుచున్నాము.

రైతుబిడ్డగా జన్మించుటయేగాక రైతు సేవకు జీవితమునంతయుచేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ శాఖామంత్రియైన శ్రీ పెద్దిరెడ్డి తిమ్మారెడ్డిగారు మా కోరికపై సమయం తీసుకొని యీ గ్రంథమును శ్రద్ధగా చదివి, అమూల్యమైన తమ అభిప్రాయమును పోలిపలుకు రూపంలో మాకు ప్రసాదించుట మా భాగ్యముగ నెంచుచున్నాము. అవ్యాజ్యమైన వారి అభిమానమును మేము సదా గౌరవముంచుకొందుము.

శ్రీ గోపీరాజుగారు ఆదేశించినారు ఈ గ్రంథములోని బొమ్మల బ్లాకులను, ఇతర సమాచారమును మాకందజేసిన మిత్రులు శ్రీ చెరుగువాడ



వెంకటరత్నం, శ్రీ దిట్టకవి వెంకట్రామయ్యగారు, తమకుగల అవకాశంలో శ్రద్ధతో యీ గ్రంథం అచ్చు, బైండింగు పనులను తీర్చిదిద్దిన సర్వోపయోగపేన్ కార్యకర్తలుకూడ మా కృతజ్ఞతకు పాత్రులగుచున్నారు.

కావలెనని యీ గ్రంథమునకు సమగ్రమైన సవరణల పట్టికను సిద్ధముచేసినాము. ప్రతి స్వల్ప దోషమును దీనిలో చేర్చుటచే యిది చాల దీర్ఘముగ తయారైనది. ఇకముందు మేము ప్రచురించు గ్రంథములలో అచ్చుతప్పులు హెచ్చుగ రాకుండ జాగ్రత్తపడుటచుకూడ యిది నోడ్డును నను ఆశతో దీనినివిధముగ తయారు చేసినాము. తెలుగు పుస్తకాల ముద్రణములో ప్రూవులు చదువుట పెద్ద సమస్యనున్నది. దీనికొకడు ప్రత్యేక సిబ్బంది యేర్పడిన తప్ప యీ పని చక్కగ జరుగుటకనకాదు.

“పండ్లు” 2, 3 భాగములు, “చెరుకు, యితర చక్కెర సుగంధ, పిష్ట ద్రవ్యములు” అం గ్రంథములు ప్రవీణుల సరిశీలనలో నున్నవి. సవరించిన ప్రతులు మారు చేరనే వీరి ప్రచురణకు పూరికొందును. ఇయ్యవిషయములలో ప్రవీణులైనవారి సహాయముతో, రెండెండ్ల బోపల వ్యవసాయ సంబంధంగా మేమింకా తెలువరించవలసిన శ్రీ బీరగిరాజుగారి 6 పుస్తకాలను ప్రచురించి, వారు ముచ్చటైన పాఠ్యములను వెబ్సైటులో నట్లుగ్రహించుటకై పరమేశ్వరుని ప్రార్థించుచున్నాము.

—ప్రకాశకులు

## తొలి పలుకు

ఈ గ్రంథం శ్రీ జోగిరాజుగారు తృణధాన్యములను గురించి వ్రాసిన సుస్తకములలో రెండవభాగం.

వ్యవసాయరంగంలో శ్రీ జోగిరాజుగారి పేరు ఆంధ్ర దేశంలోనేగాక భారతదేశంలోని వ్యవసాయము - శాస్త్రీయ విధానములలో సంబంధమున్నవారిందరికీ తెలిసినదే. శ్రీ జోగిరాజుగారు ఉద్యోగం చేసినప్పుడు, ఉద్యోగంనుండి విరమించిన తరువాతకూడా తమజీవితాన్ని పూర్తిగా వ్యవసాయ శాస్త్ర పరిశోధనలోనే వినియోగించిరి.

శాస్త్రీయ పరిశోధనలనుగురించి అనేకమంది నిపుణులు సనిచేస్తూనేయున్నారు. హాస్యంపెనగిన ఫలితాలను సాధిస్తూ వున్నారు. కాని, శాస్త్రీయవిజ్ఞానాన్ని ఆచరింతు యోగ్యంగా మేళవించి ప్రజల కందచేసినవారు బహుకొద్దిమంది. వారిలో ప్రథమస్థానం శ్రీ జోగిరాజుగారిది.

ఎంతోకాలమునుండి వ్యవసాయముపై పరిశోధనలు జరుగుతున్నప్పటికీ, వీటిఫలితాలు పూర్తిగా ప్రజల కందుట లేదు. అప్పుడప్పుడు కరపత్రాలద్వారా కొంత ప్రచారం జరిగినా, అది ఏ ఒక ప్రాంతానికో, ఒకరకపు విత్తనానికో సంబంధించినదేగాని, అన్ని ప్రాంతాలకు, అన్ని ఋతువులకు, అన్నిరకముల పంటలకు సంబంధించి జరుగలేదు.

ఈగ్రంథంలో శ్రీ జోగిరాజుగారు జొన్న, సజ్జ, రాగి, కొర్ర, ఆరికె మొదలగు గట్టిధాన్యములను గురించి చాల వివరముగా వ్రాసినారు. వీటికి చిరుధాన్యములని నామకరణము చేసినారు. వ్యవసాయ విషయములనుగురించి ఒకేపైరు విత్తు

టలో, చల్లుటలో, నాటుటలోగల ఫలితాలను, కడకు వ్యవసాయాని కుపయోగపడు పనిముట్లను గురించికూడ విశదపరిచినారు. వ్యవసాయంతో ప్రత్యక్ష సంబంధం లేనివారుగూడ వ్యవసాయాన్ని గురించి తెలుసుకొనుటకు, శ్రీ జోగిరాజు గారి గ్రంథాలు చక్కగా ఉపయోగపడును. చిరుధాన్యముల సేద్యములో వివిధప్రాంతములలో అమలుజోనున్న విధానములన్నింటిని వీరు సవిస్తరిముగ దెలిపినారు.

ఆంధ్రదేశంలో వరిపైను పట్టుసాగు 20 తాలూకాలకు మట్టుకే ఎక్కువగా సంబంధించినది. మిగిలిన 160 తాలూకానున్న తాలూకాలలో మెట్టుపైను ప్రధానము. అలాంటి పరిస్థితులలో ఈ పుస్తకం మెట్టుప్రాంతాల ప్రజలకు చాలా ఉపయోగించగలదు. ఈపుస్తకాన్ని పాఠ్యగ్రంథంగా స్పృహితులగుతూనే యేర్పాటుచేసిన బోధకులుగలరు. ఇంతేకాదు, దీనిని ప్రతిగ్రంథాలయంలోనూ విభిన్న ముద్రాపత్రములతో ప్రచురిస్తూ ప్రాంతాలవారికి ప్రత్యేకం సహాయం చేసినవారొక్కరైనారు. ప్రభుత్వంకూడ వ్యవసాయోద్యోగులద్వారా ఈ పుస్తకంతో పాటు శ్రీ జోగిరాజుగారి గ్రంథాలన్నింటినీ ప్రచురించు కంద శేయుట మంచిది.

వ్యవసాయముతో కొద్దిగాసంబంధముండి ప్రజాసేవలో నున్న నామట్టుకునేను ఈపుస్తకమువల్ల ఎంతో విజ్ఞానాన్ని సేకరించుకొగలిగినానని గట్టిగా చెప్పగలను.

నేడు వ్యవసాయాన్ని గూర్చి తెలియజేసిన అభిమానం దీనికి చాలా అవసరం. అందువల్ల వ్యవసాయంతో సంబంధం

తేనివారుగూడ శ్రీ జోగిరాజుగారి పుస్తకాలను చదువవలసినదిగ కోరుచున్నాను.

మిత్రులు శ్రీ పాతూరి నాగభూషణంగారి సేవ మొదటినుండి అన్ని వర్గాలకు ఉపయోగపడునట్టిదిగ నున్నది. శ్రీ జోగిరాజుగారి పుస్తకాల ప్రచురణ కార్యంలో వీరు ప్రత్యేకం శ్రద్ధవహించి పనిచేస్తున్నారు. ఈగ్రంథం ప్రచురణ ద్వారా వీరు వెనుకబడిన మెట్టప్రాంతాల ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా సేవచేసినవారవుతున్నారు. దీనికి తొలిపలుకు వ్రాయవలసినదిగ నన్నుకోరి వారిపేరుతో నాపేరును జతపరచుకునే అనకాశం కలుగజేసినందుకు శ్రీ నాగభూషణంగారికి, యీగ్రంథ ప్రకాశకులగు ఆంధ్ర గ్రంథాలనుట్రస్తువారికి నాకృతజ్ఞతాభివందనములు.

హైదరాబాదు }  
19-4-1958 }

పెద్దిరెడ్డి తిమ్మారెడ్డి  
ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయశాఖామిత్రులు

## పీఠిక

దేశభిక్షునికి పరిశ్రమ కేంద్రములు కీలక స్థానములు. అట్టి పరిశ్రమలు వృద్ధిచెందవలెనని భారత దేశానికి ఆయువుపట్టుగాన వ్యవసాయం వృద్ధిచెందవలెను. వ్యవసాయము ప్రపంచముగా కొనసాగించినగాని పరిశ్రమలకు కావలసిన ముడి పదార్థములు లభించవు ఇందుకు ఒక చక్కని ఉదాహరణ: చిరుధాన్యములలో కెల్ల దొడ్లనీ, వ్యాపిని, ఉపయోగము నకును అగ్రస్థానము వహించిన బొన్న - అమెరికాలో ఎన్నో పరిశ్రమలకు ముడి పదార్థముగా ఉపయోగపడుచున్నది. ఒక్క బొన్ననుండి పిండి, చీరు, ఆల్కహాల్, మాట్లా, టెలిఫోన్లు, సగ్గువిద్యుదు, స్టూటీన్ పదార్థములు, మ్యూజైక్ ఎంటర్టెన్మెంట్, సీరింగు మైనము, పాలిఫిల్, యింకా ఎన్నో పదార్థములు తయారు చేస్తున్నారు. అందుచేతనే దేశ భూభిక్షునికి వ్యవసాయము పట్టించుకొన్నాడు అట్టి వ్యవసాయమును సవ్యమైన నవీన శాస్త్ర విజ్ఞాన అనుభవముల దృష్టితో కొనసాగించినగాని దేశ సౌభాగ్యమునకు వెన్నెముక అయిన రైతుకు గిట్టుబాటుకాదు. అందుకు మంచి అభివృద్ధికరమైన వ్యవసాయక దృక్పథం, ఎన్నడూ తరుగని వ్యవసాయ ఉత్పత్తి పెరుగుదలలున్నప్పుడు దేశభివృద్ధి కంటుపడకుండా, సిరి సంపదలతో శోభాయమానంగా తులతూగి, సందనవనంలాగ తయారయ్యే అవకాశము గలదు. ఏదేశ చరిత్ర తిలకించినను యిది షరతు సర్వంగా గోచరిస్తున్నది. కాబట్టి భారత దేశభివృద్ధికి మూలకందమైన వ్యవసాయాభివృద్ధి యితోధికంగా జరుగుటకు వ్యవసాయశాస్త్ర విజ్ఞానం పెంపొందించి, వినూత్న అనుభవాలను రైతు లోకానికి అందజేసి రైతులలో నూతన ప్రాణవ్యయం కలుగజేసి, ఆధునికంగా అభివృద్ధి చేయవలెనని సమర్థతతో కీ॥ శే॥ జోగిరాజు పంతులుగారు సమగ్రంగా అనేకమైన వ్యవసాయ శాస్త్ర సంబంధపు గ్రంథములను సులభ గ్రాహ్యంగా తెలుగుభాషలో వ్రాసి, ఆంధ్ర రైతాంగానికి మరువరాని సేవచేసిరి. పూజ్యులు శ్రీ జోగిరాజుగారు చేసిన యీ సేవ ఎంతో ప్రశంస నీయమైనది.

పై గ్రంథముల మొదటి ప్రచురణకును, ద్వితీయ ముద్రణలకు మధ్య కాలవాహినిలో, శాస్త్రవిజ్ఞానం శరణేంద్రంతో పురోగమిస్తున్న యీ రోజులలో, వ్యవసాయ రంగములో కూడ అనేకమైన నూతనాంశములు, మేలుగకపు వంగడములు కనిపెట్టిబడినవి. అందుచే ఊ|| శ్రీ|| శ్రీగోరాజుగారి గ్రంథములు ఒక్కొక్కటే నవీన శాస్త్ర విషయములను చేర్చి సవరించ వలసిన ఆవశ్యకత కలిగినది. ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ట్రస్టువారు తృణధాన్యములు—రెండవ భాగము సవరించవలసినదిగా నన్ను కోరుటవల్ల, ఆ గ్రంథములో తగుమాది మార్పులు చేసితిని. ముఖ్యముగా నూతన సరిశోధనాంశములు, మేలుగకపు వంగడములు— వాటి విశేషములు, చీడ పీడల నివారించుటలో అధునాతన పద్ధతులు, కాలాపరణ్యముగ వ్యవసాయక ఆర్థిక విషయములు చేర్చి సవరించితిని. ఈ సవరకాళయగు కలిగించిన ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ట్రస్టువారికి నేనీ ఎంతో కృతజ్ఞుడను.

వ్యవసాయ పరిశోధన  
స్థానము, సంద్యాల  
26-4-1958

గాంధీకాంక్షి లక్ష్మీనరసింహమూర్తి  
పరిపూర్ణ

## మొదటి కూర్పు

### పీఠిక

సుమారు రెండు సంవత్సరముల క్రిందట ప్రచురింపబడిన తృణధాన్యము లను గురించిన మొదటిభాగమున సాంధ్యదేశపు ప్రధానాహారపు ధాన్యమును వర్ణించుచు సవిస్తరముగ దెలుపబడెను. కాని ఆంధ్రదేశమున పుష్కలముగ నీటివసతిగల కృష్ణా, గోదావరి డెల్టాలలోను యే? కాల్వలు గాని పెద్ద చెరువులుగానిగల కొన్ని యితరప్రదేశములందును మాత్రమే వరిసాగు నమృతముగ జేయ వీలగుటచే తెలుగుజిల్లాలలో తృణధాన్యజాతుల సాగుగల మొత్తపు విస్తీర్ణమున నీ వరిసాగు సుమారు రెండు వంతుల వై మాత్రమే గలదు. తక్కిన రెండు వంతుల భూమిపైను చాలవరకు స్పృహ రమునగాని నూతులు మొదలగు అల్ప జలాధారముల క్రిందగాని సాగు చేయ వీలగు జొన్న, చోడి మొదలగు చిరుధాన్యములే సాగుచేయుటకు చున్నవి.

కేవలము వరియన్నమునే దినుటకంటె రెండు వంతులు వరి యన్నముతోపాటు ఒక వంతు చిరుధాన్య జాతులను గూడ యే రూపముగ నైనను నాహారముగ నుపయోగించుట ఆరోగ్యప్రదమని శాస్త్రజ్ఞులు నిర్ధారణ చేసిరి. ప్రస్తుత మహాసంగ్రామపు విషమ పరిస్థితులలో వరిబియ్యము వలసినన్ని దొరకకపోవుటచే నప్పుడప్పుడు నీవలే కాక సామంతులు గూడ నీ చిరుధాన్యములను గొంతవరకాహారముగ దీనికొనవలసిన యావశ్యత గలుగుచున్నది. కావున నీ తరగతి తృణధాన్యజాతుల స్వభావమును గూర్చియు, నేవ్యమును గూర్చియు, ఆహార యోగ్యతను గూర్చియు దెలుపు నీ గ్రంథము వ్యవసాయదారులకే కాక గొంతవరకు ప్రజాసామాన్యమునకు గూడ ఉపయుక్తముగ నుండవచ్చును.

చిరుధాన్య జాతులను గూర్చిన యన్వేషణలను జేయుటకు కోయంబత్తూరు నందలి కేంద్ర వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానమున నొక ప్రత్యేక

### XIII

కాఖగలదు. ఈ గ్రంథమున దెలుపబడిన శాస్త్రీయ విషయములు చాలవరకు జరిగిన పరిశోధనా ఫలితములే. ఆయా జాతుల సేవ్యముగు గురించిన యంశములు కొంతవరకు హగరి, నంద్యాల, గుంటూరు, అనకాపల్లి మొదలగు జిల్లా వ్యవసాయ పరిశోధనాస్థానములందలి యగుభవమువైపున, చాలవరకు ఆయా ప్రాంతములందలి వ్యవసాయదారుల యొక్కయు, లేకరి యొక్కయు స్వాగుభవము వైపున నాధారపడియున్నవి.

ఈ గ్రంథముగు రచించుటకు గోష్ఠపడిన పుస్తకములును, వ్యాసములును 2 వ యుబంధమున \* బేర్కొనబడినవి. మూలమున నచటచట పంక్తులలో గొంచె మెగుడగ గాననగు జిన్నయంకెలవట దెలుపబడిన విషయమున కాధారమును గ్రంథపు లేక వ్యాసపు వరుస సంఖ్యను నూచించును.

స్వయంపోషక కృష్యాశ్రమము  
కొండెవరము  
14-3-44

గో టే టి జో గి రా జు  
గ్రంథకర్త

---

\* ఈ కూర్పులోనివి 3 వ యుబంధమున నీయబడినవి.



# విషయ సూచిక

## 1. చిరుధాన్యములు వగైరా 1-3

వాని ముఖ్య లక్షణములు - ఆహారయోగ్యమగు మరియు తృణ ధాన్యములు.

## 2. జొన్న 4-86

చరిత్ర, వ్యాపకము - ఆచూ రాష్ట్రములందరి విస్తీర్ణము - తెలుగు జిల్లాలలో విస్తీర్ణము - జొన్న మొక్క లక్షణములు - పేర్లు - కాండము - ఆకులు - పెన్న - పూవు - గింజ - జొన్నరకములు - వాని లక్షణభేదములు, వర్గీకరణము - సుషుముల స్వభావము నగుచున్నది - సాగు చేయుచున్నది - సాగుచేయుచున్నది - శీతోష్ణాది ప్రతిగతులు. సాగుచేయు ద్వారా - ఉష్ణత - వర్షము - పునాసపంట - పెద్దపంట - పసుకపంట - నేలము - కృష్ణరేపకము - ఎర్రనేలము - వాని యగుటలగా ప్రసిద్ధిచెందు - పరివర్తనము, మిశ్రణములు - సబ్బనేలలలో - ఎర్రనేలలలో - వైరుచేయువిధానములు - వర్షాధారమున నీరుపెట్టి - మలకపంట - సాగు - సబ్బనేలలలో - ఎర్రనేలలలో - ఎరువు వేయుట - సాధక బాధకములు - పసుపుల యెరువు - మేకలగు, గొర్రెలగు మగద కట్టుట - పూడ్చుట - తెలపిమ్ములు వగైరా - విత్తుట లేక నాటుట - గొరుతో - ప్రత్యేకముగా - మిశ్రణముగా - పెండ్లి - నాగు పెంచి నాగిటిచాలున వేయుట - నీరుపెట్టి నాటుట - ఉత్తరకృష్ణ - పాపటము తోలుట - గొప్పశ్రవ్యుట - నీరు కట్టుట - కట్టదగిన నీటిపరిమితి - దాని మంచిచెడ్డలు - ముఖ్యాగ్రిష్టములు - పిట్టలు, చీడలు - పీకపురుగు - నేలమిడుత - అగ్గిపురుగు - పిండిపురుగు - తవుటిపురుగు - తెగుళ్ళు - బోడు - కాలుక తేగులు - తామ్రోగము - చారతెగులు - కోత, కైలు - పెన్నల కోత - దంటుకోత - నూర్చిడి - ఎరురబోత - గింజలగు నిల్వచేయు విధాన

ములు-సాతెరనేముటు-ఇతరవిధానములు-విస్త్రులను జాగ్రత్త పెట్టుట-  
ఆదాయవ్యయములు - తొలకరి పంటకు - పయగి పంటకు-  
గొర్రుతో విస్త్రుతో - పెద్ద పల్లవో - నాగటి చూచిన నారువేతకు-  
గింజలయుపయోగము- సంఘట్టనము - ఆహారయోగ్యత -  
దంటుయొక్క ఉపయోగము-ఆహారయోగ్యత.

### 3. గంటె లేక సజ్జ

87-117

చరిత్ర, వ్యాపకము- ఆయా దేశములందు - ఆయా రాష్ట్రము  
లందు-ఆయా తెలుగు జిల్లాలలో - నీరు పెట్టి సాగుచేయు విస్తీర్ణము  
పంట పరిమితి- గంటెయొక్క సామాన్య లక్షణములు,  
రక భేదములు- వేళ్లు- కాండము-అకులు-వెన్ను-పూవు-గింజలు-  
అంభోదేశపు రకములు - ఎంపుడు కంగడములు - గంటెకు దగిన  
పరిస్థితులు - సాగుచేయు కాలము-సేలలు- సేవ్యవిధానము -  
పరివర్తనములు - ముత్రణములు - విస్త్రుట - గొర్రుతో - పెద్దపల్లవో-  
నారువెంచి నాగటి చూచిన వేముటు - నీరుకట్టి సాగుచేయుట -  
దుక్కి - ఎంపువేయుట - ఇల్లగిన విస్త్రుల పరిమితి - నారువేయు  
విధానము- ఉత్పాదక- గొండ్లప్రస్థుట- అరిష్టములు- చీడలు-  
తెగుళ్ళు- కోత, కైలు-ఆదాయవ్యయములు-ఆయా పద్ధతులలో-  
గంటెల యుపయోగము- సంఘట్టనము - ఆహారయోగ్యత -  
దంటుయొక్క ఉపయోగము.

### 4. చోడి లేక తమిద

118-152

చరిత్ర, వ్యాపకము- చెన్నరాజధానిలోని విస్తీర్ణము - నీరుకట్టి  
సాగుచేయు పరిమితి- చోడి మొక్క లక్షణములు,  
రక భేదములు- వేళ్లు - కాండము - అకులు - వెన్ను - పూవు-  
గింజలు- రక భేదములు- వెన్ను పైభాగము - గింజల గంగులు -  
సాగునకు దగిన కాలమునుబట్టి - సాగుచేయు విధానమునుబట్టి -

## XVI

మేలయిన చోడి వంగడములు - అనకాపల్లి త్రేత్రమున నెంచి  
 తీయబడినవి - కోయబడ్డాయి త్రేత్రమున నెంచి తీయబడినవి-  
 చోడి సాగునకు దగిన పరిస్థితులు - సాగునకుదగిన కాల  
 ములు - నేలలు - సేవ్యవిధానము-పరివర్తనము - మిశ్రణములు-  
 ముక్క - ఎరువు నేనుట - పత్తుట - గొర్రుతో - పెరుట్లుట -  
 నారుపెంచుట - గాటుట - ఉత్తిగక్కి - గొప్పత్రవుట - పైన  
 యెరువు చల్లుట - నీరకట్టుట - అరిష్టములు- చీడలు- తెగుగ్గు-  
 కోతి, కైలు- పెన్నెను ముక్కినిచ్చుట- నూర్పిడి- ఎగురునోతి-  
 ఆదాయవ్యయములు - ఆయా విధానములలో -  
 చోళ్ళ యుపయోగము - సగుప్తనము - ఆహారయోగ్యత -  
 దంటుయొక్క గణాంత.

### 5. కొర్ర

153-170

చరిత్ర, వ్యాపకము-చెన్నగొ ధాని మగదాని విస్తీర్ణము - కొర్ర  
 తెలుగుజిల్లాలలోని విస్తీర్ణము- కొర్ర మొక్క సామాన్య లక్ష  
 ణములు, రకభేదములు- వంగడములు- సేవ్యము నకు  
 దగిన పరిస్థితులు, సేవ్య విధానము -  
 సాగు జేయదగిన కాలము - నేలల - పరివర్తనము - మిశ్రణములు -  
 సాగు - విత్తుట - ఆంతరక్కి - అరిష్టములు - కోతి, కైలు -  
 అదాయవ్యయములు, ఉపయోగము, ఆహారయోగ్యత.

### 6. నక్కకొర్ర

171-173

చరిత్ర, వ్యాపకము - మొక్కయొక్క లక్షణములు-  
 నక్కకొర్ర పెరుగు పరిస్థితులు - సేవ్యవిధానము - గింజల  
 యొక్కయు, దంటుయొక్కయు ఉపయోగము.

7. ఆరిక

174-186

చరిత్ర, వ్యాపకము- చెన్నరాష్ట్రమునందు విస్తీర్ణము- ఆయా తెలుగు జిల్లాలలోని విస్తీర్ణము- ఆరికమొక్క లక్షణములు, రకభేదములు-ఆరికకుదగిన పరిస్థితులు, సేవ్యవిధానము- పిత్తుటకు దగిన కాలము - సేలలు - పరివర్తనము - మిశ్రణములు - సాగు- విస్తృత - అంతరకృషి - అరిష్టములు - కోత, కైలు - ఆదాయవ్యయములు - గింజలయొక్కయు, గడ్డియొక్కయు ఉపయోగము.

8. చామ

187-199

చరిత్ర, వ్యాపకము- చెన్నరాష్ట్రమునందు విస్తీర్ణము - తెలుగు జిల్లాలలోని విస్తీర్ణము- చామయొక్క సామాన్య లక్షణములు, రకభేదములు- చామకుదగిన పరిస్థితులు, సేవ్య విధానము- తగిన సేలలు- కాలము- పరివర్తనము- మిశ్రణములు- సాగు- విస్తృత- ఉత్తరకృషి- అరిష్టములు- కోత, కైలు- వగైరా- ఆదాయవ్యయములు- గింజల యావరయోగ్యత- గడ్డియొక్కయు ఉపయోగము.

9. వరిగ లేక బరిగ

200-211

చరిత్ర, వ్యాపకము- వరిగమొక్క సామాన్య లక్షణములు - వరిగకుదగిన పరిస్థితులు, సేవ్యవిధానము - సాగుచేయుటకు దగిన కాలము- సేలలు- సాగు - విస్తృత- ఉత్తరకృషి- కోత, కైలు- ఆదాయవ్యయములు- గింజల ఆవరయోగ్యత- గడ్డియొక్కయు ఉపయోగము.

10. ఊద

212-220

చరిత్ర, వ్యాపకము- మొక్కయొక్క లక్షణములు-రకభేదములు - ఊదకుదగిన పరిస్థితులు, సేవ్యవిధానము -

## XVIII

విష్టుటకు దగిన కాలము - నేలలు - దుక్కి - విష్టుట - నారుపోసి  
నాటుట - కోత, కైలు - ఆదాయవ్యయములు - ఉపయోగము -  
గిరాలు - గడ్డి.

11. దొంగ 221-224

వ్యాపకము - లక్షణములు - సాగునకుదగిన పరిస్థితులు -  
సేవ్యవిధానము - ఉపయోగము.

12. గొలుగు లేక గొలినె 225-229

చరిత్ర, వ్యాపకము - ముక్కమొక్క లక్షణములు - గిరిల ఆహార  
గ్రామ్యుల - ఉపయోగించు విధము - సింహళమున - గిరిల యితర  
యుపయోగములు.

13. వెదురు 230-231

వెదురు బియ్యపు ఉపయోగము - సంఘట్టనము - ఆహారగ్రామ్యుల

1 వ అనుబంధము 232-240

- (1) అభివృద్ధికర బొన్న వంగడములు
- (2) అభివృద్ధికర స్వస్థ వంగడములు
- (3) అభివృద్ధికర రాగి (చోడి) వంగడములు
- (4) అభివృద్ధికర కొమ్మ వంగడములు
- (5) అభివృద్ధికర వరిగ వంగడములు

2 వ అనుబంధము 241-244

- A. చిరుధాన్యముల సంఘట్టనమును దెలుపు పట్టిక
- B. కొన్ని చిరుధాన్యములంబలి ఖనిజ ద్రవ్యములయు, విటమినుల  
యొక్కయు పరిమితిని దెలుపు పట్టిక.
- C. చిరుధాన్యజాతుల దంటుయొక్క సంఘట్టనమును దెలుపు పట్టిక.

3 వ అనుబంధము 245-248

చిరుధాన్యజాతులు వగైరాలను గురించిన సారస్వతము.

## పటముల పట్టిక

సంఖ్య	వివరము	పుట
1.	జొన్న మొక్క	9
2.	జొన్న ఆకునందలి తొడిమ- రేకు-ంధి	11
3.	జల్లి, రెల్ల లేక రింజవెన్ను (జొన్న)	13
4.	ముద్దవెన్ను (జొన్న)	"
5.	మిగుల రింజవెన్ను (జొన్న)	14
6.	జొన్న వెన్నునందలి యొక రెల్ల	"
7.	ఒక లేతపిల్ల రెల్ల	15
8.	ఒక యల్పకణిశమునందలి తుప బుసముల యాకార పరిమాణములు	"
9.	జొన్న పూవునందలి భాగములు	16
10.	నిడివి కాటుక తెగులు తగిలిన జొన్న వెన్ను	64
11.	గంట వెన్ను	92
12.	నక్కతోక తెగులుదగిలిన గంటవెన్ను	108
13.	చోడి దుబ్బు	122
14.	చోడి వెన్ను	123
15.	కొర్ర వెన్ను	156
16.	నక్కకొర్ర వెన్ను	172
17.	ఆరిక వెన్ను	177
18.	వరిగ వెన్ను	190
19.	చాను వెన్ను	203
20.	ఊద దుబ్బు	214
21.	దిసక వెన్ను	223
22.	గొలుగు వెన్ను	226

## సవరణల పట్టిక \*

క్రమ	పంక్తి	తప్పు	ఒప్పు
1	9, 10	Pennasetum typhoidium	Pennisetum typhoides
2	1	little	little
"	5	colona-Var	colona var.
"	17, 18	(ఇంగ్లీషు మాటలను బ్రాహ్మణ్యమున వ్రాసినవి)	
"	20	3-6 పుటలందు	3-8 పుటలందు
3	5	యెత్తు	ఎత్తు
4	1	Vulgara	or Sorghum vulgare
"	13	halipens	halepense
10	18	నైన	నైన
11	7	పొడవు	పొడవు
12	14	అల్పకణికములు	అల్పకణికములు
"	19	అల్పకణికము	అల్పకణికము
13	3 పటము		
"	శీర్షిక	మద్ద వెన్న	జల్లి, రెల్ల లేక రింజ వెన్న
"	4వ పటము		
"	శీర్షిక	జల్లి, రెల్ల లేక రింజ వెన్న	ముద్ద వెన్న
15	2, 3	కనురుగు బుసందును.	కనురుగు బుసందును.
"	7వ పటము	పిల్ల చెక్క	పిల్ల చెక్క
"	శీర్షికలో	2.	2, 2.
"	9, 10	మిత్రములుగను	మిత్రములుగను
"	16, 17	తుపము	తుపము
17	9	యందును.	యందును.

\* చదువరు లీ గ్రంథమును చదువ నారంభింపకముందే యీ పట్టికయందు సూచింపబడిన సవరణలను ఆ యా పుటలందు చేసికొన వచ్చును.

# XXI

పుట	పంక్తి	తపస్వ	ఒప్ప
18	1	స్వభావము	స్వభావము.
"	6	ఇట్టి	ఇట్టి
"	12	Cerauum	Cernuum
"	20	urghii	burghii
20	17	1. ఎర్రజొన్న	1. ఎర్రజొన్నలు
22	7	వంగి యుండును.	వంగి యుండును.
"	11	సంకడికిని	సంకటికిని
23	9	యెరుపు	ఎరుపు
24	4	ఆహార	ఆహార
25	2	గరుపనేలబండు	గరుపనేలబండు
"	12	గరుపనేలబలో	గరుపనేలలో
26	4	రింజ,	రింజ.
"	8	కొండపోళ్లలోను,	కొండపోళ్లలోను,
27	పుట శీర్షిక	జొన్నరకములు, వాని లక్షణ భేదములు, వర్గీక రణము	శీతోష్ణాది స్థితిగతులు- సాగునకుదగిన కాలము.
"	9	అనుబంధములో	1 వ అనుబంధములో
28	12	ఆంగుళముల	ఆంగుళముల
29	23	తరుచు	తరుచు
31		(పుట శీర్షిక సూక్ష్మ తీసివేయవలెను.)	
"	9	నిట్టి నేలలనుదుగ	నిట్టి నేల లరుదుగ
"	10	తేనును పట్టి యుంచు	తేనును పట్టియుంచు
32	6	కలిగియున్న గాని	కలిగియున్న గాని
"	18	(మఖ పుబ్బ కా ర్తై ల లోను	(మఖ, పుబ్బ కా ర్తై ల లోను)
34	3	పంటతో	పంటతో గాని
"	6	పరివర్తనముకంటె	పరివర్తనముకంటె
35	15	చోడి.	చోడి,



# XXII

పుట	పంక్తి	తప్పు	ఒప్పు
37	3	సారమును	సారమును
38	14	వీశస్సీ	వీశస్సీ
40	17	తొలకరితో	తొలకరితో
42	4	అట్లు	ఇట్లు
44	3	వగ	తక్కువగ
"	14	;32	,32
45	2	నేయుట యవసరము.	నేయుట వసరము.
46	చేబిల్ 2వ కలం (దంటు)	(కడపటి అంక 1168 గా చదువుకొనవలెను.)	
47	22	పరిస్థితులను	పరిస్థితు లను
49	"	తేలెను.	తేలెను. 14
50	20	కలిపి.	కలిపి నేయుదు.
51	5	కలిపి	కలిపి
52	12	(అరిగిపోయిన)	(అరిగిపోయిన)
54	4	పథ్యంతో	పథ్యంతో
"	5	సిద్ధము	సిద్ధము
55	3,4	మెట్లు గుంటక	మెట్లు గుంటక
56	1	44 వ పుటలో	42 వ పుటలో
"	22	వగు సలుగ	వగు సలుగ
57	5	నల్ల నేలలో	నల్ల నేలలో
58	11	చవకగుదున్నను	చవకగ నున్నను
"	16	నట్టివారు	నట్టివారు
59	9	(Chilo Sp)	(Chilo Sp.)
"	11	ఒక్కొక్కప్పుడేవి	ఒక్కొక్కప్పుడేవి
"	15	బాధను	బాధను
"	21	ఒక్కొక్కప్పుడు	ఒక్కొక్కప్పుడు
"	24	పొడుమును	పొడుమును

# XXIII

పుట	పంక్తి	తపస్	ఒపస్
60	10	బొన్న పిండి పురుగు	4. బొన్న పిండిపురుగు
"	14	బి. హెచ్. సి. 5	బి. హెచ్. సి. 5%
"	22	<b>oerealella</b>	<b>cerealelle</b>
61	9	చచ్చుటయుగలదు,	చచ్చుటయు గలదు.
"	19	వలసనే	వలెనే
"	24	తృణధాన్య	తృణధాన్య
62	13	సంపత్సరముల	సంపత్సరముల
"	15	పంట	పంట
"	17	పుబ్బోడు	పుట్టుబోడు
"	20	పరిశోధన	పరిశోధన
63	4	చేయవచ్చునని	చేయవచ్చుననియు
"	6,7	ప్రత్యేక పథకము	ప్రత్యేక పథకము
"	8,9	జల్లి గాని.	జల్లిగాని
"	9	కాదనియు,	కాదని,
"	21	తక్కిన గింజల	తక్కిన గింజల
66	14	ఒక్కొక్కప్పుడు	ఒక్కొక్కప్పుడు
67	28	25 చేసి	ఇరువది ధైదేసి
69	13	తీసి	తీపి
70	1	పొడుముగాని	పొడుమునుగాని
71	4	తగలకుండగను	తగులకుండగను
"	17	కగురు.	కగునట.
72	8,9	తగ్గుననియు	తగ్గుట గలదనియు
73	5	డిసెంబరు-	డిసెంబరు
"	20	చొప్పునను,	చొప్పునను
74	8	అక్టోబరు-	అక్టోబరు
75	4	లుండును,	లుండను.
"	ఓబిల్ లో	(డిసెంబరుకుతప్ప తక్కిన నెలల ప్రక్క గీటులను తీసివేయవలెను.)	

# XXIV

పుట	పంక్తి	తప్పు	దిద్దు
77	సేబిల్	(అంతలు ఎత్తుపైగుహాగా నున్నవి. కడపలో పంక్తిలో 44 3/45 అనునది 45 3/4 కు మార్చబడినది.)	
82	11	ముక్కుకట్టు	ముక్కుకట్టు
83	సేబిల్	మాలసప్యసము	మాలసప్యసము
84	పై సేబిల్		
	మొదటి		
	వరుస	11.88 1.42 10.76	11.88 1.76 10.42
	దిగువసేబిల్		
	మొదటివరుస		
	చివరిఅంక	N.04	11.04
85	14,15	భౌగమున విపులముగా	ప్రతిమి. పులుముగా
		ప్రాచుర్యము.	ప్రాచుర్యము.
"	18,19	ప్రస్థి కాలుము	ప్రస్థి కాలుము
"	20	కారణము.	దీనికే కారణము.
87	1	Pennesetum	Pennisetum
"	7	గానబడకపోవుటచే	గానబడకపోవుటచే
92	6	నాపూవు	నాపూవు
96	17	గంతుపగడము	గంతుపగడము
99	సేబిల్లో	బొబ్బర	బొబ్బర
100	17	బిల్లాలోను,	బిల్లాలోను,
"	21	పక్షములతో మే నెల	పక్షములతో మే నెల
		లోనే	లోనే
103	1	తోల	తోల
104	2	తీసుకొనిపోయి	తీసుకొనిపోయి
105	18	[గూసన పదము ప్రక్కను + గుర్తుపైకి పుట్ నోటులతో దిగువ మాటలను చేర్చవలెను. ఎడ నేద్యము లేక అంతరకృషి (Inter cultivation)]	

# XXV

పుట	పంక్తి	తప్పు	ఒప్పు
		కి బదులుగ కొన్ని ప్రాంతములలో 'యా స న తో' అను పదమును వాడుదురు.]	
107	15	చమురుగింజలు, ఇతర చమురుదిగుసులు	'చమురు గింజలు, ఇతర చమురు దిగుసులు'
111	టేబిల్	డిసెంబరు	డిసెంబరు-
113	"	(కడపటి పద్మ ప్రక్కన 'వెనుకటి పద్మికలోవలెనే' అను మాటలను చేర్చవలెను.)	
		మొత్తము 9 $\frac{1}{4}$ 55 $\frac{1}{4}$ 29	మొత్తము 9 $\frac{1}{4}$ 15 $\frac{1}{4}$ 29
114	'టేబిల్' లో	5, 6, 7 చుట్టలను సేజీ మొదటకు మార్చి, 5 వ పంక్తిని పూర్తిగా ఎత్తివేయవలెను. కడపటి మొత్తము 11 $\frac{1}{4}$ 19 $\frac{3}{4}$ 27 74-0-0. రాబడి దంతు 2 బళ్ళు (2240 సొగులు). నికరాదాయము 57-4-0. యీ విధంగా సరిచేసుకొనవలెను.	
115	టేబిల్ లో	నాగటిచాలున నారు నాటు పద్ధతి వ్యయము రు 74-0-0లు. నికరాదాయము రు 57-4-0 లు. అని ఎత్తివేయవలెను.	
116	10	సర్వహారాయణ	సర్వహారాయణ
"	12	పిండివలె	పిండివలె
117	11, 12	2. B అనుబంధమున	2. C అనుబంధమున
118	1	Elencine	Eleusine
"	9	Eleucine	Eleusine
"	15	యూహింపడిగి	నూహింపడిగి
119	1	గాక	గాక
120	టేబిల్	మొత్తము 7, 78, 830 అని కద్దవలెను.	
123	2	అంగుళముల	అంగుళము
125	1	సంస్కృతముల	సంస్కృతము
122	23, 24	తిరువాతి	తిరువాతి
128	4	మైన చెప్పినట్లు	మైన చెప్పినట్లు

# XXVI

పుట	పంక్తి	తపస్వి	నిత్య
134	2	నా రెండవ వా	నా రెండవ వా
"	3	యెరువులు	యెరువులు
136	14	12-15	12-15 చంద
139	3	(pink borer	(Pink borer-
"	22	డి. డి. టి.	డి. డి. టి.
140	1	exigua):-	exigua):-
"	12	ముచికలను	ముచికలను
"	14,15	(తగిన ప్రతికారమింకను కనుగొనబడలేదు.	
"	16	తగిన దందును.)	తగిన దందును.
"	"	బోర్డో మిక్చరు	బోర్డో మిక్చరు
141	1	వలసి ముందును;	వలసి ముందును.
"	15	బడెబలగో	బడెబలగో
143	13	ఈ వేసళ్ళు	ఈ వేసళ్ళు
"	24	విచలముగ వ్రాచు బడును.	విచలముగ వ్రాచు బడును.
144	టేబిల్ లో	డి సెంబరు	డి సెంబరు-
"	25	పశువుల జతలు	పశువుల జతలు
145	టేబిల్ లో	గొప్ప, కలుపుతీత వెన్నెలకోతకు ఆడు కూరలు 12 మంది నూర్పిడి, ఎగురబోత ముత్తములో ఆడు కూరలు 34½ అని వుండవలెను.	
146	3	పుటనుండి	పుటనుండి
"	4	ఈ పంక్తి గీ వ పంక్తికి తరువాత నుండువలెను.	
"	6	చల్లుట	చల్లుట
"	7	డి సెంబరు	డి సెంబరు-
"	8	గుంటకతోలుట	మే గుంటకతోలుట
"	9	మే పశువుల యెరువు	పశువుల యెరువు

# XXVII

పుట	పంక్తి	తపస్	ఒకప
146	22	9 $\frac{1}{2}$ 27 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$ 19 $\frac{1}{2}$
147	11	రు 28-8-0	రు 108-12-0.
"	12	రు 27-4-0 లు	రు 77-6-0
"	13	రు 7-4-0 లు	రు 11-6-0
"	16	రు 13-0-0 లు	రు 54-0-0
148	15	(పూర్తిగా తీసివేయవలెను.)	
"	27	52 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$
149	3	3000 పానులు	3000 పానులు (సుమారు 3 బండ్లు)
"	5	123-2-0	126-2-0
"	11	అబ్బోబరు	అబ్బోబరు-
"	12	నవంబరు-	నవంబరు
149	15	ప.జ. క్రిందనున్న $\frac{1}{2}$ అంకెను ఆ. దిగువకు మార్చు వలెను.	
150	10	(4 అం.)	(4 అం.)
"	16	25 $\frac{1}{4}$ 41 $\frac{1}{4}$	31 $\frac{1}{4}$ 5 $\frac{3}{4}$
"	24	పరిస్థితులందు	పరిస్థితులందు
151	20	1-A	2-A
152	2	ఉష్ణతత్వము	ఉష్ణతత్వము
"	4	1-C	2-C
153	18	ఇంటియాలో	ఇండియాలో
154	13	బానిధానిలో	రానిధానిలో
"	16	తెలుగుజిల్లాల	తెలుగుజిల్లాల
"	22	Italian	Italian
156	1	పైన	పైన
"	2	స్నముగను	స్నముగను,
"	8	తొడిమి	తొడిమ
"	15	వ పటము (తిరుగబడినది.)	

# XXVIII

పుట	పంక్తి	తప్పు	నిర్దోష
158	6	భౌగములందు	భౌగములందు
"	20	వేర్వేరు.	వేర్వేరు,
159	10	కలపే	కలపే
"	15	కొంచెమించు	కొంచె మించుమించు
"	18	కొంచెమించుముంచు	"
160	7	(బల్బురి)	(బల్బురి)
"	16	రకములగు	రకముల
"	21	అనుబంధములో	1 వ అనుబంధములో
161	3,4	సాగునందు ఉన్నది.	సాగునందున్నది.
"	8	గురియుగనే	గురియుగనే
"	13	కలపి	కలపి
"	14	సుధ్యవరకు	సుధ్యవరకు
162	23	కాయాధోన్యములు	కాయాధోన్యములు
164	2	గ్రామమునందుగిరి.	గ్రామమునందుగిరి
165	17	చల్లి అరికట్టువచ్చును.	చల్లి అరికట్టు,
166	1	వెన్నులవలనే	వెన్నులవలనే
"	3	సులభముగా వాడి	సులభముగా
"	5,6	గణగిరి చుట్టును.	గణగిరి చుట్టును
"	14	వనసువలె	వనసువలె
167	6	(పూర్తిగా తీసిన నునలగు.)	
"	10	డి.నెలబుగు	డి.నెలబుగు
"	17	జూన్	జూన్
"	19	ఆగస్టు	ఆగస్టు
168	21	జూలై	జూలై
169	17	ఆగస్టు	ఆగస్టు
170	8	1-A,B	2-A,B
172	2	8-2	8-12
"	7	విశ్వానము	విశ్వానము

# XXIX

పుట	పంక్తి	తప్పు	ఒప్పు
173	పుట స్పీక్	కొగ్రకువగిన	నక్కొగ్రపెరుగు
176	"	అరిక	అరిక
"	9	$\frac{1}{4}$ అంగుళముల	$\frac{1}{4}$ అంగుళము
177	4	ఒక్కొక్కప్పుడు	ఒక్కొక్కప్పుడు
178	10	ఉండును,	ఉండును.
"	21	$1\frac{1}{4}$ గంటలలోనే	$1\frac{1}{4}$ గంటలలోనే
"	22	యుండును.	నుండును.
180	9	(P. Dilatatum)	(P. dilatatum)
182	5	గూ వెన్నలకును	అరిక వెన్నలకును
"	10	మైలకున్నము	మైలకున్నము
"	14	సురుచటి	సురుచటి
184	22	కుండుములు	కుండుములు
185	12	నాదను	నాదను
"	13	నేచిన	వేయించిన
"	19	పోవునట్లుచేసి	పోవునట్లుచేసి
"	"	ఒంటిపలుక	ఒంటిపలుక
"	20	పలుకకు	పలుకకు
"	22	తరుచు	తరుచు
186	1	1-C	2-C
"	9	నీగడ్డిని	నీగడ్డి
187	12	మొకటికగ	మొకటిక
"	15	ఆర్యవర్తమున	ఆర్యవర్తమున
188	6	5, 50, 840,	5, 50, 840
189	18	నిడవిగల	నిడివిగల
190	1	రెల్లును	రెల్లును, పిల్లరెల్లును
"	7	తరుచు	తరుచు
"	18 వ పటము	20కి వచ్చు, 10ని 19 వ పటము నిచ్చుట	చేర్చవలెను.



పుట	వంక్తి	తపస్	విపస్
190	12	సంగ లోనుండు	చంగ లోనుండు
191	7	రెండవ	రంగడ వరోజున
"	8	గినమునందు	గినములంగు
192	5	గింజలుగల	గల
"	18	తరుచు	తగచు
"	20	"	"
193	పుటశీర్షిక	తగిన	చగిన
"	22	తరుచు	తగచు
"	23	వర్షమును	వర్షము
194	3	కాని,	కాని
"	17	తరుచు	తగచు
"	20	నగకి వేసిన	నగకి కాల్చి వేసిన
196	1	పొనుల	పొనుల)
"	4	$\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$ బండి
"	14	$\frac{1}{2} \frac{1}{8}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{8}$
"	23	$10\frac{1}{6}$	$10\frac{1}{2}$
197	5	15-9-0	15-7-0
"	10	అగును.	అగును.
"	"	12-8-0 లు	12-8-0
"	"	లుండును.	లుండును.
"	22	6 2	2 8
198	టేబిల్	దిగువను 'ఉపయోగములు' శీర్షికను ఏర్పరచెను.	
"	13	పాఠ సము	పాఠ సమును
"	15	1-A, B	2-A, B
"	16	యం కెబ్బటి	యం కెలగుబ్బటి
"	16	శ్రేష్ఠములుగ	శ్రేష్ఠములుగ
"	23	సంఘట్టనమున	దీని సంఘట్టనమును
199	పుటశీర్షిక	ఆదాయ, వ్యయములు	ఉపయోగములు

పుట	పంక్తి	తపస్	ఓపస్
199	8	వ్రాయబడును.	వ్రాయబడెను.
200	2	బరుగు	బరగ
„	8	నెంచబడుచున్నది.	యెంచబడుచున్నది.
„	11	కొందరూహించు	కొంద
		చున్నారు.	రూహించుచున్నారు.
201	పుటకీర్ణిక	వరిగ లేక బరిగ	చరిత్ర, వ్యాపకము
„	9	చెన్నపురియు	చెన్నపురియు
„	„	ములెక్కలలో	ములెక్కలలో
203	పుటకీర్ణిక	వరిగ లేక బరిగ	వరిగ మొక్క సామాన్య
			లక్షణములు
„	19 వ పటము		
	పేరు	బారు వెన్ను	చాచు వెన్ను
	19 వ పటము	(190వ పుటలోని 18వ పటము నిచ్చట చేర్చవలెను.)	
„	22	కింజల్కములును.	కింజల్కములును,
204	పుటకీర్ణిక	వరిగ మొక్క సామాన్య	
		లక్షణములు	వరిగ లేక బరిగ
207	10, 11	దత్తమండలములోను	దత్తమండలములలోను
„	17	అరవదేశమునను.	అరవదేశమునను,
209	4	(పంక్తి మొదట సెప్టెంబరు అను మాటను	
			చేర్చవలెను.)
„	19	20-1-6	20-1-4
„	22	రు.అ.పె.	రు.అ.పై.
„	24	అప్రోబరు	అప్రోబరు-
210	4	(పంక్తి మొదట డిసెంబరు అనుమాటను	
			చేర్చవలెను.)
„	17	గడ్డిబండ్లు-2	గడ్డి- 2 బండ్లు
			(2000 పౌ.)
212	2	frumentaceum	frumentaceum

పుట	పంక్తి	తప్పు	నిపు
212	14	తేబడననియు	తేబడననియు
213	23	గరిష్టపు	గరిష్టపు
214	6	వరకుండును	వరకుండును
216	11	యునికూడ	యునికూడ
"	23	సుమారు	సుమారు
219	2	గింజలును	గింజలును
"	3	1000-1:00 సోనాల)	(1000 1:00 సోనాల)
"	16	ఏప్రిల్	ఏప్రిల్
220	7	ఉపయోగము	ఉపయోగములు
"	8	గింజలపై పోట్లు	గింజలపై పోట్లు
"	22	ప్రా. గుబడును.	ప్రా. గుబడును.
221	3	కొ. బుగ్గుహులు	కొ. బుగ్గుహులు
"	14	దలియదు.	తెలియదు.
"	20	శాస్త్రీయనామము	శాస్త్రీయనామమును
222	7	తెలియదు,	తెలియదు.
"	15	1-3 అడుగులు	1-3 అడుగుల
223	పుట శీర్షిక	'సాగునకు దగిన పరిస్థితులు, సేవ్య విధానము' అని దిద్దవలెను.	
"	1	వరిగ వెన్నునుబోలి	వరిగ వెన్నును బోలి
224	"	ఉపయోగము	ఉపయోగములు
"	11	40 వంతులును	100 కి 40 వంతులును
227	15	దానితో	దానితో
228	(3 వ పంక్తి	దిగువను 'ఉపయోగములు' అను శీర్షికను చేర్చవలెను)	
229	కడపటి సేరాను	2 వ పంక్తికి తర్వాత చేర్చవలెను.	
"	2 వ పంక్తికి	పింద 'సేవ్యవిధానము' అను మాటను చేర్చవలెను.	
"	14 వ పంక్తికి	పింద 'అదాయవ్యయములు' అనుమాటను చేర్చవలెను.	
231	పుట శీర్షిక	వెరుదు	వెరుదు
"	1	1-A	2-A

# XXXIII

232	3	తెల్లజొన్న రకములనుండి	తెల్లజొన్న రకమునుండి
233	2	పసుపుపచ్చ	పసుపుపచ్చ
"	22	తీయబడినది.	తీయబడినది.
234	5	పదేశములకు	ప్రదేశములకు
"	23	గరుపనేలలకు	గరుపనేలలకు
"	25	యుండును.	నుండును.
"	27	గుంటూరు	గుంటూరు (లాం)
235	15	గరుపనేలలకు	గరుపనేలలకు
"	22	బడినది	బడినది.
236	7	పసుపువర్ణము	పసుపువర్ణము
"	15	పరిశోధనా	పరిశోధన
"	27	ఉరువుగా	ఉరువుగా
237	5	అనావృష్టులకు	అనావృష్టులను
"	27	బావులు	బావులు
239	2	పెద్దవి	పెద్దవి.
"	15	చివరసరకు	చివరవరకు
241	చోళ్ళు C <sup>54</sup>		
	3 వ కలం	7.14	7.04
242	పుటశీర్షిక	1 వ యుగబంధము	2 వ యుగబంధము
243	(పుటశీర్షిక తీసివేయవలెను.)		
"	1	ఖనిజద్రవ్యములను	ఖనిజద్రవ్యములను
245	24	Chollam	Cholam
246	9	"	"
"	18	"	"
247	1	pussic	prussic
"	6	Pennesetum,	Pennisetum,

# XXXIV

247	9	cumboo	cumbu
"	"	Madrs	Madras
"	"	Cumboo	Cumbu
"	23	nottra ceable	not traceable
248	1	Inheritence	Inheritance
"	25	nalyses	Analysis
"	27	fields	yields

# గ్రామ సేవా గ్రంథమాల

శ్రీ సర్వోత్తమ భవనము

పటమట పోస్టు, కృష్ణాజిల్లా.

గ్రామప్రజల అనుదిన జీవితంలో అక్కరకు వచ్చు ముఖ్య విషయాలపై తేట తెలుగున అనుభవజ్ఞులు రచించిన ఉత్తమ గ్రంథములను ప్రచురించుటకై ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ట్రస్టు పక్షమున నీ గ్రంథమాల 1950 వ సం॥ లో ప్రారంభింప బడినది.

వ్యవసాయశాస్త్ర ధర్మములు కీ॥ శే॥ శ్రీ గోపేటి జోగి రాజుగారి సమగ్ర 'వ్యవసాయ విజ్ఞానము'ను 20 సంపుటములలో మొదట ప్రచురించుటకు ప్రణాళిక నిర్ణయమైనది. తదుపరి గ్రామ పరిశ్రమలు, గ్రామ సహకారము- గ్రామోద్యోగము, గ్రామవిద్య, గ్రామ క్రీడలు- వినోదములు మున్నగు గ్రామ పునర్నిర్మాణ సమస్యలపై గ్రంథములు వెలువరించబడును.

: 1958 జూన్ నాటికి వెలువడిన పుస్తకాలు :

1. వ్యవసాయ శాస్త్రము- మొదటి సంపుటము
2. డిటో రెండవ సంపుటము
3. తృణధాన్యములు- మొదటి భాగము
4. డిటో రెండవ భాగము
5. కా. ధాన్యములు
6. ఉద్యానవృక్ష
7. పండ్లు - మొదటిభాగము
8. డిటో నాల్గవ భాగము

9. పండ్లు విదవ భాగము
10. పాతికామిక సస్యములు
11. సంబరములు, ఇతర ఓషధులు
12. పశుగ్రాసములు, పచ్చిమొగులు, వంటచెరుకు వస్త్రా బాగులు
13. జంతుకృషి - రెండవభాగము
14. వ్యావసాయిక ఆర్థికములు

దిగువ మొత్తములకు తగ్గకుండా ఒకే సర్వాయం విరాళమిచ్చి దాతలు గ్రంథమాలకు యావచ్చిన గభ్యులుగా నేనబడుదురు.

రూ 1,000/- ఇచ్చినారు మహారాజ పోషకులు

రూ 250/- " రాజపోషకులు

రూ 116/- " పోషకులు

వీరందరికీ గ్రంథమాల ప్రచురణములన్నియు ఉచితముగ పంపబడును. వీరిపేర్లు గ్రంథమాల పుస్తకములలో ప్రచురించబడును,

ప్రత్యేక మొక్కొక్క పుస్తకం ప్రచురణకయ్యే ఖర్చులను పూర్తిగా భరించువారి ఛాయాచిత్రములు ఆయా పుస్తకములలో ప్రచురించబడును.

: ప్తా ప కు లు :

కీ. శే. గోపేటి తోగిరాజుగారు

Asst. Director of Agriculture (Retd.)

స్వయంపోషక కృషిశాస్త్రము, కొండవరము.

: ఉ థా ర తు లు :

శ్రీ గోగినేని వెంకటసుబ్బయ్యనాయుడుగారు

ప్రాప్తైటరు, కృష్ణా మైనింగ్ కంపెనీ, మోహన్ ప్యాలెస్, వైట్ ఫీల్డ్  
బెంగళూరుజిల్లా

: మహారాజప్రోవకులు:

శ్రీమతి నల్లూరు వనజాక్షమ్మగారు

(కీ. శే. నల్లూరు సాంబయ్యగారి ధర్మపత్ని)  
కోపల్లె, తెనాలి తాలూకా

శ్రీ పరుచూరి లలితప్రసాదరావుగారు

దుగ్గిరాల, తెనాలి తాలూకా

శ్రీ తుమ్మల రామకోటయ్యగారు

శ్రీ సత్యనారాయణ మోటారు ట్రాన్స్ పోర్టు, నరసరావుపేట

శ్రీ సామినేని వెంకయ్యగారు, రేమిడిచర్ల, మధిర తాలూకా

శ్రీ వల్లూరు కేశవరావుగారు, పటమటలంక, కృష్ణాజిల్లా

శ్రీ నల్లూరి రాజయ్యచౌదరిగారు, కూచిపూడి,

తెనాలి తాలూకా

శ్రీ తల్లాప్రగడ నరసింహశర్మగారు,

ఉంగుటూరు, తాడేపల్లిగూడెం తాలూకా

శ్రీ పుతుంబాక శ్రీరాములుగారు, ఎం. ఎల్. ఏ.

పెదపాలెము, తెనాలి తాలూకా

\* శ్రీ పులిజాల వెంకటరంగారావుగారు, వకీలు, నల్లగొండ



\* శ్రీ యల్. ముత్తయ్య కిసాన్ గారు,

పెదవల్లి, శరీంనగరం జిల్లా

\* శ్రీ వడ్లమూడి సీతారామస్వామిగారు,

గొల్లపూడి, కృష్ణాజిల్లా

\* ఈగుర్తు పేరు మొదట నున్న వారు వాగ్దానం చేసినారు.

శ్రీ గోగిరాజుగారు తమ గ్రంథముల కాపీలెట్టుతో పాటు రు 2, 500/- రొక్కమును ప్రస్తుత విరాళముగ నిచ్చినారు. తమ గ్రంథముల ప్రచురణకనకర్థమైన బ్లీకు లను తయారు చేయించి అవసరమైనపుడంతా గరభరా చేయుట కేర్పాటు చేసినారు.

శ్రీ గోగినేని వెంకటసుబ్బయ్యనాయుడుగారి వాగ్దానం నెరవేరవలసియున్నది.

శ్రీమతి నల్లూరు వనజాక్షమ్మగారు 'తృణధాన్యములు' మొదటి భాగం ప్రచురణకైన మొత్తం రు 1500/- శ్రీ పరుచూరి లలితప్రసాదరావుగారు 'కాయధాన్యములు' ప్రచురణకైన మొత్తం రు 600/- చెల్లించినారు.

కొమ్మా సీతారామయ్య

పాలక ధర్మకర్త

ఆంధ్ర గ్రంథాలయ బ్రహ్మ.

# తృణధాన్యములు

[ రెండవ భాగము ]

## చిరుధాన్యములు వగైరా

జొన్న, గంటె, చోడి, చామ మొదలగు చిన్న గింజలు గల తృణధాన్యములను చిరుధాన్యములందురు. నరి, మొక్కజొన్న, గోధుమ యందు జేరవు. సమశీతోష్ణ మండలపు పైరులగు యవలు, ఓట్టు మొదలగు నవి కూడ యందు జేరవు.

ఆంధ్రదేశమున సాగునందున్న చిరుధాన్యములలో నీ క్రిందివి ముఖ్యములు.

1. జొన్న - The great millet - *Andropogon sorghum*.
2. గంటె - The spiked millet - *Pennisetum typhoidium*.
3. చోడి - Ragi - *Eleusine coracana*
4. కొర్ర - The Italian millet - *Setaria Italica*
5. నక్కకొర్ర - Pigeon or bottle grass - *Setaria glauca*
6. ఆరిక - The kodo millet - *Paspalum scrobiculatum*

7. చామ - The little millet - *Panicum miliare*

8. వరిగ - The Common millet - *Panicum miliaceum*

9. ఊద - The barn yard millet. *Echinochloa colona* . Var *frumentaceum*

10. పెద్ద ఊద - *Echinochloa crusgalli*

11. దిసక - *Brachinaria ramosa*

పై జాతులలో జొన్న, గంట, చోడి, కొర్ర, ఆరిక మాత్రమే చెన్న రాజధానిలో మెండుగ అనగా పది లక్షల యెకరములకంటె హెచ్చు విస్తీర్ణముపై సాగు చేయబడుచున్నవి. చామ, ఊద, పెద్దఊద, వరిగ, వీని విస్తీర్ణము తక్కువ. నక్కకొర్రయు, దిసకయు స్థానికముగ మిగుల కొద్ది విస్తీర్ణమున సాగు చేయబడుచున్నవి.

పై చిరు ధాన్యములలో జేరని కొన్ని యితర తృణ జాతుల గింజలుకూడ కొన్ని చోట్ల నాహారముగ నుపయోగింపబడుచున్నవి. అందు ఈ క్రిందివి ముఖ్యములు.

1. గొలుగు - Jobs tears - *Coix lachryma jobi*

2. నెదురు - Bamboo-Bambusa *arundanacea*

తృణధాన్యజాతుల సామాన్య లక్షణములు మొదటి భాగపు 3-6 పుటలందు దెలుపబడెను.

చిరుధాన్య జాతులలో జొన్న, గంట యివి యెత్తుగ నెదిగి దంటు కొంత గట్టిగ నుండుటచే సామాన్యముగ నిలబడియుండు జాతులు. తక్కినవానికంటె మౌటయినవి. కొర్ర

గూడ నిలచియుండు స్వభావముగలదియేగాని, అంత యెత్తెడు గదు. నక్కకొర్ర కొర్ర మొక్కనుబోలియే యుండును. కాని యంతకంటె చిన్నది. చోడి, ఆరిక, చామ, ఊద యీ జాతులు పరిదుబ్బులవలె మెత్తని దంటు కలిగి యుండును. యెత్తు మధ్యమము. పరిగ, దిసగ యివి పై మూడింటికంటెను కురుచగ నెదిగి సామాన్యముగ నేలపైవ్రాలి పెరుగుజాతులు.

గొలుగు కొంచె మించు మించు పరిదుబ్బువలె పెరుగు జాతి. కాని యంతకంటె మోటుయినది, సామాన్యముగ పరి చేలలో కలుపుగ బెరుగుచుండును. కాని కొన్నిచోట్ల దీనిని ప్రత్యేకముగ సాగుచేయుటయు గలదు.

వెదురు తృణజాతు లన్నిటిలో పరిమాణమున నైన నేమి మోటుదనముననేమి యగ్రస్థానము వహించునని వ్రాయబనితేదు. ఇదిసామాన్యముగ నడవులందు సహజముగ నెదుగు చుండును. కొన్నిచోట్ల నాటి పెంచుటయు గలదు.

ఆయా జాతుల మొక్కల స్వభావమును గురించిన యితర వివరములు వానినిగూర్చి ప్రత్యేకము వ్రాయుచోట్ల దెలుపబడును.

# జొన్న

The great millet - *Andropogon sorghum Vulgara*

అరవము- చోళం; కన్నడము-జోల; హిందీ- జొవార్ లేక జవార్;

సంస్కృతము-యావనాశాః

చరిత్ర, వ్యాపకము

మానవుని కాహారముగ నుపయోగించు ధాన్య జాతు లలో వరి, గోధుమ మొదలగు వానియంత ప్రాముఖ్య మగు నది కాకపోయినను, జొన్న యిండియా దేశమునందును, మరికొన్నిటి యందును విరివిగ సాగుచేయబడుచున్నది. చాల మందిచే నీ గింజలాహారముగ నుపయోగింపబడు చున్నది.

జొన్న కునికిపట్టు ఉష్ణమండలము. కాని దీని కాదిమ స్థానమేదేశమైనదియు నిర్ణయించుటకు వీలులేకున్నది. ఇండి యాలో కొన్నిచోట్ల (ఆంధ్ర)దేశమునగూడ) వన్యస్థితియందు గాననగు కొండచీపురు (*Sorghum halipens*) జాతి నుండి యిది యుత్పన్నమయి యుండవచ్చునని కొందరి యాహా. <sup>1</sup>

జొన్నకు సంస్కృతమని యెంచబడు యావనాశశబ్దము ప్రాచీనార్య వాఙ్మయమున గానరాదు. ఈ పదము తొలుత క్రీస్తుశక ప్రారంభము నాటిదని యెంచదగు విక్రమాదిత్య చరిత్రయందు గలదు. కాని యా గ్రంథమునకు ను మారు తొమ్మిది శతాబ్దముల వెనుకటి రచనయగు అమరకోశమున నీశబ్దము గానరాదు. <sup>2</sup> కావున విక్రమాదిత్య చరిత్రయందలి యాశబ్దము జొన్నకు వర్తించునాయని సంశేపము గలుగు

చున్నది. తక్కిన ప్రాచీనార్య వాఙ్మయమునకూడ నీశబ్దము గానరాకుండుటచే మొత్తముమీద జొన్న ఆర్యావర్తమున నిటీవల బ్రవేశపెట్టబడి యుండునని యెంచదగి యున్నది.

జొన్న కరవపేళ్ళు తొమ్మిదవ శతాబ్దమునకు బిమ్మటి దగు నొక తమిళ నిఘంటువునందు గాననగును. " అరవపేళ్ళ కును, తెనుగు పేళ్ళకును చాల దగ్గరసంబంధముకూడ గలదు. కావున దక్షిణదేశమున నీ సస్యము నుమాకు వేయేండ్లక్రితమే సాగునందుండి యుండవలెను. అదివరకెంత కాలమునుండి సాగున నుండెనో తెలియదు. కొండచీపురు జాతినుండి పరిణామమువలన నీ జొన్న మొక్క యుద్భవించి యుండుట నిజమగుచో నీజాతికి దక్షిణ యిండియాగాని, ఆఫ్రికా ఖండముల వలి యుష్ణభాగముగాని ఆదిమస్థానమయి యుండవచ్చును.

జొన్న యిపుడాసియాఖండము నందలి దక్షిణభాగములందును, ఆఫ్రికా ఖండమునందును విస్తారముగ సాగు చేయబడుచున్నది. ఐరోపా, అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాలోని యుష్ణ ప్రదేశములందు గూడ కొంతవరకు జొన్న సేవ్యము గలదు.

జొన్న సాగు ప్రపంచమున నాయా దేశములలో నెంతెంత విస్తీర్ణమున గలదో తెలుపు అంకెలు లభింపలేదు. ఇండియాలో సీసస్యము నుమాకు మూడుకోట్ల యెకరములపై సాగు చేయబడుచున్నది. ఈ విషయమున ఆయా రాష్ట్రములందును, సంస్థానములందును నిజాంరాష్ట్రమును, బొంబాయి రాజధానియు అగ్రస్థానము వహించు చున్నవి. చెన్నపురి రాజధానియు, మధ్యరాష్ట్రములును వీని తరువాతివి. ఆయా

ముఖ్య రాష్ట్రములందును, సంఘానము లందును నీ సస్యము సేవ్యమునందుగల విస్తీర్ణమిక్రిందిపట్టికలో చెబుపబడును. <sup>4</sup>

1937-38 వ సంవత్సరమున

రాష్ట్రము

జొన్న సాగు చేయబడిన

విస్తీర్ణము-ఎకరములు

నిజాంరాష్ట్రము	8,480,000
బొంబాయిరాజధాని	8,186,000
చెన్నపురి రాజధాని	4,899,000
మధ్యరాష్ట్రములు, బీకారు	4,214,000
బొంబాయిరాజధానిలోని సుసాక్షములు	2,973,000
సంయుక్తరాష్ట్రములు	2,212,000
రిక్కినరాష్ట్రములు	2,298,000

మొత్తము 32,968,000

చెన్నపురి రాజధానిలో వరితరువాత జొన్నయే ప్రధాన సస్యము. అందలి సేవ్యపు భూమిలో నీ సస్యము నూటికి సుమారు 13 వంతుల చొప్పున నాక్రమించుచున్నది. రాజధాని యంతటను నీ సస్యము సాగు చేయబడు మొత్తపు విస్తీర్ణమున నూటికి 70 వంతులు ఆంధ్రదేశమునకు చెంది యున్నది. రాయలసీమలోను, నెల్లూరు జిల్లాలోను ఇదియే ప్రధాన తృణధాన్యము. కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలలోగూడ నిది విస్తారముగ పైరు చేయబడుచున్నది. ఆంధ్రదేశమునం జాయా జిల్లాలయందు సామాన్యముగ జొన్న సాగుచేయబడు విస్తీర్ణమిక్రిందిపట్టిక వలన దెలియును. <sup>5</sup>

జిల్లా	విస్తీర్ణము-ఎకరములు
బళ్ళారి	718,130
కర్నూలు	586,550
నెల్లూరు	450,320
గుంటూరు	392,150
కడప	315,750
అనంతపురం	301,700
కృష్ణా	210,080
తూర్పుగోదావరి	97,710
విశాఖపట్నం	77,500
పడమటిగోదావరి	61,370
చిత్తూరు	44,600
మొత్తము	3,255,860

మరా:-ఇందు 58,860 ఎకరములు మాత్రము నీరుపెట్టి సాగుచేయబడు జొన్న విస్తీర్ణము.

ఇండియా మొత్తముపైని 1937-38 వ సంవత్సరమున సుమారు 64 లక్షల టన్నుల జొన్నలు పండెనని లెక్కవేయబడినది. ఎకరము 1 కి సుమారు 507 పౌనుల చొప్పున లెక్కవేయబడినది. చెన్నపురి రాజధానిలో నేటేట సుమారు 14 లక్షల టన్నుల జొన్నలు పండుచున్నవి. ఎకరము 1 కి పంట 707 పౌనుల చొప్పున వేలెను. తెలుగుజిల్లాలలో ఉత్పత్తి సుమారు 8 లక్షల టన్నులును, ఎకరము 1 కి పంట 504 పౌనులును అని వేలెను.

ఈ దేశమునబండు పంట చాలవరకే చలబండున దళిబనే వినియోగపడుచున్నది. బొంబాయి రాజధానినుండి



మాత్రము స్వల్పముగ ఆఫ్రికా ఖండమునకును, అరేబియా పర్షియా దేశములకును ఎగుమతి యగుచుండును.


### జొన్న మొక్క లక్షణములు

జొన్న మొక్క స్థితిగతులనుబట్టి సామాన్యముగ 4 మొదలు 10-12 అడుగుల యెత్తువరకు నెదుగును. కొన్నిరకము లొక్కొకప్పుడు 20 అడుగుల వరకు నెదుగుట గలదు.

జొన్న మొక్కకు కొన్ని యితర తృణజాతులలోవలె పిల్లలనుబెట్టు స్వభావ మంతగా లేదు. కాని తల్లికర్రకు పురుగు పట్టినయెడలగాని, తల విరిగినయెడలగాని ముడటించుండియు, నై కణపులనుండియు, యిలకలు పుట్టుటగలదు. వెన్ను వేయక ముందుగాని, మాదురక ముందుగాని చేనిని గోసినయెడల నేలలో తగినంత పదునున్నచో యిలకలు మెండుగ బయలు దేరి యెదుగును.

జొన్న వేళ్లితర జాతుల తృణజాతులలోవలెనే నార వేళ్ళు. కాని యీజాతిమొక్క లెత్తుగ నెదుగుటచే దానిని నిలువబెట్టుటకుగాను వరి, చోడి మొదలగువాని వేళ్ళకంటె దీనివేళ్ళు హెచ్చుగ వ్యాపించును. † బలిష్ఠముగ నుండును.

† సామాన్య సస్యమునందలి కొన్ని మొక్కలవేళ్ళు సుమారు 1-1½ అడుగు లోతునకును దూరమునకును వ్యాపించును. విడిగాను బలమైన నేల యందును బెరిగిన మొక్కల వేళ్ళొక గజముదూరమునకు, గజము లోతున కును బోవుట గలదు. సుమారు 6 అడుగులవరకు బోయిన దృష్టాంతములు గలవు. † జొన్న మొక్కవేళ్ళు మొదట భూమి పై భాగమునను, పిమ్మట క్రిందిభాగమునను హెచ్చుగ వ్యాపించును.



1 వ పటము

చొన్న మొక్క

( $\frac{1}{2}$  అక్షతి)

1 కొండము (ఖండము); 2. మై కణుపు నుండి దిగిన వేళ్లు (గాలి వేళ్లు); 3. ఆకునందలి తొడిమ; 4, 5 ఆకునందలి రేకులు; 6. కొన్ని కు; 7. పంపు.

భూమిపై నుండి చొన్న కణుపులనుండి గూడ గాలి వేళ్లు (Adventitious roots) కేలలోనికిదిగి మొక్కను నిలుపును.

సామాన్యముగ నెరిగిన జొన్న మొక్క- కాండము నుమారు ఖండములతోను లావుగదురు. కాని 1½ అంగుళమునకు తక్కువ లావుగది, 1½ అంగుళమునకు మేచ్చు లావుగాని పెరుగుటయు గలది. కాండము వరితోచున్న కణుపులుగలిగి యుండును. ముగట కణుపుల దగ్గరగముట్టి మొక్కపై కెడి గిన కొలదిని యపవి సూగుముగ నేర్చుదును. కణుపుల దూరము లేక చాని నుభ్యఖండముల నొడవు మొక్క-యొక్క నడిమి భాగమున సామాన్యముగ గిరి అంగుళము లుండును. కాని యీ పోడిపు ముగూరొక యడుగునరే కుండుటయు గలదు. సామాన్యముగ కాండమున నుమారు పెరి కణుపులవర కుండును. కాని కొన్ని రకములలో నపుడపుడు 30 వరకుండుట గలదు. కాండము సామాన్యముగ లేబనరు రంగు గలిగి యుండును. కొన్ని రకములలో నెడదగిలినచోట ఊదా లేక యెరుపురంగు గలిగి యుండుటయు గలదు. తరచు చెరుకు కర్రలందువలె బూడిదరంగుగల యొకవిధమగు స్థానపువూత గూడ గలిగి యుండును. కాండము ముదిరి యెండినపిమ్మట చాని పసరునల్లిము పోయి లేబసిమిరంగు వచ్చును.


జొన్న మొక్క కాండము పైని కఠినమగు పేడుగలిగి లోపల బెండుగానుండును. ఈ బెండు రసయుతముగ గాని, రసహీనముగగాని, తియ్యగగాని, చప్పగగాని యుండురకములు గలవు. కొన్నిటిలో ఖండములు బూలగ నుండుటయు గలదు.

లేత జొన్నయాకు తొడిమ ఆకుపసరు రంగు గలిగి యుండును. ముదిరినకొలదిని పైని ఊదాతోగూడిన యెరుపు, యెరుపుతోగూడిన గోధుమవర్ణపు మచ్చలు లేక చారలు

బయలుదేరి కొద్ది గొప్ప బూడిదబారి యుండును. చొడిమ పొడవు సామాన్యముగ నది యూశయించియుండును కలుపుపై నుండు ఖండపుపొడవు ననుసరించియుండును. చొడిమ సామాన్యముగ నాఖండమును చాలవరకు గప్పియుండును పూర్తిగ గప్పియుండుటయు గలదు. రేకుపొడవు రకమునుబట్టియు, పెరుకువను బట్టియు నుండును. సామాన్య సస్యమున మొక్కలందలి దీర్ఘతమునుగ రేకుపొడవు నుచూచు 34-35 అంగుళములుండవచ్చును. అకుసుగ 40 అంగుళములవరకుండుట గలదు. బాగుగ నెదిగిన రేకు నెడల్పు నుచూచు 2-3 అంగుళములు

6-33. 1 వ పటము. అకుసుగ 3 అంగుళములు

2 వ పటము నెడల్పువరకుండుట గలదు. పరిశీలన తులనుబట్టియు, రకమును బట్టియు, రేకుమొక్క పసరురంగు తేలికగాని, ముదురుగ గాని ముడివచ్చును. దీసిపైగూడ ముడిపినకొలదిగా తొడిమయందు పలనే కొద్ది గొప్ప మొరుపు, ఊదా లేక గోధుమవన్నె మచ్చలు బయలుదేరుట గలదు.



అకుసుగని తొడిమ - రేకు సంధి (½ ఆకృతి)

1. మించు; 2. చానిప్రక్క లేబసిమిగ నుండు భాగము.

రేకు సామాన్యముగ నున్నగ నుండును. అంచులుమాత్రము కొద్ది గొప్ప గరి గలిగియుండును. రేకునకును, చొడిమకును సంధియందు వెలుపలను గోపలిభాగమునను మించువద్దనుగూడ కొంచెము నెడల్పున నీ పసరురంగు తేలికగనుండును. లేక యించుక

ఉదారంగుతో జేరియుండును. ఇందు తరచు కొద్ది గొప్ప  
కోమములుండుటకూడ గలదు. రేపనందిలి మధ్యయిన  
కొన్నిరకములలో తేటయిన జెబువులగు గలిగియుండును.  
ఇట్టిరకముల కాండము రసహీనముగ నుండును. కొన్నిచో  
తేటలేని జెబువుతోగూడన యింకొక పనురులగు గలిగి  
యుండును. ఇట్టిరకముల కాండము రసయుహముగ నుండును.

జొన్న కన్ను రకపు స్వభావమునుబట్టి ముగ్ధకంకిగ  
గాని, కొద్ది గొప్ప జల్లి లేక చల్లకంకిగాని యుండును.

సామాన్యపు జొన్నకంకి సుమారు 6-9 అంగుళముల  
పొడవును, 3-5 అంగుళముల లావును గలిగియుండును. కొన్ని  
రకముల రింజకంకు లొక్కొక్కప్పుడు సుమారు 15 అంగుళ  
ముల పొడవును, దానికి తగినంత వైశాల్యమును గలిగి  
యుండుట గలదు.

అల్పకణికములు సామాన్యముగ 2, 3 చేరియుండును.  
అందొకటి కాడలేనిది. ఇదియే ఫలవంతము. తక్కినది లేక  
తక్కినవి చిన్న (సుమారు  $\frac{1}{2}$  అంగుళము పొడవు) కాడగలిగి  
స్త్రీ పురుషాంగములు లేకగాని, పురుషాంగములు మాత్రము  
గలిగిగాని యుండును.

అల్పకణికమునందలి 1, 2 వ అనగా పై తుపములు  
జగియైనవిగను కొంచెము దళముగను, పెద్దవిగను నుండి  
మొదట పూవును, పిమ్మట గింజను ఆచ్ఛాదించి యుండును.  
3, 4 వ అనగా లోని తుపములు పలుచగను పారదర్శకము

వి. వ. వ.

శి. వ. వ.



మొదటివృక్ష


(అద్భుతము)



మొదటి, రెండవ, మూడవ వృక్ష

(అద్భుతము)

## 5 వ పటము



మిగుల రింజచెన్న  
(అధికృతి)

## 6 వ పటము



చిన్న చెన్నవందలి యొక  
రెల్ల (రెల్లపు ఆకృతి)

1. చొడిమగల చల్ల కణి  
కము (ఫలవంతము కానిది);
2. ఫలవంతమగు చల్లకణి  
ముపై తువము; 3. గింజ; 4.  
నాల్గవతువపు కొన శేర్పడు  
తోక.

3, 4, 5 పటములు Madras Agrl. Journal (Vol, XII-1)  
నుండి గ్రహింపబడెను.

7 వ పటము




ఒక లేత పిల్లరక్క  
(చిరురక్క)

1. తొడిమలేని యల్ప  
కణిశము; 2. పూర్వ  
వగల యల్పకణిశములు

గను నుండును. 4 వ తువపు పంగ  
నోసే పూవుండును. దీని కె చురుగు  
బుండును. నాల్గవ తువపు కొనకు  
నోక లేక చుట్టుండవచ్చును.

తువములు నెన్నుచొట్టనుండి వెలు  
వడునపుడు అకుసనరు వర్ణము గలిగి,  
పూవు విడిచి గింజ ముదిరినకొలదిని  
ఆ య-రకములలో గోధుమ, ఎరుపు,  
ఊదా, నలుపువర్ణములుగను వీని మిశ్ర  
ములుగను మారును.

8 వ పటము



ఒక యల్పకణిశమునందలి తువ బువముల  
యాకారపరిమాణములను దెలుపునది.

1. మొడటి వెలుపలి (క్రింది) తువము (Lower glume)
2. రెండవ వెలుపలి (పై) తువము (Upper glume)
3. మూడవ లోని (క్రింది) తువము (Lower lemma)
4. నాల్గవ లోని (పై) తువము (Upper lemma)
5. బీజము (Palea)





వగిలి యందాశయాలు గర్భవతియగును. మగపూవునందలి పుష్పాడికూడ యింకొక భావవరించును. \*

గింజలు క్రొందైనపున కొంచెము మొనదేరి కొంచె మించు మించు గుండ్లముగ నుమారు  $\frac{1}{8}$  -  $\frac{1}{10}$  అంగుళముల మధ్యకొలత గలిగి యుండును. తులమునకు నుమారు 350-450 గింజలు తూగును. గింజల పొర (బీజ కవచము) పలు చగ నుండును. ఇది ఆ యా రకములలో తెలుపు, పసిమి, గోధుమ, యెరుపురంగులుగాని, వీని మిశ్రణములుగాని గలిగి యుండును. చిన్న బీజాంకుర మొకటి యంకుర చ్చదనమున కంటుకొని యుండును.

గింజలు మొదిగినపిమ్మట వాని నాచ్ఛాదించి యుండు తుషములు (జొంతు) కొన్నిరకములలో వానిని హెచ్చుగను, కొన్నిటిలో తక్కువగను కప్పియుండును. కొన్నిరకములలో తుషములు అట్లుగ ముడుతలుపడి సంకోచము నొందుటవలన గింజలు వైకే హెచ్చుగ కనిపించుచుండును.

కొన్ని రకములు, వాని లక్షణభేదములు, వర్గీకరణము

గింజలు రంగు, పన్నుల వైఖరి, సాగుచేయుతరుణము, ఫలించుటకుపట్టు కాలుము మొదలగు లక్షణములందు భేదములు గల యివికొన్నిరకము లాంధ్రదేశమున సాగునందున్నవి. ఈ దేశమున వరితరువాత రకభేద మింతగా గుర్తింపబడుచున్న త్రోడాధాన్యము మరియొకటిలేదు.

వృక్షశాస్త్రజ్ఞులు జొన్న రకముల వర్గీకరణమున ప్రాముఖ్యమొనగు లక్షణము గింజలపైనుండు తుషముల

స్వభావము వీసనిబట్టి బర్కిల్ (Burkill) గారు 'జొన్న' రకములను 6 తరగతులుగను, 17 ఉపతరగతులుగను విభాగించిరి. చెన్నరాజధానిలోని రకములు చాలవర కీ క్రింది మూడు తరగతులలోను జేరును.

I తుషములు గింజలకంటె కరుచగనుండి వాని కంటుకొనకుండగ నుండునవి:- ఇట్టిరకములలో నన్ను సందలి గింజలు పైకి స్ఫుటముగ గనుపించుచుండును. సామాన్యముగ సాగుచేయబడు పచ్చ, తెల్ల, ఎర్రజొన్న రకములు చాలవర కందుజేరును.

ఇటీవలి శాస్త్రజ్ఞుల వర్గీకరణమున నవి చాలవరకు Sorghum durra అను ఉపజాతిలో జేరును. కాని బళ్ళారి ప్రాంతములందలి తెల్లజొన్నమాత్రము S. Cerauum అను మరియొక యుపజాతిలో జేరును.

II తుషములు గింజలను మించియున్నను వాని కంటు కొననివి:- ఇందు తుషములు నిడివిగనున్నను గింజల కంటు కొనక పోవుటచే నిట్టిరకములలోగూడ గింజలు కొంతవరకు పైక కనబడుచునేయుండును. తెల్ల, ఎర్ర కొండజొన్న రకము లిందుజేరును.

ఈతరగతిలోని వాతు లిటీవలి శాస్త్రజ్ఞుల వర్గీకరణ మున S. Rox-lurghii అను ఉపజాతిలో జేరును.

III తుషములు గింజలను గట్టిగా నంటుకొనునవి:- ఇందు గింజలు చిన్నవిగనుండి తుషములచే చాలవరకు గప్ప బడియుండును. స్వల్పముగ మాత్రము పైకి కనబడుచుండును. ఆంధ్రదేశమున నీతరగతికిజెందిన రకము లంతగా గాన్నించవు.

దక్షిణాదిని సామాన్యముగ పశువున మేతకొరకు పెంచబడు ఇరుంగుజొన్న లీ తరగతిలో జేరును.

ఈతరగతి రకము లిటీవలి శాస్త్రజ్ఞుల వర్గీకరణమున S. Nervosum అను ఉపజాతిలో జేరును.

ఆంధ్రదేశమున సాగుచేయబడుచున్న 1 వ తరగతిలోని ముఖ్యరకములను అవి సాగుచేయబడు కాలమునుబట్టియు, గింజల రంగునుబట్టియు మరల నీ క్రిందివిధముగ వర్గీకరింప వచ్చును.

A. తొలకరిలో జల్లునవి (వర్షాధారమున):-

1 వచ్చజొన్నలు:-

1. పెద్దజొన్న (బల్లారి, కర్నూలు):- ఎర్రగరువనేలలలో జూన్ లో విత్తబడు రకము. 5 నెలలలో పండును. పెరకువ మధ్యమము. దంటు చూటు. మిక్కిలి ముద్ద నెన్ను. గింజ కొలగనుండును. బొంతు క్రిందిభాగమున గోధుమవర్ణము.
2. గిద్దజొన్న (కర్నూలు, బల్లారి):- ఎర్రనేలలలో జూలై నెలలో విత్తబడును. చేను కురుచ. ముద్ద నెన్ను. గింజ పెద్దది. గుండ్రన. తేటయిన పసిమి.
3. గిద్దజొన్న (కృష్ణా):- రేవడి నేలలో జూన్ నెలలో విత్తబడును. 4 నెలలలో ఫలింతును. పెరకువ మధ్యమము. ఆకులు నెండు. చేను పండుసరికి ఆకులు చాలవరకు రాలిపోవును. పెన్నులు చాలవరకు రింజ. ముద్దనెన్నులుకూడ కొన్ని బయలుదేరును.

4. ఏడాకులజొన్న లేక సంద్యాల జొన్న (కృష్ణా):-  
మిశ్రమ రేవళ్ళతో జూన్ లో విత్తబడును. 3½ నెలల  
పంట. చేను కురుచ. కణ్ణులమును. మధ్యమము.  
దంటు సన్నము. కఠినము. అటు హెచ్చుగ గాలి  
పోవును. నన్న కొంత రింజ. గింజ ముదుగు.  
అన్నము సుళువుగ జీర్ణముకాదు. గింజను పాతర  
వేయవలసియుండును.

ii తెల్లజొన్నలు:-

1. చక్కెరగులి జొన్న (బళ్ళారి):- కృష్ణ రేవళ్ళతో మే,  
జూన్ లేక ఆగష్టు, సెప్టెంబరు నెలలలో విత్తబడును.  
4½ నెలల పంట. పెరకుప మధ్యమము. ఆకు మిగుల  
పొడవు; వెడల్పు. దంటు మౌటు. గుండ్రసి రింజ  
నన్ను. గింజ మసరలో గూడిన జెలుపు. ఇంతు  
నలుపు. గింజ తీసి నిల్వయుండదు. కాడ తీయగ  
నుండుటచే నక్కలు కొట్టుట గలదు.

iii ఎర్రజొన్నలు:-

1. ఎర్రజొన్న (కర్నూలు, బళ్ళారి):- ఎర్రగరుములలో  
మే, జూన్ నెలలలో విత్తబడును. 3 నెలల పంట.  
చేను కురుచ. దంటు తీసి. ముద్ద నెన్ను. గింజ యన్న  
మున కనుకూలము. పొట్టు తక్కువ. పాతర కాదు.  
నిల్వయుండదు.

2. జింకపురిజొన్న (బళ్ళారి):- ఎర్ర గరుప నేలలలో  
జూలై నెలలో విత్తబడును. 3 నెలలపంట. చేను  
కురుచ. ఆకులు తక్కువ. నెన్ను గోవురాకారముగ

నుండును. కొంత మెలితిరిగి జింకకొమ్మువలె నుండుటచే నీ పేరు గలిగెను. బొంతు పసిమి లేక గోధుమ వర్ణము. చిన్న తోకలుండును. గింజపెద్దది. యెరువు.

B. పక్షురను జల్లునవి (వర్ణాధారమున):-

i పచ్చజొన్నలు:-

1. పచ్చజొన్న (విశాఖపట్నం, గోదావరి, కృష్ణా):-  
గరుప నేలలలోను, వండలి నేలలలోను ఆగష్టు మొదలు అక్టోబరువరకు విత్తబడును. 5-5½ నెలలలో పండును. పెరకువ మధ్యమము. ఆకులు పొడవు; నెడల్పు; చాలిపోవు. వెన్ను యిండుక రింజగనుండును. బొంతు యెరువు లేక ఊదారంగుగలిగి యుండును. గింజను సగమువరకు కప్పియున్నను అంటుకొనదు. గింజ పెద్దది. తేటయిన పసిమి. అన్నమున కనుకూలము. పేలాలకుగూడ బనికెవచ్చును. నిల్వయుండదు. గింజల కొరకును, మేతకొరకునుగూడ పెంచబడుచున్నది. దీనికి కొన్నిచోట్ల పెద్దజొన్న, పయరజొన్న యని కూడ పేర్లుగలవు.

2. పెద్దజొన్న (కృష్ణా, నెల్లూరు):- పచ్చజొన్న కిది మరియొక పేరు.

3. చిత్త పచ్చజొన్న (కర్నూలు, అనంతపురము):-  
కృష్ణారేవులో చిత్తకార్తెలోగాని, అంతకు ముందుగాని చల్లుదురు. చేను కుడుచు. ఆకులు చాలిపోవు. మేత కనుకూలము. ముద్దవెన్ను. బొంతు గులాబీ

రంగు. గింజ పెద్దది. తేటయిన పసిమి. బడుపు. అన్నమునకు చాల యనుకూలము. గింజ నిల్వయుండదు.

4. చెరుకు పచ్చజొన్న (కర్నూలు):- ఇది చిత్తిపచ్చ జొన్నలో కాండమున తీపిగలరకము. మేత కనుకూలము. ఆకులమధ్యనుండు యీన యించుక నీల వర్ణము గలిగియుండును. నెన్ను యించుక రింజ. క్రిందికి వంగియుండుదు.

5. గుండుపచ్చజొన్న (కర్నూలు):- కృష్ణరేపడి నేల లో సెట్టెంబరు, అట్టోబరు నెలలలో విత్తబడును. పెరుకువ మధ్యమము. ఆకులుమెండు. గింజ పై రకమును బోలియేయుండును. రొట్టెకును, సంగడికిని అనుకూలము. బొంతు గోధుమవర్ణము.

6. ఏడాకులజొన్న (కర్నూలు):- నీరసపు కృష్ణరేప కృలో సెట్టెంబరు, అట్టోబరు నెలలలో విత్తబడును. ఈచేను అన్నియవస్థలందును పశువులు తినినచో తక్కిన రకములకంటె తరచు తిక్కచేయునందురు. నూర్పిడి కష్టము. గింజ పెద్దది. జీర్ణమగుట కష్టము. 10 సంవత్సరముల వరకు నిల్వయుండునని చెప్పబడును. పాతరకాగును.

7. పయరజొన్న (నెల్లూరు):- ఎర్రగరుపనేలలలో విత్తిబడును. 3 నెలలపంట. చేను కురుచ. ఆకులుచిన్నవి. డంటు సన్నము. మేత కనుకూలము. తుమ్ముల చివర సన్నని గోకలుండును. ముద్దపిన్ను. చిన్నది. గింజకూడ చిన్నది. పసిమి రంగు. అహారమునకు

మిగుల శ్రేష్ఠముగ నెంచబడుచున్నది. పెక్కు సంవత్సరములు నిల్వయుండును.

ii తెల్లజొన్నలు:-

1. తెల్ల జొన్న (బళ్ళారి, అనంతపురం, కర్నూలు, కడప):- కృష్ణరేవళ్ళలో సెప్టెంబరు - నవంబరు నెలలలో విత్తబడును. 4 నెలలపంట. చేను మిగుల కురుచు. పిల్కలనుపెట్టు స్వభావము కొంతగలదు. ఆకులు రాలిపోవు. దంటు తీపి. మేత కనుకూలము. ముద్దపిన్ను. గింజపెద్దది. తెలుపు. బొంతు యెరుపుకొడి. అన్నమునకును, రొట్టెకునుగూడ అనుకూలము. పేలాలకు బనికెరాదు. చాలసంవత్సరములు నిల్వయుండు ప్రధానరకము. విరివిగ సాగుచేయబడుచున్నది.

2. గుండుతెల్లజొన్న (కర్నూలు):- కృష్ణరేవళ్ళలో సెప్టెంబరు నెలలో విత్తబడును. 4 నెలలపంట. పెతకువ మధ్యమము. పిల్కలనుపెట్టు స్వభావము కొంతగలదు. గుండ్రని ముద్దపిన్ను. గింజ కొంచెముపెద్దది. గుండ్రన. తెలుపు. బొంతు యెరుపుకొడి. అన్నము బిరుసుగనుండును. రొట్టెకనుకూలము. గింజ చాలాకాలము నిల్వయుండును.

3. చక్కెరగుళిజొన్న (బళ్ళారి):- ఇది తొలకరిలో గూడ విత్తబడుచున్నది. A. ii. 1. తూడుకు.

4. చిత్త తెల్లజొన్న (కర్నూలు):- సత్తువయైన కృష్ణరేవళ్ళలో చిత్తకాటెలోగాని, అంతకు ముందుగాని



విత్తబడును. 4 నెలలపంట. చేను కురుచ. మేత కనుకూలము. నెన్ను రింజ. క్రిందికి వంగియుండును. బొంతు గోధుమవర్ణము. గింజ లేబసిమి. పెద్దది, ఆహారయోగ్యము.

5. నల్లపుసిజొన్న లేక నల్లబొంతుజొన్న (బళ్ళారి):- కృష్ణరేవళ్ళలో సెట్టెంబరు-నవంబరు నెలలలో జల్లబడు నొక తెల్లజొన్న. బొంతునలుపు.

iii ఎర్రజొన్నలు:-

1. ఎర్రజొన్న (కృష్ణ):- కృష్ణరేవడినెలలలో సెట్టెంబరులో విత్తబడును. 3 నెలలపంట. పెరుకువ మధ్యమము. ఆకులు సస్యమువండుసరికి చాలవరకు రాలి పోవును. కొలగానుండు ముద్దవెన్ను. గింజ యెరుపు. తీపి. తేలిక. జీర్ణమగుట కష్టము. కొంతవరకు నిల్వ యుండును.

2. ఎర్రమసరజొన్న (కర్నూలు):- ఎర్ర గరుములలో జూలై నెలలో చల్లబడును. 3½ నెలలలో ఫలించును. పెరుకువ మధ్యమము. ఆకులు మెండు. వానియంచు లందు గరిపొచ్చు. ముద్దవెన్ను. గింజపెద్దది. ఆహారమునకు శ్రేష్ఠముగాదు. నిల్వయుండును.

C. వేసవిలో సాగుచేయబడునవి (నీరుకట్టి):-

i పచ్చజొన్నలు:-

1. తోటపచ్చజొన్న (అనంతపురం):- వేసవిలో నీరు పెట్టి సాగుచేయబడును. 3½ నెలలలో పండును.



జూన్-జూలై నెలలలో విత్తి బడును. 6 నెలల పంట. చేను చాల యెత్తుగ నెదుగును. దంటు లావు. కణుపులు పొచ్చు. పైకణుపులనుండి వేళ్ళు బయలు దేరును. వెన్నుపొడవు; రింజ, గింజ తెలుపు. పొంటు కూడ తెలుపు. పేలాల కనుకూలము. దీనికే ముంత జొన్న, వింజామరజొన్న అను పేళ్ళు గలవు.

2. ఎర్రజొన్న (విశాఖపట్నం, గోదావరి) :—  
 కొండపొళ్ళలోను, కొన్ని యెర్ర నేలలందును, పండలి నేలలందును గోదావరి నది యందలి మెరక లంకలలోను సాగుచేయబడుచున్నది. జూన్-జూలై నెలలలో విత్తుదురు. 6 నెలలపంట. చాల యెత్తుగ నెదుగును. కణుపులు మెండు. పైకణుపులనుండికూడ వేళ్ళుదింపును. ఆకులు వెడల్పు; పొడవు. మోటు రకము. పెద్ద రింజవెన్ను. గింజ యెరుపు. చిన్నది. పేలాల కనుకూలము. గింజలకు 17 రెట్లవరకు పేలా లగును. పాతర కనుకూలము గాదు.

పైని ముఖ్య రకముల లక్షణములే వివరింపబడెను. ఇవిగాక యింకను ననేకరకము లాయా ప్రాంతములందు సాగునందున్నవి. చెన్నపురి ప్రభుత్వమువారి 56 వ బుల్లెటిను లో నీరాజధానియందు సాగునందున్న 13కి రకములు పేర్కొనబడెను. ఇప్పుడు మరల నీ రకముల లక్షణములను పరిశీలించి వర్గీకరణము గావించుటకు కృషి జరుగుచున్నది.<sup>7</sup>

జొన్నపూవులు పర సంపర్కమునకు లోనగుటచే రెండు మూడు రకములు సాగునందున్నచోట్ల నాయా రక

ములలో కొంతవరకు సహజముగనే సంకరము లేర్పడుచుండును.\* ఇందుచేతను కొంతవరకు పెక్కురకముల నొకే కళ్ళముతో నూర్చునపుడవి కలియుటచేతను నిపుడు కర్నకులు సాగుచేయు రకములు స్వచ్ఛముగనుండుటరుదు. ఇటీవల కోయంబత్తూరు, బళ్ళారి, నంద్యాల, గుంటూరు మొదలగు పరిశోధనా స్థానములందు వ్యవసాయశాస్త్రజ్ఞు లాయాగకములను బరీక్షించి యందుండి హెచ్చుపంటనిచ్చు స్వచ్ఛమగు వంగడముల నంచి వృద్ధిచేసి విస్తృతము కర్నకుల కందజేయుచున్నారు. నీవివిధములు అనుబంధము లో చూడవగును.

శీతోష్ణాది స్థితిగతులు-సాగునపు దగినకాలము

జొన్న ఉష్ణమండలపు పైరు.† చాల తక్కువ తేమతోనే పెరుగగలదు.‡ కావున సామాన్యముగ చాల చోట్ల నిది మెట్ట సస్యముగనే సాగుచేయబడుచున్నది. నేలలో తేమ

\* పర సంపక్కమునకు వీలగునున్న చేనిలోని గింజలలో నూటికి 1 మొదలు 50 వరకు సంకరము గావచ్చునని కనిపెట్టబడెను.† అరుదుగ నింతకంటె హెచ్చుగ నూడ సంకరము కావచ్చును.

† జొన్న ఉత్తరమున 45 వ సమరేఖకును, దక్షిణమున 15 వ సమరేఖకును మధ్యపడేశమున సాగుచేయబడుచున్నది. ఇండియాలో నిది ఉత్తరమున 15 వ సమరేఖవరకును సాగుచేయబడుచున్నది.

‡ ఒక పౌను గోధుమలను పండించుటకు వలయు నీటి పరిమితిలో ఒక పౌను మొక్కజొన్నలను పండించుటకు వలయు నీటి పరిమితి నూటికి 75 వంతులును, అట్లే ఒక పౌను జొన్నలను పండించుటకు వలయు నీటి పరిమితి నూటికి 60 వంతులును అని లెక్కజేయబడెను. 10

చాలసవుడు మొవ్వుటాకులును, కొన్ని లేత యాకులును చుట్టుకొని పోవుటచేసెను, ముదిరిన యాకులు కూడ కొన్ని మొవ్వుపైపునను గొంతవరకు లేచి వాని చుట్టమును ఆసలను యెండనుండి గొంతవరకు కాపాడుటచేసెను. నీ సస్యముల వరపునకు బాగుగ నాగగలడు. ఈస్థితిలో యిక్కయెదుగ లేక పోయినను వారములకొలది బ్రతికియుండి మరిల వర్షముల గురియగనే యెదుగ నారంభించును. ఇట్లు వరపు నెదుర్కొని పెరుగుటకు దగిన నిర్మాణమును గలిగియుండుటచే హెచ్చుతేమ జొన్న మొక్కకు బసికిరాదు. కావున దీనిని విస్తారము వర్షముగురియు ప్రదేశములందుగాని, కాలములందుగాని సాగు చేయ వీలులేదు. తొలకరి జొన్నలను సాగుచేయు కాలమున 10-15 అంగుళముల వర్షముకన్న హెచ్చుగ గురియు నెడల నీసస్యము చెడును. 20 అంగుళములకంటె హెచ్చుగ నైఋతి వర్షములు గురియు ప్రదేశములందు జొన్నలను తొలకరిలో పైరు చేయుటకు సామాన్యముగ వీలుకాదు. కాని నీరు నులభముగ వడియు కొండ ప్రదేశములందు కొన్ని రకముల జొన్న (కొండజొన్న) వర్ష మింతకంటె హెచ్చుగ గురియు చున్నను సాగు చేయబడుచున్నది. పయరజొన్నకు సామాన్యముగ 10 అంగుళముల వర్షముకంటె హెచ్చుగా గురియుట యనుకూలము గాదు.

మరియు జొన్నకు విత్తిన పిమ్మట కొంతకాలము వరకును, పంటకాలమునను అధిక వర్షము మరింత చెరువు చేయును. కావున సామాన్యముగ నాయాప్రదేశములందా యానెలలలో గురియు వర్షపు పరిమితినిగమనించి అనుభవము

వలన సంపద జొనుటకు జల్లుకాలుము విర్లయించబడియున్నది. అంతేగా గతకాలము పురిమిముట్టుకు నుండి కాలమును గూడ గమనించి, అందుకు అనుగుణముగా మూడవ పుస్తకాధ్యాయమునకు విత్తెడి గురియును, అందుకు అనుగుణముగా చివరకు చలించుమును సర్వములను గూడ గమనించుచు రింజ వెన్నులు తడిసిన పిమ్మట స్వయంగా నానటచే చచ్చి వెన్నులను వేయు రకము లంత గాఢద్రవ్య కావున, కొంత కాలమున వర్షము గురియుచోట్ల రింజ రకములుగూడ అట్టి భయము లేనిచోట్ల ముద్ద రకము లును నొకటి చలించును మూడుగూడ అంతటి చీకటియైన నా యా ప్రాంతములందు నైయుతి వర్షములును, తూర్పువర్షములును గురియు నారంభించు లేక విస్తరించు కాలమున బట్టియు నేల యొక్క స్వభావ భేదములనుబట్టియు జొన్నలనుజల్లు ముఖ్య కాలములీక్రింద వివరింప బడును.

1. రామలక్ష్మీని గురించి - (a) పునాది లేక ముంగారు పంట:- జూన్-జూలై  
(b) పయర లేక పింగారు పంట:- సెప్టెంబరు-నవంబరు

2. నెల్లూరు, గుంటూరు - (a) పునాది పంట:- మే-జూన్.  
(b) పెద్దపంట:- జూలై- సెప్టెంబరు  
(c) పయరపంట:- నవంబరు-డిసెంబరు.

3. ఉత్తర సర్కారులు - (a) తొలగి పంట:- జూన్

\* ఇదియే ఈ జిల్లాలలో సోన్న సామాన్యముగ విత్తబడు కాలము.

2 ఇది గుంటూరువచ్చు కాలమున సామాన్యముగ వర్షము లధికముగ గురియుటచే తరుచు పేదకే ఉపయోగింపబడు చుండును.

(b) పెద్ద లేక పనుగనూట:- అగస్త్య-అశ్వత్థామరు  
ముఖ్యముగ (పెద్దెంబరు)\*

నీరు పెట్టి జొన్న రకములను తెలుగుజిల్లాలో సామాన్యముగ వేయిలో అనగా మార్చి, ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలలలో విత్తుదును. నెల్లూరు జిల్లాలో జూలై-అగస్త్యులలో గూడ జల్లుట గలదు.

వర్షపాతమునందలి హెచ్చు తగ్గులే గాక ఆయా కాలములందామూ దిశలనుండినను వాగువృక్షాడ కొంతవరకు జొన్నచేలకు నుంచి శబ్దరలను గలుగజేయునని రైతుల యనుభవము. “బోదనం న తోలితే కాదనం నాడు”నని సామెత. దీనినిబట్టి పైజొన్న చేలకు కొండగాలి యనుకూలముని యభిప్రాయము. కొండగాలి సామాన్యముగ పొడిగ నుండుటచే గింజ పాలుపోసికొని గట్టిపడుటకది యనుకూలముగ నుండును. ఇట్లే పయరగాలి పయరజొన్న చేల కనుకూలముగ నుండును. దీనికిబదులు తూర్పుగాలి వీచినయెడల తెగుళ్ళును, చీడలును హెచ్చును. తొలకరి జొన్నలు ఫలించు కాలమున తూర్పుగాలి వీవ ప్రారంభించుట మంచిదిగాదు. అంతకు ముందే వెన్నులు ముదరవలెను. ముదరనిచో వెన్నులకు తేనె మంచు (ఇదియొక విధమగు పురుగువలన గలుగును) పట్టి నల్లబడును.

---

\* సామాన్యముగ తేలిక నేలలలో ముందుగను, పల్ల నేలలలో వెనుకగను జల్లుదురు.

\* బోదనం అనగా కొండగాలి లేక వాయవ్యపు గాలి.

## నేల

జొన్న విస్తారముగ కృష్ణ రేవడి నేలలును, ఎర్ర నేలలందును సాగు చేయబడుచున్నది. మిక్కిలి వర్షముగల కొన్ని గరువకొడి నేలలలోగూడ నీటి ప్రేగుచేయుచునున్నది. కొన్ని చోట్ల నీ సస్యము పెడలి నేలలలోను, చిట్టనేలలలోను, యిసుకకొడి నేలలలోనుగూడ పైకుచేయుబడుచున్నది.

జొన్న సాగుచేయబడు కృష్ణరేవడి నేలలు వర్షము తక్కువగ గురియు చాచులనీమి జిల్లాలలో విరివిగను కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలలో కొంతవరకును గలవు. విశాఖపట్నం జిల్లాలో కొన్ని చోట్లగూడ నిట్టి నేలలకుదుగ గలవు. కృష్ణ రేవడి నేలలు తేమనుపట్టి యుంచు శక్తి గలిగియుండుటచే వర్షలోపము గలిగినను నందీసస్యము కొంతవరకయినను ఫలించుచుండును. కాని వర్షము హెచ్చుగ గురియు సంవత్సరములో చెడును. కావున నీ నేలలలో జొన్న సామాన్యముగ వర్ష కాలాంతము సమరపంటగ మూత్రము సాగు చేయబడు చున్నది. తొలకరి పంట యరుదు. కాని కృష్ణ, గుంటూరు జిల్లాలలోని రేవడి నేలలందు తొలకరి జొన్నలను తరచు మేతకొరకు జల్లుటగలదు.

ఎర్ర నేలలను, యితర గరువకొడి నేలలను ఆయా ప్రాంతములందలి వర్షపాతపు స్వభావమునుబట్టి తొలకరి పంటకును, పెద్ద పంటకును, పయరపంటకును గూడ ననుకూలముగ నున్నవి. విశాఖపట్నం, గోదావరి జిల్లాలలో వర్షము హెచ్చుగ గురియు ప్రదేశములందలి కొండ ప్రాంతములలోని ఎర్ర నేలలలో కొండజొన్నలు గుగడెడుగనుచున్నది. నేలలు సత్తువైన



వగుటచే నీ చేలు నుమూరు 10-12 అడుగుల వర కెదిగి పెద్ద నెన్నులను వేయుచున్నవి. వర్షపాతము మధ్యనుముగ నుండు కృష్ణ, గుంటూరు జిల్లాలలో యెర్రనేలలందు గూడ తొలకరి లేక పునాన జొన్న రకములు సాగుచేయబడు చున్నవి. వీని పెరకువ నేలయొక్క సత్తువనుబట్టి యుండును. అది మిక్కిలి యిసుకకొడిగ నుండినగాని, కంకర కలిగియున్న గాని పంట తక్కువ. ఎర్రనేలలందు అంతటను పెద్ద జొన్న రకములును, నెనుకగ వర్షములు గురియుచోట్ల పయరజొన్న రకములును గూడ సాగు చేయబడుచున్నవి. ఎర్ర నేలలలోని జొన్నచేలకు సామాన్యముగ చెద బాధ కొద్ది గొప్ప యుండును.

నదీ ప్రవాహములచే నేర్పడిన వండలి నేలలందుగూడ జొన్నచేల పెరకువయు పంటయు గూడ బాగుగ నుండును. గోదావరి కృష్ణలంకనేల లిందు క్షాంతములు. ఇచట వరద కాలము చాటిపోయిన పిమ్మటనే విత్తులను బల్లవీలగును. వరద రానిచోట్లసైత మిట్టి ప్రదేశములందు జొన్నను తరచు పయరపంటగానే పెట్టుదురు. నేలయొక్క జగురునుబట్టియు, జలనిర్గమనమునకు గల వీళును బట్టియు జొన్నచోట్లముదురు గను (మఖ పుబ్బ కాత్తెలలోను) జొన్నచోట్ల ఆలస్యముగను (ఉత్తర, మాస్త, చిత్త కాత్తెలలోను) చల్లుచుండుదు. జొన్న మొతక ప్రదేశములందు తొలకరిని కొండ జొన్నలను విత్తుటయు గలదు.

పాటి నేలలలో వర్షము బాగుగనున్న సంవత్సరము లలో జొన్నచేలు బాగుగ నెదిగి ఫలించును. నీరు కట్టి సాగు

చేయుట కిట్టి నేల అనుకూలములు. వీనిలో సత్తువ హెచ్చుగ నుండుటచే నిట్టి నేలలు మేళ జొన్నకు బ్రశస్తము.

సముద్రము, లేక సదీ సమీపమునగల యిసుకకొడి నేలలలోగూడ నీ సస్యము కొన్ని చోట్ల-ముఖ్యముగ నెల్లూరు జిల్లాలో-సాగు చేయబడుచున్నది. ఇట్టి నేలలలో నెరువును హెచ్చుగ నుపయోగింపవలసి యుండును. విస్తారముగ సత్తు వచేసి నీరుకట్టునెడల కిట్టి నేలలందును మంచిపంట పండును.

వర్షాధారపు మాగాణి భూములలో గూడ నీటిలేమిచే పరినాట వీలుకానపుడు వరికి తరుణము మించినవెనుక జొన్న లను విత్తుట గలదు. పిమ్మట నధికవర్షములు గురిసి చేను చెడకపోయినచో పంట సామాన్యముగ నుండును.

చౌటికొడి నేల లితర సస్యములకువలెనే జొన్నకును అనుకూలములుగావు. ఇందు గింజల మొలకయే జ బ్బు గ నుండును. మొలచిన పిమ్మట వరిపసచో నేల త్వరలో బిగిసి పోయి సస్యము చెడును. కావున నిట్టినేలకు తరచు వర్షము పడుచుండవలెను. కాక వర్షమధికము కాగూడదు. వర్షము మితముగ గురియు తరతరము అందు జాయ కుదిగి కొన్ని చౌటికొడి పట్టణములలో జొన్న బాగుగ ఫలించుట గలదు. గింజలును శ్రేష్ఠముగ పెంచబడు చున్నవి. నీరుపెట్టి సాగు చేయు కొన్ని చౌటికొడి గ్రామా నేలలలోగూడ నీ సస్యము బాగుగ ఫలించుట గలదు.

పరిపరి న్నినములు, ముక్కిములు

కృష్ణ రేవడి నేలలలో జొన్నతో మార్చి పట్టు ముఖ్య సస్యములు ప్రత్తి, వేరుసెనగ, సెనగ, పొగాకు, మిర్చియు

నై యున్నవి. రాయలసీమలో సామాన్యముగ నొక యేడు పయర జొన్నను ఏదైన కాయ ధాన్యముతో గాని చమురు పంటతో కలిపి పెట్టి మరుసటి సంవత్సరము కొర్రయు, ప్రత్తియు కలిపి సాగు చేయుదురు. అరుదుగ మూడవ యేడు వేరుసెనగ గాని, సెనగ గాని పైరు చేసి జొన్నను మూడేండ్ల కొకసారి సాగుచేయుట గలదు. రెండేండ్ల పరివర్తనముకంటె మూడేండ్ల పరివర్తనమున జొన్నలు హెచ్చుగ బండుటయే గాక మొత్తముమీద నెక్కువలాభము చేకూరెనని సంధ్యాల వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానమున దేలెను.<sup>11</sup>

కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలలోని రేవడి నేలలలో జొన్నను కాయ ధాన్యములతోను, చమురు గింజలతోను కలిపి 3-4 సంవత్సరముల కొకసారి పొగాకు, మిరిచ్చి, పత్తి, వేరుసెనగ, గంట మొదలగు నితర సస్యములతో పరివర్తనము గావించుట.

పునాస జొన్నను పెట్టుచోట్ల నా సంవత్సరమే పయర కారున పొగాకు, మిరిచ్చి, వంగ, ధనియం లేక ఉలవ సాగు చేయుదురు. కొందరు పయర జొన్ననే పెట్టుటయు గలదు. రేవడి నేలలో జొన్నతోకలిపి సాగు చేయబడు కాయ ధాన్యములు కంది, పెసర, పిల్లిపెసర, తీగపెసర, బొబ్బర, అనుము, సెనగయునైయున్నవి. చమురు దినుసులలో నూపు, కుసుంబా, ఆముదములు ముఖ్యములు. కొన్నిచోట్ల జొన్నతో కొర్ర, గంట, పరిగ మొదలగు తృణధాన్యములు సైతము కలిపి సాగు చేయబడుచున్నవి. గుంటూరు జిల్లాలో కొన్ని చోట్ల

జనుము, గోగు, నక్కదోస, పాలకాడ (పశువులమేతకొరకు) గూడ జొన్నజోకలిపి సాగుచేయుట గలదు.

గోదావరి లంకలతో పయరజొన్నను కాయధాన్యము లతో కలిపి పొగాకు, మిర్చి, వంగ, మొట్టవరి + కంది + ప్రత్తి మొదలగు వానితో పరివర్తనము గావించుదురు. ఎర్ర నేలలలో గంటె, కొర్ర, చోడి, నూపు, వేరుసెనగ మొదలగు వానిని తొలకరిలో బెట్టి పయర కాయన జొన్నను కాయధాన్యము లతో గలిపి పెట్టుదురు.

కొండ పోళ్ళలో జొన్న (కొండజొన్న)ను ఇతర తృణ ధాన్యములతో-ముఖ్యముగ గంటెతోను, కొర్రతోను కలిపి-తొలకరిలో విత్తుదురు.

నూతుల యాధారముగల నేలలలో జొన్నకు నీరుపెట్టి నను పెట్టకున్నను దీనిని నీరుపెట్టి సాగుచేయు నితర సస్యము లతో మార్చి పైరు చేయుదురు. ఇందు ముఖ్యమైనవి మిర్చి, పొగాకు, చోడి. చుంపజాతులు, కూరగాయలు. ఇట్టి సస్యము లకు ఎరువు విస్తారముగ నుపయోగింపబడు చుండుటచే వీని తరువాత సాగుచేయబడు జొన్న తరుచు మంచి పంటల నిచ్చు చుండును.

నీరు పెట్టి సాగుచేయు జొన్నతో నైనను చాల వరకు పై సస్యములే మార్చి పెట్టబడును. కొన్నిచోట్ల మొక్క-జొన్న, గోధుమ కూడ పరివర్తనమునందు జేరును.

నల్ల నేలలలోను, ఎర్ర నేలలలోను గూడ జొన్నను ప్రత్యేకముగ సాగు చేయువారు కూడ నరుదుగ గలరు.

ఈ క్రింద ఆయా నేలలకు దగిన మాదిరి పరికర్తనములు జొన్న తెలుపబడుచు.

### 1. లేవడి నేలలకు

- 1 వ సం॥ పయరజొన్న, కాంధాశ్యములు కలిపి
- 2 వ సం॥ కొక్క, ప్రత్తి కలిపి.
- 3 వ సం॥ వేరు పెనగ.

### లేక

- 1 వ సం॥ పుకాసజొన్న, పిల్లిపెసర కలిపి. పిచ్చుట ధనియం.
- 2 వ సం॥ ప్రత్తి, కంది కలిపి.
- 3 వ సం॥ పొగాకు లేక మిర్చి.
- 4 వ సం॥ వేరు పెనగ.

### 2. ఎర్ర నేలలకు

- 1 వ సం॥ పయరజొన్న, కాంధాశ్యములు కలిపి.
- 2 వ సం॥ తొలకరినూపు, తరువార ఉలవ.
- 3 వ సం॥ గంటె, మినుము కలిపి.
- 4 వ సం॥ వేరు పెనగ.

### 3. వండలి (లంక) నేలలకు

- 1 వ సం॥ జొన్న, కాంధాశ్యములు కలిపి.
- 2 వ సం॥ మెట్టవరి, కంది కలిపి.
- 3 వ సం॥ పొగాకు, మిర్చి, లేక వంగ.

జొన్నకు దుక్కి పొచ్చుక కావలసి యుండును గనుక అంతకు ముందు పెట్టబడు సస్యము నేలనుద్రవ్వి మహనూలు చేయదగినట్టిదిగ నుండవలెను. ఉ. వేరు పెనగ. మ రి యు జొన్న పంట నేల యందలి సారమును విస్తారముగ దీసికొనున దగుటచే దానికి ముందు సాగు చేయబడు సస్యము పొచ్చుక యెరువు వేయునది లేక మంద కట్టబడునదియై యుండ

పలెను. ఉ. మిన్న, బొగగు చేక చేయించలి సారము  
నంతగా తీసికొనిక బొగగుగ నేను బాంబుట్టియు, విన్నాము  
ఆకు రాబుట్టెట నిలన నెల సారి నేను తీసికొనియు, నన్న  
మును కొన్నకు ముందుగ నాచే చేయించెను. ఉ. కంది.

జొన్నతో మిశ్రణముగ సాగుచేయు నామానాస్య  
జాతుల ముఖ్య లక్షణములు.

1. జొన్న నొసిన పెరుక కా కొలిగాలు కైకికాకి  
ఫలించు కాయ దాన్యములు. ఉ. ఉవ, బొబ్బర.

2. జొన్న యెదుగుచున్నంతవరకును చిన్న మొక్కలుగ  
నుండి దానిని కొనిన పిమ్మట లోతుగ వేరు పోసి చునుగా  
నెదుగునవి. ఉ. కంది, నీలి.

3. దంటుతోచేరి దాని విలువను పెంచుచునవి.  
ఉ. పిల్లిపెనర.

4. నేలను గ్రమ్మి నర్పముచే మన్ను కొనివేయుటకు  
కుండ జేయునవి. ఉ. వేగుసెనగ, తీగ పెనర.

సామాన్యముగ జొన్నలను, కాయధాన్యములను సచు  
పాళ్లుగ గలిపి చల్లవచ్చును. కండులను మూత్రము న్నానవ  
వంతు కంటె కలుప నవసరము లేదు. జొన్న అంటె బొగగుగ  
నెదుగనికేలలో కాయధాన్యములు రెండు నుండులును,  
జొన్నలు ఒక వంతును కలిపి ముత్తపు పెరిమితి కై కెల్లు  
చేయవలెను. నీకు పెట్టి సాగు చేయునెడిది పాడ ము వంతుల  
జొన్నలతో నొకవంతు కాయధాన్యములను కలుపవచ్చును.  
ఆయా పరిస్థితులలో జల్లదగిన విత్తుల పెరిమితి ముందు  
తెలుపబడును.

జొన్న తరువాత సాగు చేయబడు సస్యములు..ముఖ్యముగ కృష్ణరేవడి నేలలలో ప్రత్తిచేను-బాగుగ పెరుగదని సామాన్యనుభవము. ఈ విషయమయి యీ దేశమున జరిపిన పరిశోధన వలన జొన్నచేను పెట్టినచోట క్రింది నేలనుండి సోడియం సంబంధముగ అనగా చౌడు ద్రవ్యములు గంట చేను పెట్టినచోట గంట పై భాగముగ హెచ్చెననియు, అందువలన నేల చెడి తరువాత సస్యము బాగుగ పెరుగదనియు కనిపెట్టబడెను. ఎందువలన జొన్న సాగుచేసిన నేల యిట్లు చెడునో సరిగా నిర్ధారణ కాలేదు. కాని తరువాతి ప్రత్తిచేని ఒత్తుగ చల్లుట వలన నీ నష్టము చాలవరకు కూడివచ్చునని మాత్రము తేలెను.<sup>12</sup>

### పైరుచేయు విధానములు

జొన్నను వర్షాధారమున సాగు చేయుటే సామాన్యపు పద్ధతి. విశాఖపట్నం, గోదావరి జిల్లాలలోని ఏజన్సీ ప్రాంతములందలి పోడుసేవ్యము నందు సాగులేకుండగనే విత్తులను జల్లుదురు. సామాన్యపు వ్యవసాయపు భూములలో విత్తులను వెదజల్లు విధాన మొకటియు, వరుసలుగ విత్తు విధాన మొకటియు గలవు. గంజాం, విశాఖపట్నం, గోదావరి జిల్లాలలో విత్తులను సామాన్యముగ వెదజల్లుదురు. కృష్ణా, గుంటూరు, నెల్లూరు జిల్లాలలోను, రాయలసీమలోను గొర్రుకో వరుసగ విత్తుట సామాన్యచారము.

వర్షాధారమున నారుపోసి యా నారును నాగటి చాలున నాటు పద్ధతియొకటి గూడ గంజాం, విశాఖపట్నం జిల్లాలలో కొన్నిచోట్ల వాడుకలోనున్నది.

నీరు పెట్టి చోటనస్యముగ సాగుచేయు సద్ధతులలో విత్తులను జల్లి మళ్ళుకట్టి తడుపుట యొకటి. విత్తులను వరుసలుగ జల్లి వాని మధ్యచాళ్ళలో నీరుకట్టట యొకటి. నేలను తడిపి వరుసలుగ జల్లి పిమ్మట తడుపకుండుటగాని, అవసరమయినచో తడుపుట గాని మరియొక పద్ధతి,

నీరు పెట్టి సాగుచేయు పద్ధతి గుంటూరు, నెల్లూరు జిల్లాలలోను, రాయలసీమ జిల్లాలలో కొన్ని చోట్లను గలదు. కాని యరుదు. కోయంబత్తూరు జిల్లాలో నీ పద్ధతి విరివిగ నవలంబింపబడి మంచి పంటలనిచ్చు చున్నది.

నీరు పెట్టి సాగుచేయు పద్ధతిలో గూడ నారు పోసి నాటు పద్ధతి కొన్ని చోట్ల (నెల్లూరు జిల్లాలో) గలదు. ఈ పద్ధతిలో దంటు తక్కువగను, గింజ లభికముగను నగును.

కొన్ని చోట్ల జొన్న నొకసారి కోసిన వెనుక యిలక పంటను బెంచుట గలదు. దీనికి నాముజొన్న యని పేరు.

### సాగు

జొన్న మొక్క మెట్టవరి, చోడి, ఆరిక మొదలగు వాని కంటె పెద్దదిగ నెదిగి వేరు లోతుగ బోయునదగుటచే నీసస్యమునకు వానికంటె చేలను సామాన్యముగ లోతుగ సాగు చేయవలయును. మరియు చాల చోట్ల నీ పైరు పర్ల కాలాంతమున జల్లబడు చుండుటచే విత్తులు చల్లినపిమ్మట పర్లమంతగ గురియక పోయినను సస్యము పెరుగుటకు తగినంత తేమను బట్టియుంచునట్లు నేలను బాగుగ తయారుచేయవలెను. మంచి వ్యవసాయదారులు పయరజొన్న వేయు గరుపకొడి నేలలలోను, ఎర్రనేలలలోను తొలకరిలో నితర సస్యమును దేనిని



సాగు చేయలేకపోయిన అల్పవర్షాన్ని నేలను దున్ను చూడవలసి, ఉత్తర సర్కారులలో సామాన్యముగ విల్లు 6-8 నాళ్లు దున్నుట యుగాధము. ఇట్లు పెక్కునాళ్లు నాగటితోనే దున్నుటకంటె మొదట రెండునాళ్లు బాగుగ (వీగుచో నినువనాగటితో) దున్నిన పిమ్మట నపుడపుడు గుంటకను పోలుచో పని కలిసి వచ్చును.

రేపడి నేలలు సామాన్యముగ వేసవిలో విస్తారముగ బీటలుదీయుటచే నట్టి నేలలలో లోతుదుక్కి యంతగా నవసర ముండదనియు తరచు లోతుగ దున్నినచో నేల క్రమముగ చెడవచ్చుననియు రైతుల యనుభవము. కావున రాయల సీమలో కొన్ని చోట్ల జొన్నయు స్రెత్తియు సాగుచేయు నేలలను ఏటేట నాగటితో దున్నుకుండ గుంటకతోనే సాగుచేయుచుండుదు. కాని 12-15 సంవత్సరముల కొకసారి మాత్రము-ముఖ్యముగ గరిక విస్తారముగ పట్టిన నేలలకు-స్రెత్తివేయు సంవత్సరమునకు ముందటి శీతకాలమున పెద్ద మడకతోగాని, యినువ నాగటితోగాని లోతుగ నొకసారి యన్నుచుండుదు. ఇట్లు దున్ని పిమ్మట తొలకరితో గడ్డలు నలుగుటకు గాను బారగుంటక యను బరువైన గుంటకను పోలుదురు. జొన్న వేయు సంవత్సరము స్రెత్తిమోడు పోవుటకుగాను శీతకట్టిన గుంటకపై మసేపి యెక్కి-గాని, రాళ్ళను బరువుపెట్టిగాని పోలుదురు. ఇట్లు చేయుచో మరల తొలకరిలో గుంటకను తోలి నేలను బాగుగ తయారుచేయు వీలగును.

అసలెప్పుడును దున్నుకుండ గుంటకతోనే సాగుచేయుట కంటె గాని, ఏటేట నాగటితో దున్నుటకంటెగాని పైన చెప్పి

నట్లు 4-5 సంవత్సరములకొకసారి మాత్రము లోతుగ దున్ని తక్కిన సాగు గుంటలలో పడుటచేత శ్రేష్ఠముగ వాగరిక్షేత్రమిదిలే సరిశోధనవలన దేవత.

గోదావరి క్షాంతి పండలి నేలలలోను, కాయలసీమ జిల్లాలలోను కొన్నిచోట్లను నైది చెప్పినట్లు గోమగ దున్నుటకు బదులు గునపములతో నేలను 4 సంవత్సరముల కొకసారి బెల్లువిరుచు ఆచారము గలదు.

కొండపోడు లంగు నేలను దున్నుకడ విల్లెలను బల్లినను నందు నరకిన కంప వగైరాలు అంటనే కాల్చబడుటచే నేల గుల్లబారి సస్యమునుకూలముగనే యెరుగును.

జొన్న వరపున గొంతవరకాగ గలదు. కాని యివక వలన త్వరితో చెడిపోవును. కావున జొన్న సాగుచేయు నేలలందు లోతుగ వేళ్లు పాడుటకును, తగినంత పదును నిలుపుటకును నైది చెప్పినట్లు సాగుచేయుట యవసర మయినను, అధిక వర్షము గురిసింపుడు నేల యివక జేయుకుండ మరల కొంతవర కణగి గుల్లదనము తగ్గునట్లు చేయవలెను. ఇందుకు గాను విశాఖపట్నం జిల్లాలోని తేలిక నేలలందు పెండ్లెసిసాన్ని దున్నిన నెనుక పదునుపట్టును నోలుదురు ఓర్వదేశమున నిచ్చెనవంటి మరియొక ససిమ్మను (స్థాయి) లాగింతురు. ఇందువలన గడ్డలు పెరిగి నేల కొంతవర కణగును. ఇట్లు తయారుచేసిన నేలపై గొర్రెలను, మేకలను మందగట్టుటవలన గూడ నేలయొక్క గుల్లదనము తగ్గును. కావున నేను సత్తువ జేయుట కవలంబింపబడు నీ పద్ధతి నేలను సారివంతముగ జేయుటకే గాక బానిని సస్యమునకు తగిన భౌతిక స్థితిలో

నుంచుటకుగూడ తోడ్పడుచున్నదని వెల్లడిని జొన్న సెల సెల సెల  
యున్నది. జొన్నల్వేలి జిల్లాలో గొన్ని చోట్ల నేల సామాన్య  
బడుటకు గాను గొర్రెలను, మేకలను మందగట్టటకు బడుటకు  
వానిని పడుగు చేకలుగ తోలు ఆచారము గలదు. ఇట్లు  
100 గొర్రెలు, మేకలు గల మందతో రెండుగంటలు తొక  
యెకరము అనగా దినమునకు 4ఎకరములు తోలగలుగుదురు.  
కర్షకులు జిల్లాలో కొన్ని చోట్ల గుల్లదనము తగ్గించుటకు  
“తేమ సేద్యం” అనునొక నిధానము అవలంబింపబడుచున్నది.  
ఇందు నేల సామాన్యపు దుక్కి పడునుకంటె హెచ్చు  
తేమతో నున్నపుడే గుంటకను గాని, గొర్రెను గాని తోలు  
దురు.<sup>2</sup> కాని రేవడి నేలలను, జిగురుగా నుండు వండలి నేల  
లను లోతుగ దున్నుటవలన గలుగు గుల్లదనమిట్లు సుళువుగ  
తగ్గదు. రాయలసీమలోని రేవడి నేలలను ఏటేట దున్నక  
గుంటకను మూత్రమే తోలి విత్తుచుండుటకు చాలవరకిదియే  
గారణమని చెప్పవచ్చును.

జొన్న చేను పెరుగు కాలమున నేల గుల్లగనుండుట  
మంచిది కాకపోయినను వర్షములు తక్కువగా గురియు చేలు  
వరపున కాగి మంచి పంటలు పండవలెనన్న, విత్తుటకు  
ముందు నేల తగినంత తేమను పీల్చి వట్టియుంచునట్లు  
చేయుట చాల యావశ్యకము. కాని యిందులకు నేలను  
తరచు లోతుగ దున్నుచు వచ్చుటవలన పైని చెప్పినట్లు అది  
గుల్లబారి యధిక వర్షమగురిసి నపుడు సస్యమునకు హాని  
గలుగుటయే గాక యింకను నిర్ధారణ చేయబడని యే ఇతర  
కారణమువలననో నేల క్రిష్ణముగ కడిపోవుటకు సామాన్య

వ్యానుభవము. కావున ఏలేట బోనుగ కున్నట్లు బడులు నేలయొక్క పొటముచక్కగా చూడక-డ చిన్న చిన్న గట్లు వేయుచో వర్షపునీరు వైకలగా సాగలిగేకుండ నేలపై నిలచి చాలవరకు క్రిందికి నుచూరు 2 అడుగుల పొడవు నుండి కూడ పైకివచ్చి సస్యపు వేళ్ళకు క్రిమిగా నందుచుండునని యిటీవల పరిశోధనవలన దేలెను. ఒకానొక తణిఖిలో నేలను సామాన్యముగ దున్ని యిల్లు గట్లనే బోసు చేయుటవలన కురిసిన వర్షపు నీటిలో నూటికి 40.6 మాత్రము నేలలోనికింకెను. దున్ని గట్లు వేయకుండ నదలిగి దానిలో 10.1 వంతులు నూత్రమే యుంకెను. దున్నకుండ గట్లు మాత్రమే వేసిన నేలలో 28.6 వంతు లుంకెను. కావున దుక్కికంటెను గట్లువేయుటయే ప్రయోజనకారిగ దేలెను. ఇందువలన నేల గుల్లబారిగాని, యితర విధముగ గాని చెడకుండగనే నుది సస్యమునకు వలయు తేమనుబట్టి యుంచు నట్లు చేయ వలగును. ఈ తణిఖిలో దున్ని గట్లు వేయకుండ సాగుచేసిన బొప్పి చేసేకంటె గట్లువేసి సాగు చేసిన చేను నూటికి 35 పంతుల వొప్పన హెచ్చుపంట విచ్చెను. గట్లు వేయుటకు ఎకరము కిరీ 1-9-0 లు అయ్యెను. ఇదిపోనని నికర లాభము ఎకరమునకు రు 8-9-0 యుండును. <sup>13</sup>

### ఎరుపు వేయుట

జొన్న విరివిగ సాగు ప్రిదేశములందు వర్షబోవము గలిగి యుండు ప్రదేశములలో యిక్కడ-డ వర్షము వేయని వానికంటెను హిసమగుచుండుట గే నీ పద్ధతివలన తప్పవని

రెండువును యజ్ఞేష్వముగ వేయుటకు నెరతురు.\* కావున సామాన్యముగ పునానజొన్నకును, పండుబంటకును వర్షపుజాభిషేకమునుండుచోట్ల గూత్రము తామ్రము ఎరువు వేయుటకును. లేక ముగవట్టబడుచు వీరు పెట్టి నాగుచేయు సన్మమున రెండువు వేయుటకు నెరుదీరు సగత్యములేదు. తగినంత వేసినగాని లాభకరమగుసంత పంటయురాదు. గోదావరి, కృష్ణలంకలలోని పండలి నేలలందు మాత్రమే సన్మస్మిద్ధముగ సత్తువగలిగిన వగుటచే నందు తరచు ఎరువు వేయక పోయినను పంటలు పండును.

జొన్నకు వేయదగు యెరువులలో పశువుల యెరువు భానమయినది. ఎకరమునకు 120 కుంచములు (100 పౌనులు) జొన్నలును, సుమారు రెండుబండ్లు (2000 పౌనులు) దంటును నొసగు జొన్న చేను సుమారు 35 పౌనుల న త్రిజనిని, 10 పౌనుల స్ఫురత్పంచాల్లుజనిదమును; 32 పౌనుల పొటాషును తీసికొనును.<sup>10</sup> ఈ ద్రవ్యములను భర్తీ చేయుటకు సుమారు

---

\* హగరి క్షేత్రమున పదునొకండ్ల జేసిన యొక పరిక్షలో ప్రత్తితో పరివర్తనముగ రెండేండ్లకొకసారి యెరువు వేసియు వేరుకయు జొన్న పెట్టి చూడగా నచటి పరిస్థితులలో నెరువు వేయుట వలన గలిగిన పంట హెచ్చుదలకంటె కాలమాన పరిస్థితులవలన గలుగు వ్యత్యాసములే బలమయినవని తేలెను. జొన్న వేసిన ఆరుసంవత్సరములలోను ఒక సంవత్సరము పంట బొత్తిగాచెడెను. తక్కిన 5 సంవత్సరములలోను మూడేండ్లు యెరువు వేసినదియు, రెండేండ్లు యెరువు వేయనిదియు హెచ్చు పంట నిచ్చెను. ఎరువు వేయుటవలన సగటున సంవత్సరము 1 కి ఎకరమునకు 46 పౌనుల గింజలుమాత్రమే హెచ్చుగ పండగా దంటమాత్రము 346 పౌనులు హెచ్చుగ నయ్యెను 14

కి బండ్లు విడికొట్టవు టెరువును వేసిన చాలును. సామాన్యపు టెరువును రెట్టింపు వేయుట చువసరము. కాని పశువుల టెరువునందలి నత్రజని యంతయు నెంటనే సస్యమునకు లభింపకపోవుటచే పై పరిమితులగు రెట్టింపు వేయదగును. కాని యిది మరి యొకటి రెండు వైర్లకు కూడ పనిజేయును. అనగా నింత టెరువును రెండేండ్ల పరివర్తనమున జొన్నకు వేయుచో పరివర్తనమందలి యితర సస్యముల టెరువు వేయ నవసరముండదు. నంద్యాల క్షేత్రమున ఎరువు వేయకయు, ఏటేట టెరువు వేసియు, రెండేండ్ల కొకసారి వేసియు 12 సంవత్సరములు పరీక్షింపగా, ఏటేట వేయుటవలన రెండేండ్లకొకసారి వేసినప్పటికంటె సగటున కొంచెము హెచ్చుపంట పండినను దీనివలన వేసిన హెచ్చు టెరువు వెలకు సరిపోలేదు. క్రింది పట్టిక చూడుడు.

ఎకరము 1 కి సగటు పంట

	గింజలు	దంట
ఎరువు వేయనిది	427	1441
రెండు సంవత్సరములకొకసారి టెరువు వేసినది	910	2835
ఏటేట వేసినది	1036	2379

పశువుల టెరువు వేయుటకు బదులు తగినంత వర్షము గురియుచోట్ల పశువులను గాని, గొర్రెలను గాని, మేకలను గాని మంద గట్టవచ్చును. ఇందువలన నేలకు సత్తువజేరుటయే గాక 41, 42 వ పుటలలో వ్రాయబడినట్లుది యదుమబడుటచే పిమ్మట హెచ్చు వర్షము గురియుచో గలుగు నష్టముతగ్గును. సామాన్యముగ నెకరమునకు వేయి గొర్రెలను గాని, మేక

లను గాని కట్టడమును, సంస్కార క్షేత్రమున జరిగిన యొక తణిఖో కొని మందగట్టుటనగు గలిగిన ఫలితము నీక్రింది యుక్తము ప్రకటిస్తును. \* 4

ఎకరము 7 1/2 పంట — పొనులు

	మంద గట్టులు		మంద కట్టలు	
	గింజలు	దంటలు	గింజలు	దంటలు
1913-14	540	1220	760	1418
1915-16	584	1144	812	2526
1917-18	572	1000	494	1350

మధ్యసంవత్సరములలో గట్టు నాగు చే ముబడెను.

తొన్న చేలకు కొన్ని చోట్ల పసుపు, యెరుపు చాళువ పోవుటచే ఊర పెంటలు, పాటిమంటిని, వడలి మంటిని గుండ వేయుట గలదు. గోదావరి జిల్లాలోని పెండలి నేలలలో జొన్న విత్తడము నేలపై తొలకగిని సిచాయి పెసర \* అను నొక రకము పెసర చేనిని జల్లి కాచిన వెనుక కాయలను కోసికొని రొట్టను జొన్న కెరువుగా మున్నుట గలదు. ఒక్కొక్క ప్పడు ఐర్వాధిక్యముచే నీ సిచాయి పెసర చెడినపుడని కొయక ముందే దానిని దున్ని వేయుటయు గలదు. ఇట్లు మునుపగ దున్నిన సంవత్సరము జొన్న మంచిపంట నిచ్చును. ఇట్టి కొన్నిచోట్ల నీలి, పెసర, అనుము, జనుము, ఉలవ మొదలగు నాని రొట్టను గూడ ఒక్కొక్కప్పుడు జొన్న కెరువు గ దున్ను ఆచారము గలను. ఇట్లు దున్నిన పిమ్మట తగినంత వర్షము పడుటయు, దున్నిన నాటినుండి విత్తునప్పటిగోవల

\* ఈ రకము పెసర గెలలు మొక్కల కొనలగు మాత్రమే, గుండుట చే వీనిని గోసికొనుట సులభము.

అరు నాడెనులయినను గడగటయు అప సు ను. దున్నిన  
పిమ్మట నింకమాత్రీనైన. నానిధి జేపండు విత్తి న యెడల రొట్ట  
చీక యునియోగకాది గా మా ప్పను నెల సరినిచ్చు కులజో  
నిండువలన జొన్న చేసికెన నిసూడ గలను పుచ్చును. నేలయలదు  
రొట్ట చీకుటకును, జొన్న ముక్క తానుగుట్టకును గూడ తగి  
నంత తేమ లభింపకుండుటయే యిందుకు గానినము.

తగినంత వ్పను గురియునట్టిగాని, నీకు కట్ట వీలగు  
నట్టిగాని కొన్ని చొట్ట దుచ్చాగన లేకుండ తయారు చేసిన  
మాననపురీషమును\* జొన్న కెరువుగ నుపయోగించు  
చున్నారు. సంద్యా. జేల్లిమనండు దీనిని గండేండ్లు కలసాగి  
వేసి జొన్నను విత్తి చేసిన తణిఖలో నాల్గు పంటలపై సగటున  
నెకరమునకు ఎరువు వేయబడి 4331 పౌనుల గింజలును, 1000  
పౌనుల దంటును నీయగా యెరువు వేసినది 5834 పౌనుల గింజ  
లును, 1536 పౌనుల దంటును నిచ్చెను. ఎరువు వేయట  
మానిన పిమ్మట గూడ నీయెరువు వేసిన నేల సగటున ఎక  
రము 1 కి 818 పౌనుల గింజలను, 1538 పౌనుల దంటును  
నిచ్చెను.

జొన్నకు అముదపు పిండి మొదలగు సాగు సారము  
గల నేందియపు తుకువులును, అమ్మోని మాన లేట  
మొదలగు సరిందియపు తుకువులును గూడ వేసి పరిశ్చింప  
బడెను. కాని సామాన్యముగ వీని వలన గలుగు హెచ్చు  
పంట యెరువు ఖరీదానకు సరిపోదని తేలెను. పరిశ్చితులను

\* వీనికి పూడ్రీలు (Poudrette) అని తెలు. దీనిని రియరు  
చేయు విధానము వ్యవసాయ శాస్త్ర ప్రధాన పుస్తకములందు తెలుపబడినది.



కూలముగ నుండి తగినంత హెచ్చుపంట పండినపు డయినన పశువుల యెరువు వలన గలుగునంతటి లాభము వీనివలన గలుగదని తేలెను. కొనివేయు నత్రజని యెరువుల విషయ మయి యేయిట్లుండ జొన్నకు అట్టి స్ఫురపు తెరువులను గాని, పొటాషు యెరువులనుగాని వేయుట లాభకరముగ నుండదని వేరుగ వ్రాయ నవసరములేదు. పశువుల యెరువు, పెరిట, వండలిమన్న మొదలగు వానిని వేయు నేలలలో సామాన్యముగ నీద్రవ్యముల లోటు గలుగదు.

### విత్తుట లేక నాటుట

విత్తులను చల్లకముందు వానిని మొలక కట్టి చూచు కొనుట మంచిది. ఒక చిన్న గుడ్డలో గింజలను మూటగట్టి నీటిలో బాగుగ నాననిచ్చి మంటిలో పాతిపెట్టిన గి, 4 దినములలో మంచి గింజలు మొలచును. నూటికే 90 మొలవని యెడల నట్టి విత్తులు శ్రేష్ఠముగావు. కాని చల్లదలచుచో నట్టి విత్తులను వాని మొలకకు దగినంత హెచ్చుగ జల్లవలెను.

జొన్న విత్తులను జల్లెడపట్టి స్ఫుటముగను, బరువుగను నుండు గింజలను విడదీసి చల్లిన యెడల హెచ్చుపంట పండునని కనిపెట్టబడెను. ఈ పద్ధతి విశాఖపట్నం జిల్లాలో కొంత వరకు ప్రవేశపెట్టబడెను. బొంబాయి రాజధానిలో నిట్లు ప్రశస్తమగు గింజలను విడదీయుటకు తగిన యంత్రములను నెలకొల్పి వ్యవసాయ శాఖవారు రైతులకట్టి విత్తుల నందజేయుచున్నారు.

చేనికి కాటుక తెగులు పట్టకుండ జేసికొనుటకు జొన్న విత్తులను సంస్కరించు విధానము ముందు వివరింపబడును.

జొన్న విస్తారముగ సాగు చేయబడుచున్న దక్కను జిల్లాలలోను, కృష్ణా, గుంటూరు, నెల్లూరు జిల్లాలలోను నీ విత్తులు గొరుత్తో వరుసలుగ వేయబడుచున్నవి. ఇదియే ప్రశస్తమైన పద్ధతి. సామాన్యముగ జొన్నలను బట్లుటకు 6 చాళ్ళు గొరుత్తో ఉపయోగింపబడు చున్నది. కొన్ని ప్రాంతి రేవడి నేలలలో 6 చాళ్ళు గొరుత్తో కూడ నుపయోగమున గలదు. జొన్నలను బట్లు గొరుత్తో సామాన్యముగ 9 అంగుళ ములకొక చాలు పోయును. 10 $\frac{1}{2}$ -12 అంగుళముల దూర మున బోయు గొరుత్తులకూడ గలవు. వరుసలమధ్య దూరము సామాన్యముగ బీదనేలలలో 9 అంగుళములును, బలమయిన నేలలలో 12 అంగుళములును ఉండవచ్చును. ఇంతకంటె దూర ముండుచో నొక్కొక్కప్పుడు పంట తగ్గవచ్చును. సంద్యాల త్రేత్రమున ఆరు సంవత్సరముల వరకు జరిగిన యొక ప్రయో గమున జొన్నలను 10 $\frac{1}{2}$ , 16, 28 అంగుళముల దూరముగల వరుసలుగ విత్తి పరీక్షింపగా కాలమాన పరిస్థితినిబట్టి యొక సంవత్సర మొక పద్ధతియు, మరియొక సంవత్సరము మరియొక పద్ధతియు హెచ్చుపంట నిచ్చుచు వచ్చెను. ఎరువులను గురించిన పరిశోధనలందు వలెనే దీనియందును వరుసలమధ్య దూరముకంటె కాలమానస్థితి యందలి వ్యత్యాసములే పంట యందెక్కుడు హెచ్చుతగ్గులను కలిగించు చుండునని తేలెను.

నేలలో పదు నొక్కవగనున్నపుడు గొరుత్తును కొంచెము తేల్చియు పైనేల యారిపోయినపుడు కొంచెము లోతునకు

జోనిచ్చియు విత్తులను జల్లవలెను. పైన తగిన పదునులేనిచో నొక్కొక్కపుడు విత్తులను నాగటి చాలున కి-4 అంగుళముల లోతున వేయుటకూడ గలదు. జొన్నగింజ యిట్లు కొంత లోతున వడినను తగిన పదునున్నయెడల మొక్క పైకి పొడుచుకొని రాగలకత్తి గలిగియున్నది.\* సామాన్యముగ తొలకరి జొన్నలను తగిన వర్షములుగురిసి పదును క్రింది నేలకు గూడ దిగిన పిమ్మటను, పయతజొన్నలను పైనేల అంతగా పదునుగ తేనపుడును జల్లుట మంచిది. ఏలయన పయర జొన్నకు పైనేలలో సంతగా పదును లేకపోయినను క్రింది నేల పదునుగ నుండుటచే కొంచెము లోతుగ జల్లినయెడల పైరు బాగుగనే యంటును. హెచ్చుపదునున్నపుడు పై పైన జల్లినయెడల వేరు లోతుగవోక పిమ్మట వర్షము గురియనిచో నట్టి సస్యము వరపున కాగదు.

రాయలసీమలో జొన్నలతో నితర సస్యములను గలిపి గొర్రుతో విత్తునపుడు సామాన్యముగ నీ క్రింది విధానముల నవలంబింతురు.

1. కాయధాన్యములు:-పునాస జొన్నతో 5 లేక 11 జొన్న వరుసలకొక కాయధాన్యపు వరుస; లేక యైదు వరుసలకొక వరుస కంది మరి యైదు వరుసలకొక వరుస అలచంద, అనుము కలిపి. తెల్ల జొన్నతో ప్రతి

---

\* కొన్ని రకముల (ఉ. పచ్చజొన్న) జొన్న విత్తులు 4 అంగుళముల లోతున వేసినను మొలక పైకి లేవగలదనియు కొన్ని రకములు (ఉ. తెల్లజొన్న-సంద్యాల) 2 అంగుళములకంటె లోతున బడిన మొలక బాలవనియు కనుగొనబడెను. <sup>15</sup>

మూడవ వరుసలోను కూడ కాయభాగ్యములను చల్లుదురు.

2. జొన్న, జనుము కలిపి రెండు వరుసలు; ఒక వరుస బొబ్బర.

3. జొన్న, నూపు, గంటె కలిపి మూడువరుసలు; కంది, అనుము, బొబ్బర రెండవవరుసలో నడనముగా.

4. జొన్న, గంటె, నూపు 6 వరుసలు; 2 వ వరుసలో నడనముగా కంది, అనుము, బొబ్బర. 5 వ వరుసలో నడనముగా పెసర, ఆముదము.

కంది మొదలగు కొన్ని సస్యములను జొన్నతో మిశ్రణముగ ప్రత్యేకపు వరుసలో విత్తడలచుచో గొరుగ్గెనుక “అక్కడి” గొట్టము\* తో వానిని వేయుదురు.

గొరుగ్గెనుక విత్తులు చల్లిన యెడల చాళ్ళను కప్పుటకు వెంటనే గుంటకను తోలవలెను. ఇందు కువయోగింపబడు గుంటక బరువుగ నుండకూడదు. 3 చాళ్ళ గొరుగ్గెనుక విత్తునపుడు సామాన్యపు గుంటకయు 6 చాళ్ళ గొరుగ్గెనుక విత్తునపుడు దీనికిరెట్టింపు వెడల్పుండు బొరగుంటకయు నువయోగింపబడును. ఒక్కొక్కప్పుడు గుంటకకు బదులు దాని దిండు మాత్రమే లాగింపబడును. మడిలో గడ్డలు విస్తారమున్నపు డిట్లు చేసిన నవి కొంతవరకు పగులును. నేలలో పదును హెచ్చుగ నున్నయెడల గుంటకకు బదులు కంపతొడుగు తోలుట మంచిది.

\* పైన నొక కొయ్య లేఖ కొద్దెరచిప్పు యమర్షి, వెదురుగొట్టము.

గొర్రుతో 9 అంగుళముల యెడముగల వరుసలలో జొన్నలను వేయునపుడు ఎకరమునకు నుమారు 4 సేర్ల (8 పౌనుల) విత్తులు పట్టుచు. అయినను ఈపరిమితి వేయువాని నేర్పునుబట్టి యుండును.

సత్తువ తక్కువగ నుండుటచే ఎర్రినేలలలో విత్తులను హెచ్చుగ చల్లవలసి యుండును. 6 మొదలు 12 శేర్ల వరకు జల్లవలసి యుండు ప్రదేశములు గలవు.

వెదజల్లుపద్ధతిలో నేలను బాగుగదున్ని సిద్ధముచేసిన పిమ్మట తగిన యదనచూచి విత్తులనుజల్లి నాగటితో రెండు సార్లు తేలికగదున్ని కంపతొడుగు నోలుదురు. కొన్నిచోట్ల ఒకసారిమాత్రమే దున్నుటగలదు. ఇట్లు విత్తులను కలియ దున్నుటకు సామాన్యముగ గొరక (అరిగిపోయిన) నాగళ్ళ నుపయోగించుట మంచిది.

వెదజల్లునపుడు గొర్రుతో జల్లునప్పటికంటె హెచ్చు విత్తులు పట్టును. సామాన్యముగ నాలుగుశేర్ల విత్తులు గొర్రుతోవేయుచోట 6 శేర్ల గింజలు వెదజల్లువలెను. ఐనను గోదాపరిజిల్లాలోని కొన్ని వండలి నేలలలో ఎకరము 1కి 2-2½ శేర్లు మాత్రమే వెదజల్లి మంచి పంటలను దీయగలుగుచున్నారు.

వెదజల్లినపుడుగాని, గొర్రున వేసినపుడుగాని జొన్నలలో గలిపి విత్తబడు నితరజాతుల గింజలపరిమితి 37 వ పుటలో స్థూలముగ నూచింపబడెను. ఆ యా సందర్భములలో వేయదగిన సరియైన పరిమితియందు కలిపి సాగుచేయ

బడు జాతులనుబట్టియు, వానినివేయు వరుసల సంఖ్యలనుబట్టి లేక వానికీడుబడు ప్రాముఖ్యతను బట్టియు నిర్ణయింపబడుచుండును.

విత్తులను నాగటిచాలునవేయుపద్ధతి దక్షిణాదిని కొన్ని చోట్ల గలదు. ఆ ప్రదేశములందు గొర్రు నుపయోగించు వాడుక లేకపోవుటచే నేలయందు పదును తక్కువగనున్నపు డీ పద్ధతి యవలంబింపబడుచున్నది. నాగటి చాలులో విత్తులను వేయునపుడు గొర్రుగో వేయునప్పటికంటెను గూడ నించుక పొచ్చు విత్తులు పట్టును.

వర్షాభారమున నారు పెంచి నాగటిచాలున వేయు పద్ధతి విశాఖపట్నంజిల్లాలో గలదు. బాగుగ దున్ని సత్తున చేసిన 5 సెల్ల నారుమడిలో 4-6 శేర్ల విత్తులుచల్లి పెంచిన నారు ఒకయొకరమునకు సరిపోవును. బాగుగదున్ని సద్ధముగ జేయబడిన నేలలో నొక నెల లేక యారువారము తెదిగిననారు వర్ష ప్రసదునునదీయబడి నాగటిచాలున సుమారు జానెడుకొక మొక్కచొప్పున చాలువిడచి చాలున వేయబడును. ఒక చాలుగో వేసిన మొక్కలు మరియొకచాలునుండి లేచిన మంటిచే గప్పబడును. ఇట్లు వేసినచో వరుసలు సుమారొక యడుగుదూరమున నుండును. బలమయిన నేలలలో కొంచెము పెద్దనాగటి, సుపయోగించుటచేగాని, చాళ్ళను కొంచె మెడముగ తోలుటచేగాని వరుసలమధ్య 15 అంగుళముల దూరముండునట్లు చేయవచ్చును.

నాగటిచాలున మొక్కలు వేయునపుడు సామాన్యముగ నాగళ్ళసంఖ్యనుబట్టి యొకపూట వేయదగిన విస్తీర్ణ

మున వెలుపటివైపున ప్రారంభించి చుట్టును ద్విస్తూ చు క్రవముగ నాగళ్ళను మధ్యకు పోనిత్తురు. ఇట్లొకసారి నాకునేని పూర్తిచేయు ప్రదేశమునకు 'బొంగరము' అని యందురు.

నీరు పెట్టి సాగుచేయు పద్ధతిలో నేను బాగుగ దున్ని సిద్ధము చేసిన పిమ్మట విత్తులను వెదజల్లి శౌండుసార్లు కలియ దున్నుదురు. కొన్ని చోట్ల మాత్రము గొప్పగా విస్తరించు పడుగు పేకలుగ రెండుసార్లు విత్తు ఆచారము గలదు. విత్తులను జల్లిన పిమ్మట నీరు కట్టుటకు శగిన మళ్ళుగట్టి బోదుల నేర్పరతురు. కొన్ని చోట్ల మొదట నేలకు తడిపి పదునైన పిమ్మట గింజలను జల్లి పిమ్మట మళ్ళకు బోదులను ఏర్పరచుటయు గలదు. సామాన్యముగ నీ పద్ధతయి కురుచగ నెదుగుటచే ఒత్తుగ జల్లినగాని తగినంత పంటరాదు. మరియు విత్తులు చల్లిన పిమ్మట మళ్ళకు బోదులను యేర్పరచుటలో కొన్ని గింజలు గట్లలో లోతుగ కప్పబడుటయు, పోగులుగ పడుటయు సంభవించును.

నాగటిలో చాళ్ళను పోసి నీరు కట్టుటకు శగిన బోదులను చేసి యా చాళ్ళలో విత్తులను చల్లి కప్పి నీరు కట్టిన పద్ధతి కొన్ని చోట్ల గలదు.

నారు పెంచి నీరు పెట్టి సాగుచేయు పద్ధతిలో నారుమడి సిద్ధము చేసిన పిమ్మట నాగటి చాలున పడుగు పేకలుగ విత్తులను జల్లి గుంటక దిందును పైన దోలి చాళ్ళను కప్పి మరల నీరు కట్టక ఆ పదునుననే నారు పెంచుదురు. సుమారు 3, 4 వారములు నా రెడిగిన పిమ్మట మడికి నీరు పెట్టి, నాడును తీసి బోదులు మళ్ళు యేర్పరచిన నేలలో నీరు కట్టి నాటుదురు.

## ఉత్తరకృషి

‘ఏనుపావనానా పాస్తే (జొన్న) ఎవరికయినా పండును, అను సామెతె యీ సన్యమునకు ఆంతరకృషి మొక్క పాము ఖ్యతను తెలుపుచున్నది. గొర్రుతో జల్లిన వైరునకు మెల్లుగుంటక (పాపటము) తోగాని, జడ్డిగమును, గొట్టములును తీసివేసిన గొర్రుతో గాని ఆంతరకృషి చేయవచ్చును. \* మొక్కలెదిగినకొలదిని పై సనిముల్లుపయోగింప వీలుపడదు. కావున సామాన్యపు నాగటిని గాని, దంతులను గాని యుపయోగింపవలసి యుండును. పై పనిముట్లు వాడుకలో లేని చోట్లను నేలలో రాళ్ళు, కంకర విస్తార ముండినను మొదటి నుండియు నాగటితోనే ఆంతరకృషి చేయవచ్చును.

సామాన్యముగ మొక్కలు కలుపు కట్టకముందు మాత్రమే ఆంతరకృషి చేయదగును. కలుపు కట్టుటకు సునూరు పెండుమాసములు పట్టును. ఈలోపున మాడునాలుగు స్థాయిలను ఆంతరకృషి సలుపవలెను. పిమ్మట వర్షము గురిసినచో మరల నాంతరకృషి చేయవచ్చును, కాని మొక్కలు విరిగిపోకుండ జాగ్రత్తగ పని చేయవలెను.

ఇటీవల సన్యమును వర్షలోపమువలన చెడకుండ కాపాడుటకు జరిగిన పరిశోధనలవలన నేలలో పడును నిలుపుటకు తరచు ఆంతరకృషి చేయుట మాత్రమే తగినంత ప్రయోజన

\* చేను లేకగ సన్నపుడు కలుపులు మొక్కలను దొక్కివేయు సని తోచినచో నొక్కొక్కప్పుడు మొదట నొకసారి చేతి పనిముట్లతో గొప్ప శ్రవ్యుటయు గలదు.



కారి గాదనియు, 44 వ పుటలో వ్రాయబడినట్లు విత్తుటకు ముందే నేలగూడ తగినంత వర్షపునీటిని పీల్చునట్లు చేయుట చాల యవసరమనియు దేలెను.

వెదజల్లిన పైరునందొక సారి (జల్లినపిమ్మట 2-3 వారములకు) గొప్ప త్రవ్వ కలుపు తీయవలెను. అవసరమయినచో మరల నొకసారిగూడ గొప్ప త్రవ్వవచ్చును. కొన్నిచోట్ల నాగటిని తోలి చేనిని పలుచన చేయు నాచారముగలదు. గోదావరి జిల్లాలోని పండలి భూములలో మొదట నొకసారి కలుపు మాత్రము తీసి పిమ్మట చేను కు తు చు గ నుండగనే పండ్ల మ్రానిని తోలుదురు.

నీరుకట్టి పైరు చేయు ప్రదేశములలో చేతి పనిముట్ల తోనే గొప్ప త్రవ్వవలసి యుండును. ఇట్టినేలలలో కలుపును విస్తారము పట్టుచుండుటచే నీ పనిని శ్రద్ధగ జేయవలసి యుండును.

ఆంతరకృషి గాని, గొప్ప త్రవ్వటగాని పయరజొన్నల కావశ్యకమైనంతగా తొలకరి జొన్నల కావశ్యకము గాదు. ఈకాలమున వర్షము లెగబెట్టినపుడే ఆంతరకృషి జేసి పడును నిలువబెట్టవలెను. వర్షములు క్రమముగ గురియ్యుచో కలుపు తీయుచుండిన చాలును.

నాము జొన్నచేలలో మొదటిపంట కోతయైనపిమ్మట పడునున్నచో గొప్పత్రవ్వ పిమ్మట నీరుకట్టుదురు. లేనిచో నీరుపెట్టి యీరపనిజేయుదురు. పకుసలుగనున్నచో పశువులచే లాగబడు పనిముట్లతో నాంతరకృషి సలుపవచ్చును.

## నీరుకట్టుట

నీరుకట్ట నాగుచేయు వివిధములగు వద్దతులవివరములు చాలవరకు నీనుకట్టి శీర్షికలక్రింద వ్రాయబడెను.

సామాన్యముగ నీరుకట్టువద్దఁ జేలికనేలలతోనే విస్తారముగ నవలంబింపబడుచున్నది. ఇట్టి నేలలలో సుమారు వారమున కొకతడి పెట్టవంసియుండును. నల్లనేలలో 10-12 దినముల కొకతడి చాలును. చుపటికొడి నేలలలో మాత్రము తరచు (సుమారు 5 దినముల కొకనాటి) నీరుకట్టవలసియుండును. నెన్ను వేయవలయును. సుమారు నీరు హెచ్చుగా కావలయును. గింజ గట్టడగనే నీరుకట్టుట నాపితేయవచ్చును.

సామాన్యముగ పర్వత లేనియెడల ఏక నేలలతో ఫలించు జొన్నకు మొలకతడిమొదలు సంటతడివరకు 8-10 సార్లు నీరుకట్టవలసియుండును. ఒక్కొక్కతడికి సామాన్యముగ అండుగుల అంగుళముల నీరు కావలసియుండును. మొలక తడికి మాత్రము కొంచెము హెచ్చునీరు పట్టును. మొత్తముమీద 18-22 అంగుళముల నీరు కావలసియుండును. సుమారు 24 అడుగుల లోతునుండి మోటతో నీరుతోడుచో అంగుళమునకు రు 1-8-0 లు అగును. మొత్తముమీద నెకరమునకు సుమారు రు 27-33 లు నీటిపారుదలకే యగును. వర్షము సహాయపడి యీ ఖర్చులు తగ్గించినగాని లేక పశువులు, మనుష్యులు యితర పనిలేనపు డీ పనిని చేసిననేగాని నీరుతోడి జొన్న సాగుచేయుట కిట్టుకాటుగనుండదు. కావున సామాన్యముగ నిట్లు సాగుచేయుటకు మూడు నాలుగు నెలలలోనే

పండునవిగ నుండు రకముల నెంచుటయే గాక వానిని వర్షములు గురియు శాలమునకు కొంచెము ముందుగ విత్తినయెడల పిమ్మట వర్ష సహాయము యెక్కువగ నుండుచోట్లనే యిట్టి సాగునకు కడగుదురు. మరియు మళ్ళికట్టు పద్ధతిలో కంటే గట్లు, చాళ్ళు యేర్పరచి నీరుకట్టు విధానమున నీరు కొంచెము పొదుపగును.

మొక్కలు లేతగ నున్నపుడు జొన్నకు చవకనీరంతగా వని కిరాదు. అట్టినీరు పెట్టుచో కొన్ని లేత మొక్కలు చచ్చును. కావున నట్టిచోట్ల గింజలను కొంచెము ఒత్తుగ చల్లుట మంచిది. మొక్క తెదిగిన పిమ్మట జొన్న కొంత వరకు నీరు చవకగుచున్నను భరించును. కొన్ని నూతులలోని చవకనీరు పెట్టుటవలన తీయని నీరు పెట్టినప్పటికంటే చేను బాగుగ నెదుగుటయు గలదు. అనీటియందుండు లవణవత్సార్థములు మొక్కలెదుగుటకు తోడ్పడుటయే ఇందుకు గారణము. ఇట్టి నీటివలన పండిన జొన్నలు దంపినపుడు పిండియగునందుట. సామాన్యముగ నెట్టినీరు కట్టినను గూడ గింజలును డంటును కూడ నీరుకట్టని గింజలవలె మనుష్యులకును డంటువలె పశువులకును తినుటకంత యోగ్యముగ నుండవని సామాన్యానుభవము.

### అరిష్టములు

తీయగనుండు రకముల కౌండములను నక్కలుకొట్టుట గలదు. అరణ్య సాగ్రతములందలి జొన్నచేలను తరచు అడవి పందులు నాశనము చేయును.

జొన్న పైరునకు జంతుకోటలోని ముఖ్య విరోధులు పక్షులు. గింజలు ముదర నారంభించినది మొదలు చేనిలో నక్కడక్కడ మంచెలువేసి వానిపైనుండి వడిసెలతో రాళ్ళను కుప్పటచేతను, డబ్బాలను కొట్టి ధ్వని చేయుట వలనను వానిని బెదరగొట్టుచుండని యెడల పంటలో చాల భాగము నష్టమయిపోవును.

కీటకములలో నీ క్రింది జాతులు జొన్నచేలకు కొద్ది గొప్ప నష్టమును గలుగజేయుచుండును.<sup>1\*</sup>

1. పీకపురుగు (Chilo Sp):—ఒకటి రెండు జాతుల దీపపు పురుగుల డింభములు లేత మొక్కల మొవ్వులలోనికి దొలుచుకొనిపోయి వానిని జంపును. ఒక్కొక్కవృషివి కాండమును గూడ దొలుచుకొని లోనికిపోవుట గలదు. అప్పుడు దానికి పుప్పి పట్టినదందురు. మొవ్వుచచ్చిన మొక్కల నెల్ల పీకి నాశనము చేయుటయు, చేను కోసిన వెనుక గుంటక తోలి కోతగాలును గోకివేయుటయు నీ చీడ బాధను తగ్గించు కొనుట కుపాయములు. ఇటీవల జరిగిన పరిశోధన ఫలితముగ కొన్ని పరాన్న భుక్కుల (parasites) నుపయోగించి యీ కీటకపు బాధను నివారించ వచ్చునని తేలినది.

2. నేల మిడుత (Chrotogonus saussurei):—మంటి రంగును వోలిన వర్ణము గల ఒక విధమగు చిన్న మిడుత లొక్కొక్కప్పుడు వృద్ధిచెంది రాయలసీమలో లేత చేలకు చాల హాని చేయుట గలదు. వలలందు బట్టుటయు, విషపు ఆరలను బెట్టిజంపుటయు నివారణోపాయములు. బి. హెచ్. సి, 10% పొడుమున జల్లుట ఉపయోగకరము.

3. అస్తిపురుగు (*Calocoris angustatus*):—  
 ఇది నల్లి కుటుంబమున జేరిన యొక జాతి ఆకుపచ్చసి పురుగు.  
 జొన్న సాగుగల ప్రదేశములన్నిటిలోను—ముఖ్యముగ రాయల  
 సీమలో—లేత చెన్నులకుబట్టి వాని యందలి రసమును పీల్చు  
 కొనుటచే వానిని కృశింపజేయును. ఈచీడ కాలమాన స్థితి  
 ప్రతికూలముగనున్న సంవత్సరములలో తరచు పట్టును. బి.  
 హెచ్. సి. 10% (గమెక్సేన్) చల్లుటద్వారా యీ చీడ  
 బాధను నివారించవచ్చును. చేను కురుచగనున్నపుడు ఈపురు  
 గులను వలలతోబట్టి చంపవచ్చును.

జొన్న పిండి పురుగు (*Pundaluoya simplicia*):—  
 ఇది నల్లి కుటుంబములోని మరియొక జాతి కీటకము. ఈ పురు  
 గులు లేతయాకులపై పోగులుగ బట్టి వాని రసమును పీల్చు  
 కొనుటచే నవి కాలిపోయి నట్లుగును. ముందుగ పట్టి న  
 మొక్కలను గనిపెట్టి పీకివేయవలెను. బి. హెచ్. సి. 5  
 చల్లి నివారించవచ్చును.

కీటకములలో జేరిన యొకజాతి తవుటి పురుగు (*Cholam mite-Paratetranychus Indicus*) గూడ ఆకులకు  
 విస్తారముగ బట్టుటచే నవి యెర్రబడి చేను నీరసించిపోవుట  
 గలదు. గంభకపుపొడిని నాలుగురెట్లు రోడ్డు దుమ్ముతో గలిపి  
 చల్లుటయే వీనికి నివారణోపాయము.<sup>17</sup>

వడ్లగింజలనుదొలిచి గుల్లచేయు నుసిపురుగు (*Calandra oryza*) ను, వడ్లచిలుక (*Sitotroga cerealella*)

అను నిర్వజేసిన జొన్నగింజలనుకూడ కొలిచి చాడుజేయును. ప్రతీకారము ముందు పీడరింపబడును.

వృక్షజాతిలోజేరిన 'బోడు' (*Strica lutea*) అను వరపుష్టము గొన్ని చోట్ల జొన్నచేలకు కొంత హానికలిగించుచున్నది. ఇది యితరకలుపుమొక్కలవలెనే చేలలో పెరుగును. కాని యీ మొక్కలు చానివలె నేలలోని సారమును దీసికొనక తమవేళ్ళను నొస్త మొక్కల వేళ్ళవలె ప్రసరింపజేసి వానియందలి సారమును పీల్చుకొనుటచే చాని నీరసించును. ఇట్లు నీరసించు మొక్కలు గొన్ని చచ్చుటయుగలదు. సామాన్యముగ నీబోడు తేలికనేలలలో పెచ్చుగ బయలుదేరును. జిగురుగనుండు నేలలలో సంతగా గానరాదు. సత్తువ నేలలలో నీబోడు బయలుదేరినను మొక్కలు దీని లక్ష్యపెట్టక పెరుగుచుండును. కాలహాసస్థితి స్థిరముగనున్న సంవత్సరములలో బోడుదలన సస్యమున కెక్కువ నష్టము కలుగును. జొన్నచేను కొంతవర కెదిగిన పిమ్మట నీబోడు మొక్కలు మొలచు సంవత్సరములలో వీనివలన బాధ తక్కువగ నుండును.

బోడు మొక్క నుమా రొక యడుగు యెత్తువర కెదిగి యితరజాతులవలననే పూచి, కాచి విత్తులను చాల్చును. ఈసంవత్సరము చాలినగింజలు మరుసటిసంవత్సరము జొన్నచేను చల్లినవెనుక నా మొక్కలతోపాటుగాని, కొంచెము వెనుకగాగాని మొలచి జొన్నచేలకు హానిచేయును.

తగినపరివర్తన మవలంబించుటవలన నీ బోడు బాధచాలవరకు తగ్గును. ఇది సామాన్యముగ గొన్ని తృణభాస్య

జాతులకే పట్టునుగాన జొన్నతో కాయధాన్యములు, చమురు దినుసులు మొదలగువానిని మార్చి పెట్టదగును.

‘బోడు మొక్కలు పెరిగి మనకు కనబడునరికి వానివేళ్లు జొన్న మొక్కలవేళ్ళపై ప్రవేశించి చేయదగిన హానిని చాల వరకు జేసియేయుండును. కావున వానిని పీకివేయుటవలన చేని కంత లాభముండదు. కాని యీ బోడు మొక్కలను గింజకట్టకముందు వానిని పీకివేయుచో వానివృద్ధికి నిరోధము గలుగుటచే కొంత మేలుకలుగును. అయినను కూలీలనుబెట్టి యీపని జేయించుట సామాన్యముగ కిట్టుబాటు గాకపోవచ్చును. మరియు నిట్లోకసారి మొక్కలను లాగివేసిన మాత్రమున నీ పరపుష్టమంతరించునని చెప్ప వీలులేదు. ఏలయన రాలిన గింజలన్నియు నొకేసారిగాని యాసంవత్సరమే గాని మొలవక దఫ దఫాలుగను తరువాతి సంవత్సరములలోనుగూడ అనుకూల పరిస్థితులమరుచో మొలచు చుండును. ఒకయేడు వంట నష్టమునకు ఒప్పుకొని తొలకరిలో ప్రారంభించి వర్ష కాలాంతమువరకు జొన్నలను నెలకొకసారి విత్తుచు అంతవరకు పెరిగిన మొక్కలను, వానితోపాటు పుబోడు మొక్కలను గూడ దున్ని వేయుచు వచ్చుచో నీ విత్తనము చాలవరకు నశించును.

బొంబాయిలో జరిగిన పరిశోధనలవల్ల, జొన్నవేళ్ళ చిగుళ్ళనుండి పుట్టు ద్రవము బోడు విత్తనములకు తగిలిన కాని ఆవిత్తనములు మొలవ వనియు, జొన్నను విత్తనియెడల సంవత్సరములకొలది విత్తెడి పటుత్వమునకు భంగకరము లేకుండ బ్రతికియుండి, తిరిగి 10, 15 సంవత్సరముల నెనుక

జొన్నను విత్తి నను, బోడు విత్త నములు మొలవ గలవనియు, కొన్ని జొన్నరకములకు బోడును తట్టుకొనే గుణము కలదనియు, అట్టిరకముల నుపయోగించుకొని సంపుటీ కరణము వల్ల బోడు పట్టని జొన్న బాతులను తృప్తి చేయవచ్చునని తేలినది. సంద్యాల పరిశోధన స్థానములో జొన్న బోడు నివారణ మార్గములను కనిపెట్టుటకు గాను, 1949 నుండి ప్రత్యేక పతకము మంజూరు కాబడి, కృషి సల్పబడు చున్నది. రసాయనిక పదార్థములను భూమిలో కలిపి గాని, బోడుమీద జల్లి గాని. బోడును అరికట్టవీలున్నను లాభదాయకము కాదనియు, బోడుకు తట్టుకొనే రకముల ఉత్పత్తియే సాధనమని, “బొంగన్ హైలో” (A. S. 4003) అనే ఆఫ్రికాదేశపు బోడు పట్టని జొన్నరకమును, సంద్యాల, గుంటూరు ఫారములలో ఎంచి తీసిన మేలుజాతి (ఎక్కువగ బోడు పట్టే) రకములను సంపర్కపరచి, బోడుపట్టని గుణముతో, దేశవాళీ రకముల, లక్షణ సంపుటీలుగల క్రొత్త రకముల నుత్పత్తి చేయుచున్నారు. ఇట్టి రకములు కొలది కాలములో విడుదల కాబడి, బోడు నుండి కలిగెడు నష్టము నరికట్టుట కుపయోగపడగలవు.

జొన్న చేలకు బట్టు తెగుళ్ళలో నీక్రిందివి ముఖ్యములు<sup>18</sup>:-

1. కాటుక తెగులు (Short smut-sphacelotheca sorghi): ఒకవిధమగు శీలీంధ్రమువలన గలుగు నీ తెగులు తగిలిన యొక్కల వెన్నులందు కొన్నిగింజలు తక్కినగింజల వలె పండిపదార్థముతోగాక నల్లని మసిరేణువులతో నిండి యుండును. ఇందువలననే యీ తెగులు కాటుక తెగులనబడు చున్నది. ఈ తెగులు తగిలినగింజలు తక్కినవానికంటె కొంచెము



10 వ నటము



నిడివి కాటుక తెగులు కలిగిన

జొన్న చెన్ను

పెద్దవిగనుండును. మరియుకటకము కాటుక తెగులు (Long smut-  
Tolyposporium tilliferum) పట్టుటవలన గింజలు పొడవగు  
టయు గలదు.

గింజలందలి కాటుక లేగువులే యీ తెగులును బుట్టించు శిలీంధ్ర మునకు బీజములు. ఈబీజములు జొన్న విత్తుల పంటముండి వాని పోగులు మొలచి మొక్కలలో బవేశించి వాని యంగములందు పెరుగును. కాని గింజలలో ప్రవేశించి మరల వానిలో బీజములను పెట్టెనరకు మొక్కకు తెగులు పుగిలినదని మనకు తెలియదు.

ఈకాటుక లేగువుల సంపర్కము లేని విత్తులను జల్లుటయే యీ తెగులువలని నష్టమును నివారించుకొను ముఖ్యమార్గము. జొన్న విత్తులను మైలుతుత్తపునీటిలో కొం

తసేపు నాననిచ్చిన వానినంటియుండు శిలీంధ్ర బీజములు సశించునని కనిపెట్టబడెను. ఒక కిరసనాయిల్ డబ్బు లేక 4 రుంచముల నీటిలో 24 తులముల మైలుతుత్తపు పొడుము చొప్పున

[illegible]

2- జాను)గోల ము (Rust):— ఈ పేగులు తగిలిపి  
 రావత్కొలు యూను పుట్ట పసిమి లేక గోధుమ వర్ణపు మచ్చలు  
 బయలుదేరును. కాచి యుని చీలకు తీవ్రముగ బట్టి గాఢింను  
 టురుదు.

3. వార శిశులు (Schlerosporum graminico-  
la) :- ఈ శిలీంధ్రము పట్టిన ముక్కల యాకులు నాలి

\* గానులపీఠంలో కొన్ని వోట్ల కొద్ది విత్తులను గోనూత్రిముతో  
తెడుపుట గలదు. కొందరికి, నీటితో నుద్దిలము, పసుపు మొదలగు ద్రవ్యము  
లను గొనుపుటయు గలదు. గొందరు గోనుపచ్చని నీటిలో వాచినెట్టి చ్చు  
టయు గలదు. కొంద్రై పచ్చగుని నీటికంటే సిపిచ్చనవియు, స్వల్ప వ్యత్యా  
సముతో సాఫల్యముగనవియు వగుటచే నెలరుగు వాని వనని బింపదగును.

† అగ్రనావ జి. యస్. లేక సిరసావ్ ఒక బౌద్ధుని సందులో 80 పానులు విత్తనములను కలిపి చట్టన యీ తెగులుగాను. (ఈమరిదు కలిసిన ప్రి. మును సి. శివు గాని. పశువుల వాణిజ్య గాని ఉపయోగించరాదు. ఎందుకనెనన గా యిది గానును విను పూరితములు.)

పోయి క్రమముగ గోధుమ లేక పసిని చార లేర్పడును. తెగులు ముదిరిన కొలది యీ చారల జాడ ననుగరించి ఆకులు చీలిపోవును. ఇట్టి మొక్కలు నెన్ను వేయవు. కాని యీ తెగులు ఒక మొక్కనుండి మరియొక మొక్కకు వ్యాపించునట్లుగుపడదు. ఇది తరచు తొలకరిపంటకు హెచ్చుగ నట్టు చుండును. నీరు పెట్టిన సస్యమునకును, ఎరువు వేసిన సస్యమునకును ఇది హెచ్చుగ వట్టును. దీర్ఘ పరివర్తనము నవలంబించుట తప్ప ప్రతీకారములేదు.

### కోత, కైలు

జొన్న చేలను సామాన్యముగ కొడవల్లతో 4-6 అంగుళముల ఎత్తున కోతగాలు వదలి కోయుదురు. రీ దంటు మిక్కిలి మోటుగనున్నపుడు మరి కొంత పైకి అనగా 3-4 అ. ఎత్తున గోయు ఆచారము కొన్నిచోట్ల గలదు. ఒక్కొక్కప్పుడు మొక్కలను వేళ్ళతో వీకుటయు గలదు. ఇట్లు చేసినచో బాగుగ ముదురిని వెన్నులందలి గింజలు కూడ కొంతవరకు గట్టిపడుటకు హెచ్చు అవకాశము గలుగును.

కొన్ని సందర్భములలో వెన్నులను మందు గోసికొని పిమ్మట దంటును గోయుట యనుకూలముగ నుండును. కాని చేను కురుచుగ నున్నపుడే యిట్లు చేయ వీలగును. జొన్న చేలతో కలిపి చల్లు డలవ, బొబ్బరమొదలగు కొన్ని జాతులు

---

రీ జొన్న చేలను గోయుటకు పశువులచే లాగబడునట్టివి గాని, శక్తి యంత్రములచే నడుపబడునట్టివిగాని యంత్రములు గలవు. కాని యిట్టి మంత్రము లీదేశమున నికను వాడుకలోని కంతగా రాలేదు.

జొన్న మొక్కలను చుట్టుకొనును. కావుననట్టి చేబలో వెన్నులను మాత్రము కోయవలసి యుండును, మరియు వర్షకాలమున బండిన చేబను మొదటికి గోసిన యెడల పనను తడియకుండ కాపాడుట కష్టమగుటచే వెన్నులను బ్రత్యేకముగ గోయుట మేలు. ఏకారణమున నైనను వెన్నులన్నియు నొకే సారి ముదురక వెనుక ముందైనపుడు పండిన వానిని ముందు కోయవలసి వచ్చును. కొన్నిచోట్ల చేని నంతటిని గోయుటకు దగిన మనుష్యులు దొరకక పోవుటచే ముందు వెన్నులను గోయుదురు. †

చేనిని వెన్నులతో గోసినపుడు దానిని పనలుగనేసి కొంతవర కెండినపిమ్మట చిన్నచిన్న కట్టలుగగట్టి గాలిపారుటకు వీలగునట్లు గూళ్ళుగ లేక గుడిసెలుగ నిలువబెట్టవలెను. ఇట్లుండగా దంటు పూర్తిగనెండును. అదివరకు పూర్తిగముదురని వెన్నులు కొంతవరకు ముదురును. ఇట్లెండిన పిమ్మట ఈ చిన్నగూళ్ళను (గుడిసెలను) కళ్ళములోనికిదోలి పెద్ద గూళ్ళుగ పెట్టవలెను. \* లేక మొదటనే యెండినయెడల నపుడే కళ్ళములోనికిదోలి యిట్లు గూళ్ళుగ పెట్టవచ్చును. పిమ్మట తీరికయైనపుడు ఈగూళ్ళను పడగొట్టి వెన్నులనేరి దంటును వాములుగ వేయవలెను.

† కాని యిట్లు దంటును పండినవెంటనే కోయక నిలచియుండ నిచ్చుటవలన దానికణ్ణిత చెడును.

\* సామాన్యముగ నూరేసి మొక్కలొక కట్టగ గట్టబడును. మొదట పెట్టు చిన్నగూళ్ళలో సుమారు 25 చేసి కట్టలును ఆరినపిమ్మట పెట్టు పెద్ద గూళ్ళలో 3, 4 వందల కట్టలును ఉండును.

ముందుగ వెన్నులనుగోసినయెడల వానిని కళ్ళమీద నెండబెట్టి వెంటనే నూర్చవచ్చును. లేక యెండినపిమ్మట ముడెలుగజేసి కప్పియించవచ్చును. కాని నూర్చుటపనులందు మరల వెన్నులను బాగుగ నెండబెట్టవలెను. శీతమున గింజలను సులభముగ బొంతెనుండి వీడెను.

కొంచెముగ నున్నపుడు వెన్నులను కళ్ళమీదపై బిసి బడితెలతోగూట్టి నూర్చవచ్చును. విస్తారముగ నున్నపుడు పశువులచే దొక్కిగొరచవచ్చును. కొన్నిచోట్ల చాలిబాడ (Roller) నో† నూర్చుచాడుకగలదు†. ఎడలచే దొక్కిగొరచునపుడు 10 జతలవలన నొకగింజలనునగుండు యిట్లుకలుగునొనగును.

నూర్చినజొన్నలను వడ్లములపై నెట్టి కడారబోసి శుభ్ర పరచవలెను. † శుభ్రముచేసిన గింజలను బాగుగ నెలమిబట్టి నిల్వచేయవచ్చును. కాని యిట్లునిల్వచేసిన గింజలను వ్యర్థము పుచ్చును. కావున వీనిని కొంతసేపు పాతరవేయించుచుండి. మరియు పాతరవేసిన జొన్నలు వేయనివానియందు శ్రీముముగ పుచ్చకపోవుటయేగాక వానికంటె నాహారయోగ్యముగను, అరోగ్యకరముగను నుండునని చాలమంది యాచార్యులు వయు. గింజలను పాతరతో గెండుమూడు నెలలుంచి తీసి కొడు

† ఈరొట్టెలను మానాక గజము పొడవును,  $\frac{1}{2}$  గజము వెడలను కలుపుకలిగి నుమాత్రం గెండుపుట్ట (1000 పానుల) బరువుగలదు.

† జొన్నల నెగురబోయునపుడు నిలువెత్తు ముక్కానిపీట (పెరువతోట మట్టుట కుపయోగించు పీటవంటిది) మీద నిలువబడి పోయునును. కొందరు ఏ కాళ్లను ముక్కిణముగట్టి నిలువబెట్టి దానిపై వెక్కుకును.

కలలోగాని, బట్టలలోని బాగ్యవైభవమును. రాని కొన్నిరకముల జొన్న లింపులను ప్రాముఖ్యమునకు పాతరలో నెక్కువగా ముదిరి పోవుట. నిర్దేశము (కృష్ణ) కొన్ని త్వరగా పోవుట. ఇది (బట్టలలో).

పాతరనాండి తీసినవిన్నుటకూడ కొన్నిరకములజొన్నలు బాగ్యవైభవమునకు పోషించుటకు వలెను. చెడవు. తెల్లజొన్న (బట్టలలో) 10 ను త్వరమునకు విన్నుచేసినవారు గలరు. కొన్ని శీఘ్రమున పోవుట. ఉ. (విన్నుచేసెను). కొన్ని యివివలనమున మున్నుట. ఇది (బట్టలలో) నిర్దేశము (కృష్ణ).

విత్తులకారకు నాటకమున మొక్కల పెక్కులను ప్రత్యేకముగదీసి జానమునకు పోషించుటకు విత్తులకు యింతుక ముందుగ పోషించి గొంతుకుదీసి పోషించి తీసి మొక్కలకు పోషించుటచే త్వరగా పుట్టుకమున విన్నుమున పోషించుట మరల పోషించుట. పాతరమునకు నూర్చిన గొంతుల నకుగజోడునపుడు రాశిలో మొదటిగొంతులను విత్తుల కొనుగదీయుదును. ఇవి త్వరగా పోషించుట బహుళమునందును.

ఇట్లుదీయు విత్తులను కొంచెమున్నయెడల పాతరముగ కుండలలో గోసి విన్నుచేయవచ్చును. పాతరమున్న యెడల గోనెలలో గాని, పొణకలలో గాని పోసి యుంచ వచ్చును. విత్తులకు పురుగు సట్టకుండ జేయుటకు నా నితో బూడిదను గాని, యెండిన నోడతరపు ఆకునుగాని, వేపాకును గాని, సెనగ ఆకును గాని, పశువుల మూతముతో నూరిన

యెండు మంటిని గాని, యెండిన పేడ పొడుముగాని కలుపుట కొన్ని కొన్ని చోట్ల గలదు.

కుండలలో గాని, పొణకలలో గాని నిల్వ చేయునపుడు గింజలపై నొక గుడ్డ వేసి గాని, వేయకగాని వైచి పాటిమన్ను లేక బూడిద లేక యిసుక పోసి కప్పదురు. కొందరు వీనికి క్రింద పైనచెప్పిన బోడతరపు ఆకు, సెనగ ఆకు, వేపకొట్ట మొదలగు వానిని శూడ వేయుదురు.

గోనెలలో పోసినపుడు వానిని శడ మంచెలమీద వేసి యుంతురు. సాధ్యమైనంత వరకు వీని నింట నందరును సంచ రించు ప్రదేశముననే ముంచిన యెడల నంతగా పురుగు పట్టదు. కొందరీ గోనెలను కొర్ర, ఆరిక, వ్రత్తి మొదలగు నితర రకముల విత్తుల రాసులలో వేసి యుంతురు.

విత్తులనెట్లు నిల్వ చేసినను వానిని నెలకొకసారి యెండ బెట్టుచుండవలెను.\* మంచు పడునట్లు రాత్రి కూడ పైన నుండనిచ్చుట మంచిది. ఇట్లు మూడు వగళ్లును, మూడు రాత్రులును నెండవలసి యుండును. సామాన్యముగ నమా

\* విత్తులకు గాని, తిరుతుకు నిల్వ చేసికొను గింజలకుగాని 60 వ పుటలో పేర్కొనిడిన కీటకములు పట్టకుండ జేయు విధానములను గురించి జరిగిన పరిశోధనల వలన అన్ని పద్ధతులలోను తరచు గింజల నెండబెట్టుటయే హెచ్చు ఉపయోక్తమయినదని తేలెను. ఇట్లేండ బెట్టుకుండ నుంచిన గింజలు 1 పడి (1½ శేరు)లో 66187 పురుగు లుండ నెల నెలకు ఎండబెట్టుచు వచ్చిన వానిలో 11048 మాత్రమే యుండెను. వేసాకు, గానుగాకు, తులసికొట్ట, వస, కొంచెము క్రియోజోటు (Creozote) జేర్చిన సున్నము వగైరా గాటు ద్రవ్యములను చేర్చి నిల్వ చేసిన వానిలో వేనియందును 36000 లకు తక్కువగ లేకుండెను. 20

వాస్యనాడును తరువాతి 9, 31 దినములును ఎండబోసిన విత్తులు పార్లమి ప్రాంతములందెండబోసిన వానివలె సంతగా పుచ్చ నని చెప్పుదురు.

చెమ్మ తగలకుండగను, పురుగు పట్టకుండగను విత్తులను జాగ్రత్త చేయుచో చాల రకముల గింజలు రెండేండ్ల వరకు విత్తుటకు పనికివచ్చును. అంధ్రదేశమున విరివిగ సాగు చేయబడు పచ్చజొన్న విత్తులును, తెల్లజొన్న విత్తులును వెన్నులతో నిల్వచేసినపుడు ఒక తణిఖిలో నాలుగేండ్లకు పిమ్మట గూడ నూటికి 90 కి పైగా మొలచెను. పచ్చజొన్న గింజలు ఆరేండ్లకు సెనుకగూడ స్వల్పముగా మొలచెను.<sup>15</sup>

మధ్యమసారముగల నేలలో జొన్నలు ఎకరమునకు 100 కుంచములు (800 పానులు) అగునని చెప్పవచ్చును. నీరసపు తెర్రనేలలలో నిండు సగమువండుటే కష్టము. సారవంతమయిన వండలి నేలలలోను యెరువువేసి నీరుకట్టి పైరుచేయు తోటనేలలలోను ఎకరమునకు 300 కుంచములకు (2400 పానులకు) పైగా అగుట గలదు. అమెరికాలో అప్పుడప్పుడు యెకరమునకు 4000 పానుల జొన్నలవర కగును.<sup>16</sup>

ఇటీవల, సంవత్సర వర్షపాతమునకును, జొన్నరాలికలకును గల సంబంధమును తెలిసికొనుటకుగాను చేసినపరీక్షలో తక్కువ వార్షిక వర్షపాతము (సుమారు 20 అంగుళములు) గల ప్రాంతములలో (ఉ. హగరి, బళ్ళారిజిల్లా) భూమి తేమ



మీదనే కేసులు ఆధారపడి (రైతులను హెచ్చుతగ్గులను బట్టి) జొన్న కాలికలు హెచ్చుతగ్గుల ప్రమాణాలను విభజ్యము వర్ణపాత్రలు. (నుమూను కిరి లింగ శివులు) గల ప్రాంతము (ఉ. సంక్రమణ, గుంటూరు) లోను. హెచ్చుతగ్గులను (40 అంగుళములు, పొడవు పైనున్న ఒక ప్రాంతము లోను (ఉ. పిశాఖ, శ్రీకామేశం కిల్లా), దీక్షాపాత్ర వర్ణపాత్రలు హెచ్చుతగ్గులను కాలికమామ్యుల కలుగుననియు, అట్టి ప్రాంతములలో లతివృష్టిదోషమువల్ల పేను దెబ్బతిని కాలికలు తగ్గుననియు తేలినది. <sup>56</sup>

దంటు సామాన్యముగా పెట్ట పైనున్న 60-75 మోపులు (నుమూను 2½-3 బండ్లు, తేలి 2400-3000 పానులు) అగును. బలమయిన నేలలలోను నీరుపెట్టి పైనున్న చోట్లను 4, 5 బండ్లవలె. కానెచ్చును. అరుదుగ 10-12 బండ్లవలె కగుట గలదు.

### ఆదాయ వ్యయములు

జొన్నను ఆయా కాలములందు వివిధ విధానములపై నొకయెకరమున సాగు చేయుటకు పలుకు నెలవారీ పాటును, అందుకగు వ్యయమును, అందువలన రాదగు నాదాయమును ఈ క్రింది పట్టికలలో నంచనా వేయుబడెను.

# I తొలికరిపంట

## ఎర్రనేలలలో (కందితో కలిపి)

నెల	చేయవలసిన పని	వలయుపాటు వ్యయము			
		ప.జ	మ.	అ.†	రు. అ. పై
డిసెంబరు—	చుక్క-రెండుసార్లు	3	3		9- 0- 0
జే	గుంటక తోలుట-రెండుసార్లు	1	1		3- 0- 0
	పశువుల యెరువు-10 బండ్లు—				
	శుగము ఖర్చు .				15- 0- 0
	తోలుట, పరచుట "	1	3	1	5- 8- 0
	చుక్క 1 సారి	1½	1½		4- 8- 0
	గుంటక తోలుట 1 సారి	½	½		1- 8- 0
	విత్తులు-జొన్నలు 16 పానులు				2- 0- 0
	కందులు 8 పానులు				0- 6- 0
	జొన్నలను గొర్రుతోను, కందులను				
	అక్కడి గొట్టముతోను విత్తుట	½	1	½	2- 4- 0
	గుంటకతోలి కప్పట	½	½		1- 8- 0
	మొత్తము	8	10½	1½	44-10- 0

† ప.జ = పశువులజరలు; మ. = మగవాండు; అ. = అడువాండు.

దినము 1 కి పశువుల జరకు రు 2/ల చొప్పునను, మగవానికి రు 1/ చొప్పునను, అడువానికి 8 అణాల చొప్పునను, లెక్క గట్టబడినది.

నెల	చేయవలసిన పనులు	వలయు పాటు			వ్యయము
		ప.జ.	పు.	ఆ.	రు. అ. పై.
	వెనుక పుటనుండి	8	10½	1½	44-10-0
జూలై-	ఆంతరకృషి- పాపటముతోలుట				
ఆగష్టు	రెండుసార్లు	1	1		3- 0- 0
	వరుసలలో కలుపు తీత			4	2- 0- 0
సెప్టెంబరు-	పిట్టల కాపలా			6	8- 0- 0
అక్టోబరు-	వెన్నుల నేరుట	1	5		3- 8- 0
	దంటుకోత, ఎండిన వెనుక కట్టలు				
	గట్టుట, గూళ్ళు పెట్టుట		5	8	9- 0- 0
	వెన్నులను కళ్ళముగకుతోలుట	½	½	½	1- 0- 0
	నూర్పిడి, ఎగురుబోత	2	1	1	5- 8- 0
	గింజలు, దంటుతోలుట, దంటు				
	వామివేయుట	½	2		3- 0- 0
	కంది నరకుట, గూళ్ళు పెట్టుట		1	4	3- 0- 0
	నూర్పిడి, ఎగురుబోత		6	½	6- 4- 0
	గింజలు, బొత్తు, కంపతోలుట	¼	½		1- 0- 0
	పన్నులు				4- 0- 0
	మొత్తము	12	28½	30½	88-14-0

రాబడి

రు. అ. పై.

జొన్నలు 80 కుంచములు లేక 640 పానులు

రు 1 కి 10 పానుల చొప్పున 64- 0- 0

దంటు 1920 పానులు రు 1 కి 100 పానుల చొప్పున 19- 8- 0

కందులు 200 పానులు రు 1 కి 8 పానుల చొప్పున 25- 0- 0

బొంతు 400 పానులు 8- 0- 0

కంప 800 పానులు 8- 0- 0

మొత్తము

124- 3- 0

నికరలాభము

85- 5- 0

జొన్నను ప్రత్యేకముగ సాగుచేయుచో 100 కుంచముల (800 పౌనుల) గింజలును 2400 పౌ. పంటను కావచ్చును. వీని విలువ రు 31-0-0 లుండును. వ్యయము రు 18-11-0 లుండును, నికరలాభము రు 12-4-0 లుండును. (1944 సం. పూర్వపు ధరలనుబట్టి)

## II పయరపంట

### A. గొర్రుతో వరుసలుగ విత్తుట

రేవడి నేలలలో - పెసరతో కలిపి

నెల	చేయవలసిన పని	వలయు పాటు వ్యయము ప. జ. మ. ఆ. రు. అ. పై		
	4 సరివత్సరములకొకసారి నెద్దయినప నాగటితో లోతుగ దున్నుట కగు వ్యయములో నాలుగవ వంతు	2	2	6- 0- 0
డిసెంబరు-	గుంటక చెండుసాధు తోలి కోత			
జనవరి-	గాలు గోకివేయుట	1	1	3- 0- 0
ఫిబ్రవరి-	గుంటక తోలుట 1 సారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1- 8- 0
మార్చి-	గుంటక తోలుట 1 సారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1- 8- 0
ఆగష్టు-	గుంటక తోలుట 1 సారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1- 8- 0
సెప్టెంబరు-	మేకలను మందగట్టుట (ఒకవేయి)			15- 0- 0
	గుంటక తోలుట	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1- 8- 0
	విత్తులు-జొన్నలు 8 పౌనులు			1- 0- 0
	పెసలు 8 పౌనులు			1- 8- 0
		5	5	32- 8- 0

నెల	చేయవలసిన పని	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప.జ	మ.	జ.	రు. ఆ. పై
	వెనుకపుటునుండి	5	5		83- 8- 0
	గొద్యోతో విత్తుట	$\frac{1}{2}$	1		2- 0- 0
	గుంటకతోలి కప్పట	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
అక్టోబరు-	అంతరకృషి-రెండు సార్లు	1	1		3- 0- 0
నవంబరు-	అంతరకృషి-ఒక సారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
డిసెంబరు-	అంతరకృషి (వ్షము గురియుచో)				
	1సారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
జనవరి-	పిట్టల కాపలా			6	8- 0- 0
	చేనుకోయుట, గూళ్ళు పెట్టుట		5	10	10- 0- 0
	వెన్నులసేయట		1	6	4- 0- 0
	వెన్నులను కళ్ళములోనికి దోలుట	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1- 0- 0
	నూర్పిడి, ఎగురబోత	2	1	1	5- 8- 0
	గింజలు, దంటుతోలుట, వామిచేత	$\frac{3}{4}$	8		4- 8- 0
	వెనరవీత, నూర్పిడి వగైరా	$\frac{1}{4}$	1	4 $\frac{1}{4}$	3-10- 0
	పన్నులు				4- 0- 0
	మొత్తము	11 $\frac{1}{4}$	19 $\frac{3}{4}$	27 $\frac{3}{4}$	77-10- 0

## రాబడి

	అ అ పై
గింజలు 800- పానులు రు 13 10 పానులచొప్పున	80- 0- 0
దంట 2,400 పానులు రు 13 100 పానులచొప్పున	24- 0- 0
వెసలు 150 పానులు రు 13 8 పానులచొప్పున	18-12- 0
చొత్తు 300 పానులు	6- 0- 0
మొత్తము	128-12- 0
నికరాదాయము	51- 2- 0

జొన్నను ప్రత్యేకముగ సాగుచేయుచోగూడ పంట  
ముంతకంటె హెచ్చునని చెప్పవీలులేదు. వ్యయము

రు 88-0-0 ను అగును. రాబడి రు 12-0-0 లుండును. నికర లాభము రు 36-0-0 వ్రాతప్రకారము.

B. నెడచల్లుట - మిషన్ కలిగి వందలినేలలలో

(సిపాయి సెంటు వరువాత)

నెల	చేయగలసిన పని	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప.జ.	మ.	ఆ.	రు.అ.పై.
ఆగష్టు	దుక్కి-సిపాయి వెసర భరియ				
	దున్నుట - రెండుసార్లు	3	3	1	9- 8- 0
	గుంటక తోలుట - ఒకసారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
సెప్టెంబరు	దుక్కి - 1 సారి	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$		4- 8- 0
	గుంటక తోలుట - రెండుసార్లు	1	1		3- 0- 0
అక్టోబరు	గుంటక తోలుట-ఒక సారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
	విత్తులు-బొమ్మలు 6 పొనులు				9-12- 0
	మినుములు 6 పొనులు				1- 2- 0
	చల్లుట, కలియదున్నుట-2 సార్లు, కంచతొడుగు తోలుట	3	3		9- 0- 0
జనవరి	గొప్ప-వర్షము తురిపికతో		1	12	7- 0- 0
	పిట్టల కాపలా			6	3- 0- 0
	చేనుకోయుట, గూళ్ళు పెట్టుట		5	12	11- 0- 0
	వెన్నుల నేరుట		1	8	5- 0- 0
జనవరి	వెన్నులను కళ్ళములోనికి తోలుట	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1- 0- 0
	నూర్పిడి, ఎగుగబోయ	$2\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	6-14- 0
	గింజలు, చంటు తోలుట,				
	వామిచేయుట	1	4		6- 0- 0
	మినుము, తీత, నూర్పిడి	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	5	5- 0- 0
	పన్నులు				8- 0- 0
మొత్తము		13 $\frac{1}{2}$	23 $\frac{1}{2}$	44 $\frac{1}{2}$	83-12- 0

## రాబడి

	రు. అ. పై.
జొన్నలు 1200 పానులు. రు 1కి 10 పానులచొప్పున	120-0-0
దొంటు 8,500 పానులు. రు 1కి 100 పానుల చొప్పున	85-0-0
మినుములు 180 పానులు. రు 1కి 8 పానుల చొప్పున	22-8-0
బొత్తు-360 పానులు	8-0-0
మొత్తము	185-8-0
నికరాదాయము	101-12-0

(ప్రత్యేకముగ జల్లినగూడ కొంచె మించు మించుగ నింతే జొన్నలగును. వ్యయము రు 94-12-0 లును, రాబడి రు 155-0-0 లును, నికరాదాయము రు 60-4-0 లును ఉండును.

## C. నాగటి చాలున నాడువేత

గరుప నేలలలో - ఉలవతో

(నూపు తరువాత)

నెల	చేయవలసిన పని	వలయుపాటు వ్యయము
		ప. జ. మ. అ. రు. అ. పై
	నారుమడి	
జూన్	దుక్కి-5 పెంట్లు-2 సార్లు	$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ 0-12-0
	గుంటకతోలుట - రెండుసార్లు	$\frac{1}{8}$ $\frac{1}{8}$ 0- 6- 0
జూలై	గుంటక తోలుట-ఒక సారి,	} $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{8}$ 0- 6- 0
ఆగష్టు	గుంటక తోలుట-ఒక సారి	
		$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1- 8-

\* దొంటు మోటుగా ముడుపుచే ధరతక్కువ.

నెల	చేయవలసినపని	వలయుపాటు వ్యయము		
		ప.జ.	మ.	ఆ రు.అ.పై
	వెనుక పుటగుండ్	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1- 8- 0
ఆగస్టు	మందగట్టుట 100 గొర్రెలు			2- 0- 0
	గుంటకతోలుట-ఒక సారి, పట్టె			
	తోలుట-ఒక సారి	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0- 6- 0
	విత్తులు- 12 సొంబులు			1- 8- 0
	చల్లుట, నాగటితోడున్ని కలుపుట,			
	కం.తొడుగు తోలుట	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0-12- 0
	కలుపుతీత			1 0- 8- 0
నారు వేయు నేల				
జూన్-	దుక్కి-రెండుసార్లు	3	3	9- 0- 0
ఆగస్టు	గుంటకతోలుట-మూడుసార్లు	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	4- 8- 0
సెప్టెంబరు	గుంటకతోలుట- 1 సారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1- 8- 0
	మందగట్టుట (ఒక వేయి)			20- 0- 0
	గుంటకతోలుట-ఒకసారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1- 8- 0
అక్టోబరు	నారుతీత-మోత		3	8- 0- 0
	ఉలవలు- 6 పోనులు			1- 2- 0
	ఉలవలు చల్లుట, నాగటిచాలున			
	జొన్న నారు వేత-చాటు			
	విడిచి చాలులో	1	1	2 4- 0- 0
నవంబరు	నాగటితో ఆంతరకృషి	1	1	8- 0- 0
జనవరి	పిట్టలకాపు, కోత, కైలు వగైరా	$3\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{2}$	$26\frac{1}{2}$ 31-12- 0
	ఉలవతీత, కైలు వగైరా	$\frac{1}{2}$	1	6 5- 0- 0
	పన్నులు			8- 0- 0
మొత్తము		12 $\frac{3}{4}$	28 $\frac{1}{4}$	35 $\frac{1}{4}$ 99- 0- 0



## రాబడి

రు. అ. పై

జొన్నలు 1000 పానులు (రు 1కి 10 పానుల చొ॥)	100- 0- 0
దంటు 3000 పానులు (రు 1కి 100 పానుల చొ॥)	30- 0- 0
ఉలవలు 200 పానులు (రు 1కి 8 పానుల చొ॥)	25- 0- 0
బొత్తు 400 పానులు	8- 0- 0

మొత్తము

163- 0- 0

నికరాదాయము

64- 0- 0

ప్రత్యేకముగ సాగుచేయుచో గూడ జొన్న లింతే  
యగును. వ్యయము రు. 90-0-0 లును, రాబడి రు 160-0-0  
లును, నికరాదాయము రు 70-0-0 లును ఉండును.

## III తొటజొన్న

నెల

చేయవలసినపని

వలయుపాటు వ్యయము

ప.జ. మ. అ. రు.అ.పై

డి సెంబరు- దుక్కి- రెండుసార్లు, గుంటక

తోలుట మాడు సార్లు

4½ 4½ 13- 8- 0

మార్చి పకువులయెరువు-16 బళ్ళు,  
సగము ఖర్చు

24- 0- 0

తోలుట, పరచుట ఖర్చు

1½ 4½ 1½ 8- 4- 0

మొత్తము

6 9 1½ 45- 12- 0

నెల	చేయవలసిన పని	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప.జ.	మ.	ఆ.	రు. అ. పై
	వెనుకటి పుటుసుండి	6	9	1½	45-12-0
మార్చి	దుక్కి-ఒక సారి	1½	1½		4- 8- 0
	గుంటక తోలుట-ఒకసారి	½	½		1- 8- 0
ఏప్రిల్	చాళ్లు, గట్టుచేయుట, ముట్టెలు (మళ్లుదలలు) బాగుచేయుట	1	2		4- 0- 0
	విత్తులు 24 పానులు				3- 0- 0
	చాళ్ళలో విత్తులువేసి కత్తుట			4	2- 0- 0
	నీరుతోడుట-మోటుతో-2అం.	3	3		9- 0- 0
మే	గొప్ప తల్లివ్వుట		1	12	7- 0- 0
	నీరుతోడుట-రిసార్లు 4½అం.	6½	6½		18-12- 0
జూన్	నీరుతోడుట-(వర్షములేనిచో)				
	ఒక సారి-1½ అం.	2½	2½		6-12- 0
జూలై	వెన్నులకోత		1	10	6- 0- 0
	కళ్ళమునకు తోలుట	½	½	½	1- 0- 0
	నూర్పిడి, ఎగురబోత వగైరా	3	2	2	9- 0- 0
	చొప్పుకోత-యెండిన వెనుక				
	కట్టలుగట్టి, గూస్సు పెట్టుట		5	10	10- 0- 0
	గింజలు, దంటు తోలుట	½	3		4- 8- 0
	పన్నులు				4- 0- 0
	మొత్తము	24½	36½	40	136-12- 0

## రాబడి

జొన్నలు-1600 పానులు. రు 13 10 పానుల చొ॥	160-0-0
దంటు-2800 పానులు రు 13 100 పానుల చొ॥	28-0-0
మొత్తము	188-0-0
నికరాదాయము	51-4-0

జొన్నయొక్కయు, దంటయొక్కయు ఉపయోగము

జొన్నలను పొట్టుపోవునట్లు దంపి అన్నముగవండి తినవచ్చును. † లేక పిండిగా వినరి రొట్టెలుచేయవచ్చును. కొద్దికాలము (2-3 నెలలు) వాతరవేసినజొన్నలు సులభముగ జీర్ణమగును. మొలకకట్టిన జొన్నపిండితోజేసిన జావ, రొట్టె వగైరాలు సులభముగ జీర్ణమగును. మొలకకట్టి తయారుచేసిన తృణాధాన్యములపిండిని 'మాల్ట్' (Malt) అందురు. మాల్ట్ చేయు విధానము మద్రాసు వ్యవసాయశాఖ 4, 5 వ కరణశ్రీములందు గాననగును. <sup>21</sup>, <sup>22</sup> గింజల నొకరోజు నానబెట్టి నానుచుండగా తరచు ప్రాంతనీటినిదీసి క్రొత్తనీటినిబోయుచుండుట, పానీసితడిగానుంచి మొక్కగట్టుట, సుమారు ½-శ్రీ అంగుళము మొక్కవచ్చినవెనుక గింజల నారబెట్టి మొలకకాలిపోవునట్లు నలుపుట, అట్లేగాని, పైపొట్టు పోవునట్లు దంచిగాని చెరిగివేయుట, దోరగావేచి మృదువగు పిండిగా వినరుట ఇవి మాల్ట్ చేయు విధానమునందలి ముఖ్యమగు బనులు. జొన్నల మాల్ట్ తోజేసిన జావను పాలతోజేర్చి బెంజర్నపుడ్, హార్లిక్కు మాల్టెడ్ మిల్క్ మొదలగు వ్యయకరములగువస్తువులకు బదులుగ రోగుల కై నను, పసిపిల్లలకై నను వాడవచ్చును.

జొన్నలను పేలాలుచేసి తినవచ్చును. వీనిని బెల్లముతో కలిపి యండలుజేసి విక్రియించుచుండురు.

† పొట్టు నూటికి సుమారు 12-15% ఉండును.

జొన్నపిండి ఆహారమునకే గాక ఇట్లు పరిశ్రమలకు కూడ సుపయోగించును. జొన్నలకుండి నూటికి 95 వంతులు శుభ్రమగుపిండి తయారుచేయవచ్చును.

కొందరు జొన్నలకు పశువులకు దాణాగా పెట్టుదురు. నీటిలో నానవేసి చుట్టిగాని, ఉపకబెట్టిగాని పెట్టవచ్చును. నానవేసినపిమ్మట కొంచెము మొలకరానిచ్చి చుట్టి పెట్టుట మంచిది.

జొన్నలలో పరిబియ్యమునందుకంటె హెచ్చు మాంస కృత్తులును, చమురును గలవు. కావున వానికంటె బలమయిన యాహారము. కొంచె మించు మించు గోధుమలలో సమాన మైన బలము ఉచ్చనని చెప్పవచ్చును. క్రింది సట్టికను చూడుడు.

		జొన్న	గోధు	పరిబియ్యము
		లు	ములు	43%కముల సగటు
మాంసకృత్తులు	నూటికి	10.88	11.24	8.50
చమురు	"	4.13	2.03	1.12
కర్బనోదజనశిములు	"	80.98	80.87	88.87
నారపదార్థము	"	2.29	2.42	0.37
బూడిద	"	1.72	3.44	1.11

పైయంకాలు గింజలందలి తేమనుమినహాయించి లెక్క గట్టగా తేలినవి. తేమ సామాన్యముగ గింజ లెండుటనుబట్టి నూటికి 10-12 వంతులుండును.

ఆ యా రకముల సంఘట్టనమున కొంత వ్యత్యాస ముండవచ్చును. మరియు నేలయొక్క పరిస్థితులను బట్టియు, వేసిన యెరువు మొదలగువానినిబట్టియుగూడ సంఘట్టనమున

వ్యత్యాసము లేర్పడవచ్చును. కాని యీ విషయమయిన పరిశోధన యంతగా జరిగియుండలేదు. ఒకనమూనాకును, మరియొక నమూనాకును గల వ్యత్యాసము నీ క్రిందిపట్టిక లెలుపును.

	తే మ	ఖనిజ ద్రవ్య ములు	మాంస కృత్తు లు	చ ను గు	నార పదార్థ ములు	కర్బనోద జిత ములు
A <sup>28</sup>	11.88	1.42	10.76	1.93	—	73.99
B <sup>24</sup>	10.71	2.05	9.71	3.69	1.54	72.38
C <sup>1</sup>	9.96	2.87	7.66	3.40	2.24	74.44
D <sup>26</sup>	12.50	1.70	9.80	2.00	2.20	72.80

జొన్నదంటు మిగుల మోటుగ లేకున్నయెడల పశువు లకు మంచియాహారము. కాడలో తీసి హెచ్చుగ నుండు నట్టియు, ఆకు లెక్కువగనుండి చివర కంతగా రాలిపోకుండు నట్టియు రకములదంటు శ్రేష్ఠము. ఆ యా రకముల దంటు యొక్క గుణ గుణములను గూర్చి యిదివరలోనే వ్రాయ బడెను. దిగువ పట్టికలో పరిగణియొక్కయు, జొన్నదంటు యొక్కయు సంఘట్టనము లెలుపబడును. <sup>24</sup>

	జొన్నదంటు	పరిగణి
తేమ	నూటికి 9.70	11.04
మాంసకృత్తులు	" 2.10	2.70
చమరు	" 1.50	1.02
కర్బనోదజితములు	" 39.67	40.84
నారపదార్థము	" 39.79	28.28
బూడిద	" 9.24	15.17

జొన్నదంటునందు సరిగడ్డికంటె హెచ్చుగ చూంస కృత్తులుగాని, కర్బనోదజనత. 100 - 1. లేకపోవుచు ఉన్న మట్టుకు పశువునకు బాగుగ వాడుబులుటచే సరిగడ్డికంటె సత్తువజేయునని కనిపెట్టబడెను. ఒకానొకతనితో నోచుచేయు కుండ నుంచిన యొకయెత్తును సరిగడ్డి మేపి నూతన తగ్గకుండ జేయవలెనన్న దానికితోడు దినమునకు 1½ ఔన్సుల వేరు శనగపిండికూడ పెట్టవలసివచ్చెను. ఇట్లే జొన్నదంటు మేవు నవుడు దీనితోపాటు 4 ఔన్సుల వేరు శనగపిండి పెట్టినచే తూనిక తగ్గకుండెను. 20

జొన్నదంటుకంటె జొన్నజాడు - ప్రత్యేకముగ మేత కొరకు పెంచినది - యెక్కువ విలువయైనది. దీనిని పచ్చిగ గాని, యెండినపిమ్మటగాని యుపయోగించవచ్చును. పచ్చి జాడును పాతరవేసి నివ్వచేసికూడ యుపయోగించవచ్చును. ఈ విషయములనుగురించి పశువులమేత సస్య ముపయోగించిన భాగమున విపులముగ వ్రాయబడును.

లేతజొన్న మొక్కలను పశువులనుచో నొక్కొక్కప్పుడవి తిక్కయెత్తి చచ్చుటగలదు. కొన్ని పరిస్థితులలో ముఖ్యముగ వర్షలోపమువలన గిడసబారిన మొక్కలలో ప్రసిస్సికామ్లము (Prussic acid) అను నొకవిధముగు విషద్రవ్యము హెచ్చుగ జనించుటయే కారణము. చేను పన్నువేసినగాని, దంటు రెండుదినము లెండలో యెండినగాని, పాతరవేయబడిన గాని యిది చాలవరకు తగ్గిపోయి ప్రమాదముండదు.\*

\* సామాన్యపరిస్థితులందలి లేతజొన్న మొక్కలలో సామాన్యముగ నీ ద్రవ్యము నూటికి నూఢారు .02-.08 వంతులు మాత్రమే యుండుననియు

కొంతకాలము క్రిందట చెరుకులేని కొన్ని ప్రదేశములలో దీని పొచ్చుగలదును రకముల కాండములనుండి రసమును సేసి చక్కెర దీనుబడుచుండును. కాని యిది యిప్పుడు స్వల్పభాగమునందును తీవ్రరకములలో కాండమున రసము నూటికి 3"-48 వంతులవరకు నుండుటగలదు. <sup>27</sup> ఇందు నూటికి 12 వంతులవరకు చక్కెర యుండవచ్చును.

ఇందు నూటికి సుమారు 60 వంతులు అకులందే యుండుననియు చెప్పు వేయునదిగా వ్రాసెను - శివప్రోవుననియు కనిపెట్టబడెను. 40 దినముల పాటును పుష్పపరిమిత చేసిలోని మొక్కలలో సామాన్యపు పరిస్థితులందు బెరిగిన కేవిలోని మొక్కలలోకంటె నీ విషద్రవ్యము 5-7 రెట్లు పొచ్చుగ (నూటికి 1-10 2 అంతు) నుండుననియు గనిపెట్టబడెను. <sup>28</sup>

# గంటె లేక నజ్జ

Spiked or pearl millet-Pennisetum typhoides

ఆరవము—కరబు; కిన్నడము—నజ్జ; ఓహ్లము—గంటె; మళమూలము—కరపం; హిందీ—జూజిగా.

## చరిత్ర, వ్యాపకము

ఈ సస్యమున కాఫ్రికా ఖండము ఆదిమ స్థానముగ నెంచబడుచున్నది. కాని గంటె యెచటను వన్యస్థితియందు గానబడకబోవుటచే నీవిషయమయి నిశ్చయమగజెప్ప వీలు లేదు. ఆఫ్రికాఖండమందు గంటెజాతు లనేక ముందుటచేతను ఈ పై రచట విస్తారముగ బెంచబడుచుండుటచేతను అదియే యీజాతి కాదిమస్థానమై యుండవచ్చునని యూహింపబడుచున్నది.

ఇండియాలో గంటె సుమారు మూడువందల సంవత్సరముల క్రిందట ప్రవేశపెట్టబడియుండుననియు, అమెరికాదేశమున కిది యంతకంటె చుందుగనే స్వానియర్థుచే దీసికొని పోబడెననియు తెలియుచున్నది <sup>29</sup>. గంటె లిప్పుడు ఇండియా, అరేబియా, ఈజిప్టు దేశములందు విస్తారముగ బండింపబడుచున్నవి. ఐరోపాలో దక్షిణభాగమునను నీవి కొంతవరకు బండించబడుచున్నవి. అమెరికాలోగూడ నీవంట కొన్నిచోట్ల విరివిగ దీయబడుచున్నది. కాని ఆ యా దేశములం దీసస్యము పైకుచేయబడుచున్న స్త్రీర్ణము మనకు తెలియట కాథారములేవు.



ఇండియన్ సీజమున గంటె సాగు బొంబాయి రాజధానిలో మొదట గలదు. చెన్న రాజధాని యందును, పంజాబు నందును, సయ్యక్త రాష్ట్రములందును గూడ విరివిగ నిది సాగు చేయబడుచున్నది. పంజాబు రాష్ట్రములందలి విస్తీర్ణమును దెలుపు యంకె లీక్రింద ఉట్టకలో (వేల సంఖ్యలో) గాన నగును. <sup>4</sup>

రాష్ట్రము	1940-41వ సం॥న విస్తీర్ణము-ఎకరములు (వేలు)
బొంబాయి	4,087
పంజాబు	3,863
చెన్న రాష్ట్రము	2,859
సయ్యక్త రాష్ట్రములు	2,435
బొంబాయి రాజధానిలోని సంస్థానములు	1,603
నిజాం రాష్ట్రము	1,278
ఇతర రాష్ట్రములు, సంస్థానములు	1,970
ఇండియా పై మొత్తము	<u>17,795</u>

చెన్న పురి రాజధానియందు పైగుచేయబడు తృణధాన్యములలో వరి, జొన్న వీనితరువాత గంటెయే ప్రధానమయినది. సామాన్యముగనిది సాగుచేయబడు విస్తీర్ణము (Normal area) 2,701,490 ఎకరములని యంచనావేయబడెను. ఇందు తెలుగుజిల్లాలలోని విస్తీర్ణము 11,98,320 ఎకరములు మాత్రమే. ఆయా జిల్లాలందలి విస్తీర్ణ మీకింద తెలుపబడెను. <sup>5</sup>

జిల్లా	విస్తీర్ణము - ఎకరములు
విశాఖపట్నం	200,500
గుంటూరు	182,900
చిత్తూరు	162,600
అనంతపురం	162,280
బళ్లారి	122,300
కడప	114,100
నెల్లూరు	108,100
కర్నూలు	67,000
తూర్పుగోదావరి	51,500
కృష్ణా	18,300
పశ్చిమ గోదావరి	8,700
మొత్తము	<u>11,98,800</u>

ఇందు 1,54,520 ఎకరములు నీరుపెట్టి సాగుచేయబడు విస్తీర్ణము.

ఇండియా మొత్తముపైని 1937-38 వ సంవత్సరమున (ఇది కాలము అనుకూలముగనున్న సంవత్సరము) సుమారు 31 లక్షల టన్నుల గంటెలు పంపినది లెక్కలవలన నియుచున్నది. పంట సగటున ఎకరము 1 కి 388 పౌనుల చొప్పున సగును. చెన్నపురిరాజధానిలో నేటేట సుమారు 7½ లక్షల టన్నుల గంటె లుత్పన్నమగుచున్నవి. పంట ఎకరమునకు సుమారు 625 పౌనులని తేలెను. తెలుగుజిల్లాలలో మొత్తపు పంట 3,61,150 టన్నులనియు, ఎకరము 1కి పంట సుమారు 672 పౌనులనియు లెక్కదేలెను.

ఇండియాలో నుత్పత్తియగు గంటెలు కొంచె మించు మించు అన్నియు నీ దేశముననే వినియోగపడుచున్నవి.

గంపె మొక్క సామాన్య లక్షణములు, రకభేదములు

గంపె మొక్క కొంచె మించు మించు జొన్న మొక్క వలెనే యుండును. కాని యంతకంటె సన్నముగ నుండును. సామాన్యముగ 3-6 అడుగుల పొడ వేరుగును. అరుదుగ 4-5 గజముల యెత్తు పెరుగుటయుగలదు.<sup>10</sup> జొన్న మొక్కవలెగాక దీనికి పిల్కలు బెట్టి దుబ్బుచేయు స్వభావము గలదు. గంపె వెన్నునందు పిల్లరెల్లలు క్రిక్కిరిసి యుండుటచే నది జమ్మికండెవలె నుండును. 11 వ పటము చూడుడు.

గంపె వేళ్ళు జొన్న వేళ్ళకంటె సన్నముగ నుండును. కాని యంతకంటె మెండుగ నుండును. వీచువేరును విస్తారముగ బయలుదేరును. వై కణుపులనుండిగూడ గాలివేళ్ళు దిగుట గలదు. నారుతీసి నాటిన మొక్కలందు మంటిలోనుండు కణుపులు - ముఖ్యముగ పిల్కలు బయలుదేరిన భూమిలోని ప్రతి కణుపును - మరింత విస్తారముగ వేరుపోయును.

కాండము గుండ్రముగ నుండును. జొన్న కాండము వలెనే లోపల బెండుగలిగి యుండును. కాని యిది సన్నగిలి యుండుటచే సంతకంటె మొత్తముమీద కఠినముగ నుండును. సామాన్యముగ  $\frac{3}{4}$  అంగుళము లావుండును. 1 అంగుళము లావువరకుగూడ నుండుటగలదు. మొక్క మొదటినుండియే గాక భూమికి వై కణుపులనుండిగూడ పిల్కలు నే క ము లు బయలుదేరును. ఒక్కొక్కదుబ్బునందు సగటున 3-5 వెన్ను వేయు పిల్కలుండును. బలముగ బెరిగినవానిలో నొక్కొక్క

దానియందు 20 వర కుండుట గలదు. ఒక్కొక్క కర్రయందు భూమిపైన వెన్నుగాక 6-9 ఖండములుండును. వెన్నుకింది ఖండమే సామాన్యముగ నన్నిటిలోను నిడివియైనదిగ నుండును. బాగుగ నెదిగిన మబ్బులలో సామాన్యముగ 8-10 అంగుళములవరకు పొడవుండును. అరుదుగ 12 అంగుళముల వర కుండుట గలదు. ఆకులలో చోటాకుకిందిది సామాన్యముగ తక్కినవానికంటె పెద్దదిగనుండును. దీనికొడిమ 4-6 అంగుళములును, లేకు 1½-2 అడుగుల పొడవును ½-¾ అంగుళము వెడల్పును ఉండును. కాని గుంకను క్రిందిది (పై నుండి 3 వ లేక 4 వ యాకు) యి తక్కువై కొంచెము హెచ్చు వెడల్పుగ నుండును.

వెన్ను సుమారు 6 మొదలు 12 అంగుళములవరకు పొడవుండును. సుమారు ½-1 అంగుళము దళముగనుండును. అల్పకణిశములు సామాన్యముగ రెండేసి (అరుదుగ 1-8 వరకు) చేరియుండు గుత్తులుగ మధ్యనుండు కాడచుట్టును క్రిక్కిరిసి యుండునట్లు అమర్చియుండును. ఈగుత్తులచుట్టును రోమములుండును. అల్పకణిశములందలి వెలుపలి క్రింది తుపము (Lower glume) సామాన్యముగ లుప్తము. రెండవ లేక వెలుపలి పై తుపము (Upper glume) కూడ లుప్తమై గాని, మిగుల చిన్నదిగగాని యుండును. మూడవ లేక చొని క్రింది తుపపు (Lower lemma) పంగలోని పూవు లుప్తమయిగాని, యాడుదిగనేగాని యుండును. నాలుగవ లేక రోని పై తుపపు (Upper lemma) పంగలోమాత్రము స్త్రీ పురుషాంగములుగల పూవుండును. మూడవతుపమున కెదురుగ

11 వ పటము



గంటెపెన్ను

(సగము పైజు)

నుండదగు బుసముకూడ లుస్తమయి యుండవచ్చును. పూవునందు కింజల్కములు మూడును, కీలములు రెండును ఉండును.<sup>30</sup> ఒకేగంటెపూవునందలి స్త్రీపురుషాంగములు ఏకకాలమంగు ముదురక పోవుటచే నాపూవు గర్భవతియగుటకు పరసంపర్కమే సర్వసామాన్యము. పూవులు రేయింబవ శ్చేపుడును కొద్ది గొప్ప విడచుచునే యూడును. కాని కోయంబత్తూరు పరిస్థితులందు రాత్రి 10-12 గంటలపుడును, మరల ఉదయం 9 గంటలపుడును కూడ విడచుట కొంత హెచ్చుగ నుండుననియు, సాయంత్రము మూడు గంటలపుడు విడచుట మందముగ నుండుననియు కనిపెట్టబడెను.<sup>31</sup>

గంటెగింజలు జొన్నలకంటె చిన్నవి. రకభేదమును బట్టియు, గణ్యాతను బట్టియు తులమునకు సుమారు 1500-2200 పరకు తూగును. కొంచె మించు మించు గుండ్రముగగాని, ఇంచుక కొలగగాని యుండును. తుష బుసములు రెండును యించుక జగిదేరి గింజను పరివేష్టించియుండును.

అభిరేకాఖండమున ననేకరకముల గంటెలున్నవని చెప్పుదురు. కాని యీదేశమున

గుర్తింపబడు ప్రత్యేక రకముల సంఖ్య తక్కువ యనియే చెప్పవచ్చును.

ఆంధ్రదేశమున సాగునందున్న రకములలో నీక్రిందివి ముఖ్యములు.

1. దేశవాళీ గంటె:- ఈరకము చాలచోట్ల ముఖ్యముగ నొకేరకము సాగుచేయబడు ప్రదేశములందు విశేషణములేక 'గంటె' యని వ్యవహరింపబడుచున్నది. సామాన్యముగ మెట్టనెలలందు మాత్రమే సాగుచేయబడుచున్నది. సుమారు నాలుగు నెలలలో ఫలించును, వెన్నును, గింజయు మధ్యమ పరిమాణము గలిగియుండును.

2. పిట్టగంటె:- ఇది కురుచగనెదిగి చిన్న వెన్ను వేయు రకము. మూడు నెలలలో ఫలించును. పంటయు పై రకము కంటె తక్కువ. కాని గింజ లాహారమునకు నాణెముగ నెంచబడుచున్నది. ఈరకము మెట్టనెలలందును మాగాణిభూములలో వరికిముందును సాగుచేయబడుచున్నది.

3. రుద్రాక్షగంటె:- ఇది విశాఖపట్నంజిల్లాలో కొన్ని చోట్ల సాగునందుగల మరియొకరకము. పిట్టగంటెకంటె కొంచె మెత్తుగనెదిగి సుమారు శిశి నెలలలో ఫలించును. అంతకంటె హెచ్చుపంట నిచ్చును.

4. పెద్దగంటె:- ఈ రకపుచేను పై రెండు రకముల కంటెను కొంచె మెత్తుగ నెదుగును. వెన్నును పెద్దది. కాని గింజ చిన్నది. నాలుగు నెలలలో ఫలించును, మంచి పంట నిచ్చును.

5. పాలగంటె:- పై రకములలోకంటె గింజ తేటైన తెలుపురంగు గలిగియుండు రకము. కృష్ణాజిల్లాలోని కొన్ని మెట్టనేలలందు సాగునందు గలదు. నుమారు 4 నెలలలో ఫలించును. పెరుగు, వెన్ను పరిమాణము, పంటకూడ మధ్యమము.

6. పోడుగంటె:- ఇది ఉత్తర సర్కారులలోని కొండ పోడులందు సాగునందుగల రకము. దీనిని కొందరు పెద్దగంటె యనికూడ వ్యవహరింతురు. కొండజొన్నవలెనే యిదియు సమప్రదేశములందలి సస్యముకంటెను యెత్తుగను బలిష్ఠము గను నెదుగును. ఒక్కొక్కరేపై 12-16 ఆకులవర కుండుట గలదు. పెద్ద వెన్ను వేయును. గింజయు కొంచెము పెద్దది.

7. ఎర్రగంటెలు:- గింజ కొంచె మెరుపుగనూండు రక మొకటి కొన్నిచోట్ల సాగునందున్నది.

8. పిచికసజ్జ:- ఇది బాగుగ దుబ్బుచేసి పెరుగు రక మగుటచే కొన్నిచోట్ల మేతకొరకుకూడ పెంచబడుచున్నది.

9. ముండ్లసజ్జ (బళ్ళారి):- వెన్నులలో అల్పకణిశముల మధ్య కాడలు మొక్క యుపరితలమునుమించి యెదిగి బిరు నుగ నుండుటచే వెన్ను రోమయుతముగనుండును. ఇట్టి వెన్ను లను వేయు రకములకు పక్షులబాధ యంతగా నుండదు. గింజల నేరితినునపుడు ముండ్లవంటిరోమములు పక్షులకండ్లలో బాడుచుకొనును. కాని యిట్టిరకముల వెన్నులందు గింజలు చిక్కగనుండకపోవుటచే పంటతక్కువ. <sup>32</sup>

ఆంధ్రప్రదేశమునందలి పైరకములుగాక యింకను నితర రాష్ట్రములందు సాగునం దనేకరకములుగలవు. బొంబాయి

రాజధానినుండి తేబడిన యొకరకమును పంజాబునుండితేబడిన మరియొకరకమును సుమారు పదేండ్లక్రిందట విశాఖపట్నం జిల్లాలో చాలచోట్ల ప్రవేశపెట్టబడి కొంత వ్యాపకమునకు వచ్చెను. కాని యివి మొదట కొన్ని సంవత్సరములవరకు నిచ్చినంత హెచ్చుపంట నిటీవల నిచ్చుటలేదు. ఇటీవల ప్రవేశపెట్టబడిన “జామ్నగర్ జయంట్” (Jamnagar giant) అనురకము మొదట సుమారు గజముపొడవు వెన్నులను వేసినను క్రమక్రమముగ నీపొడవు తగ్గుచువచ్చెను. సుమారు 35 సంవత్సరములక్రిందట దక్షిణాఫ్రికానుండి పితాపురంజుహా రాజావారి స్వక్షేత్రమునందును మరికొన్నిచోట్లను పరీక్షింపబడిన రెండు పెద్దవెన్నుల రకముల గతియు నిట్లేయ్యెను.

ఇట్లు కొత్తరకముల ప్రాప్త్యము నిలుకడగ లేకుండుటకు పరిస్థితిభేదములేగాక గంధపులు సామాన్యముగ పరసంపర్కముచే గర్భవతులగుటవలన నారకములు త్వరలో సంకరములగుటకూడ యొక ముఖ్యకారణము. కొత్తరకములనుగాని పంగడములనుగాని యిట్లు సంకరములు కాకుండ కాపాడుటకుగాను వానిని ప్రత్యేకఖండములందు సాగుచేసినమీపమున నితరరకములు సాగుచేయబడకుండ జూడవలెను. ఇట్టియేర్పాట్లు దక్షిణాదిని నొకచోట వ్యవసాయకాఖవా రిటీవల నొక పంగడమువిషయమున జేసి 3-4 సంవత్సరములలో స్వచ్ఛమగు విత్తులను బాదాపు రెండులక్షలయొకరకముల వీస్తీర్ణమునకు సరిపోవువానిని రైతుల కందజేయ యత్నించుచున్నారు. <sup>౩౪</sup>



ఇటీవల కోయంబత్తూరు వ్యవసాయ పరిశోధకస్థానము నందీ తృణధాన్యమునుగురించికూడ కొంత పరిశోధనజరిగి కొన్ని కొత్తవంగడము లెంచి తీయబడెను. కాని అందు తెలుగుజిల్లాలలో నెచటగాని స్థానికరకములకంటె శ్రేష్ఠముగ గనబడినంతగా గనబడలేదు. P.T. 100, 700 అను నవి మాత్రమే గుంటూరుజిల్లాలో కొన్ని చోట్ల కొంతవరకు హ్యవ కమునకు వచ్చెను. స్థానికపురకములను బరీక్షించి వానినుండి హెచ్చుపంటనిచ్చు శ్రేష్ఠమగు వంగడముల నెంచి తీయు ప్రయత్నములు, అనకాపల్లి పరిశోధన స్థానమునందు 1938-46 సంవత్సరములలో జరిగినవి. వానిఫలితముగ వికాఖ, శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు పనికివచ్చు ఎ. కె. పి. 1, ఎ. కె. పి. 2, ఎ. కె. పి. 3 గంటెవంగడము లుత్పత్తిచేయుబడి, రైతుల ఉపయోగార్థము విడుదలకాబడినవి. ఈవంగడముల లక్షణములు, కోయంబత్తూరు వంగడములలో, తెలుగుజిల్లాలకు పనికివచ్చు వంగడములతోపాటు అనుబంధమున ఇవ్వబడినవి.

ఈగంటెలో, సంపర్కమువల్లగలుగు బలువు, ఎక్కువ రాలికల (Heterosis) నుపయోగించుకొని సంపర్క వంగడముల ఉత్పత్తి కోయంబత్తూరులో జరుపబడుచున్నది. ఇట్టి వంగడములవల్ల రాలికలు 30-200% వరకు వృద్ధిలోనికి వచ్చునని తేలినది. అట్టి వంగడముల X-1, X-2 అను పేర్లతో విడుదలచేయబడిన రెండురకములు నీటివసతిని గంటె పండించు దక్షిణాదిజిల్లాలలో బాగుగ నుపయోగపడినవి. కాని, తెలుగుజిల్లాలలో వాని కాలపరిమితి సరిపోక, ఉపయోగపడలేదు. ఇట్టి సంపర్క వంగడముల ఉత్పత్తి, గంటె

రాజ్యం అభివృద్ధికి అంధ్రదేశమునకు పనికివచ్చు రీతిని  
జరుపజేసియున్నది.

### గంటెకు తగిన పరిస్థితులు

గంటె యుష్ణమండలవాసి యగుటచే విస్తారము వేడిమి  
నోచ్ఛును. తక్కువతేమి నో పెరుగును. హెచ్చువర్షము పనికి  
రాదు. కావున యీ సస్యము విశాఖపట్నంజిల్లాలో హెచ్చు  
వర్షము గురియు ఉత్తరప్రాంతములందుగంటె తక్కువవర్షము  
గురియు దక్షిణప్రాంతములందు హెచ్చుగ సాగుచేయబడు  
చున్నది. ఉత్తరభాగమున చోడి దీనిస్థానమును చాలవర  
కాక్రమించుకొనుచున్నది.

అంధ్రదేశమున గంటె చాలవరకు పునాసపంటగ  
సాగుచేయబడుచున్నది. వేసవివర్షములు తగినంత గురియు  
విశాఖపట్నంజిల్లాలో మే నెలలోగురియు వేసవివర్షపు పడు  
నున పెంచబడునారు పడమటివర్షము లారంభముకాగానే నాట  
బడును. ఇతరజిల్లాలలో పడమటివర్షములు ప్రారంభింపగనే  
విత్తబడును. ఈ పడమటివర్షములు ప్రారంభించుకాలమును  
బట్టియే విత్తుకాలమును భేదించుచుండును. కృష్ణా, గుంటూరు  
జిల్లాలలో ఏప్రిల్ జూన్-జూలై నెలలలో విత్తబడును. రాయల  
సీమ జిల్లాలలో మార్చి-ఆగష్టు నెలలలో విత్తబడును. కొన్ని  
చోట్ల వేసవిలో దీనిని నీరుకట్టి తోటసస్యముగగూడ సాగు  
చేయుటగలదు.

గంటె విస్తారముగ సాగుచేయబడు బొంబాయి రాజ  
ధానిగా గూడ నది పడమటి వర్షములు ప్రారంభించగనే

విత్తబడు చున్నది. ఇతర రాష్ట్రములందును చాల వరకిదియే గంటె సాగుచేయబడు కాలము. కాని తమిళనాడు నందలి తిర్నల్వేలి జిల్లాలో పడమటి వర్షములు చాల తక్కువగుటచే నేలలో తగినంత పక్షును జేదవరకు గాని, తూర్పు వర్షములు ప్రారంభించు వరకు గాని వేచియుండి గంటెలనపుడు అనగా సెప్టెంబరు-అక్టోబరు నెలలలో జల్లుదురు.

గంటె చేలు తేలిక నేలలందు హెచ్చుగ సాగు చేయబడుచుండును. ఇసుకగరుము లిందు కనుకూలములు, తగినంత సత్తువ జేసినయెడల నిమక నేలలందు సైతము బాగుగ నెదుగును. సముద్ర ప్రాంతములందలి యిసుక నేలలును, యిసుకతెల లంక నేలలును సామాన్యముగ గంటె చేలువేయు భూములు. జిగురు నేలలలో పైరతివర్షముల వలన చెడునను భయముచే నట్టి నేలలలో గంటె సంతగా సాగు చేయరు. కాని వర్షము తక్కువగ గురియు రాయలసీమ జిల్లాలో దీనిని రేవడి నేలలో సైతము గొంతవరకు పైరు చేయుచున్నారు.

విశాఖపట్నం జిల్లాలో నీ సస్యమును మెట్ట నేలలలోనే కాక, మాగాణి భూములలో సైతము పైరు చేయుచున్నారు. కాని వానిలో తేలిక నేలలును, మెరక నేలలును మాత్రమే యిందునకనుకూలము. గంటె చేనిని కోసికొనిన పిమ్మట పరి నాటుదురు.

## సేవ్య విధానము

మెట్ట భూములలో గంటెను నూవు, పొగాకు, వేరు సెనగ, యితర తృణధాన్యములు మొదలగు వానితో మార్చి పెట్టవచ్చును. తోట భూములలో మిర్చి, చిరుగడం, కర్ర పెండలము మొదలగు వానితో గూడ మార్చి పెట్టవచ్చును. వల్లపు నేలలలో నిదివరలో వ్రాయబడినట్లు పరితో మార్చి సాగు చేయుదురు. కొన్ని మాదిరి పరివర్తనము లీక్రింద జూపబడెను.

### I. మెట్ట నేలలు

	తొలకరిపంట	పయరపంట
1 వ సం॥	గంటె	ఉలవ
2 వ సం॥	నూవు	బొబ్బగ
3 వ సం॥	మొక్కజొన్న + కంది	కంది (వెనుకటిది)

### II. తోట నేలలు

1 వ సం॥	గంటె	మిర్చి
2 వ సం॥	—	చిరుగడము
3 వ సం॥	వేరు సెనగ	పయర వోడి
4 వ సం॥	కర్ర పెండలము	కర్ర పెండలము (వెనుకటిది)

### III. మాగాణి భూములు

	పువాసపంట	పెద్దపంట	పయరపంట
1 వ సం॥	గంటె	వరి	పయర నూవు + నీలి
2 వ సం॥	నీలి (వెనుకటిది)	వరి	పయర వోడి
3 వ సం॥	తొలకరి నూవుతో	వరి	ఉల్లితో బురదప్రత్తి కలిపి
	జనుము కలిపి		

గంటె తరుచు ప్రత్యేకముగనే సాగు చేయుచును. కాని మెట్టభూములలో నప్పుడప్పుడు దీనితో తొలకరి మినుము కలిపి సాగు చేయుటచుండును. కొన్నిచోట్ల దీనిని తొలకరి మాపుచో కలిపి సాగుచేయుట గలదు. అప్పుడప్పుడు దీనితో స్వల్పముగ జనుము, కంది కలుపుటగలదు. వరి నేలలలో దీనితో జనుముచుకలిపి చల్లి జనుము కొంతవగ కెదిగినప్పటికి వచ్చుకొని పశువులకు వేసికొని మరల పెరుగుకొట్టను తరువాత నాటబడువరి కెరువుగవేయుట మంచిది.

దక్షిణాదిని గంటెతో వేరుసెనగ, ప్రత్తి, అనుము, బొబ్బర మొదలగు నితర సస్యములనుగూడ కలిపి చల్లుదురు. వేరుసెనగతోకలిపి సాగుచేయుట ప్రత్యేకముగ సాగుచేయుట గంటె మొత్తముమీద లాభకరముగ గనబడెను.

గంటెను వెదజల్లవచ్చును. లేక గొరుగ్గో వరుసలుగ విత్తవచ్చును. నారు పెంచి నాగటి చాలున నాటవచ్చును. విత్తిన పిమ్మట మళ్ళుగట్టి నీరుపెట్టి సాగు చేయుట కూడ కొన్ని చోట్ల గలదు.

గంటాం, విశాఖపట్నం జిల్లాలోను, గోదావరిజిల్లాలో కొన్ని భూములందును నారుపోసి నాగటి చాలున వేయు పద్ధతి సర్వసామాన్యముగ నవలంబింపబడుచున్నది. పడమటి వర్షములు ప్రారంభించువరకు వేచియుండి విత్తుటకు బదులు వేసవి వర్షములతో మే నేలలోనే నాగు. పెంచి యీ నారు పెరుగు లోపల నాటుట కుద్దేశింపబడిన నేలనుదున్ని సిద్ధము చేసి తొలకరించగనే నాటుటవలన సుమారొక నెల ముందుగ నీ సస్యము కొతకువచ్చును. ఇట్టిది వెదజల్లి పెంచునప్పటి

కంటె ముందుగ నోతకు నచ్చుటచే భుజాత మరియొక పైరు పెట్టుట కెక్కువ యవకాశము గలుగుచున్నది. మరియు ముందుగ సాగుచేయు వీలగుటచే నీ సస్యము వెన్నువేయు కాలమున అది వర్షపు బాధనుండికూడ తప్పించుకొనును. మరియు నీ పద్ధతిలో రలుపు మొక్కలంతగా పెరుగకుండ సస్యము త్వరలో నెగిసి పేలను క్రొచ్చును. ఇట్లు నాటుట వలన మొక్కలు పిల్కలను హెచ్చుగ పెట్టి బాగుగ చుట్టు చేయును.

గొద్దుతో వరుసలుగ జల్లుపద్ధతి కృష్టా, గుంటూరు, నెల్లూరు జిల్లాలలోను, రాయలసీమలోను విస్తారముగ గలదు. ఈ పద్ధతిలో పశువులలాగు పనిముట్లతో నాంతరకృషి చేయు వీలగును. ఆ జిల్లాలలో వేసవి వర్షములు తక్కువగుటచే విశాఖపట్నం జిల్లాలోవలె ముందుగా నారుపెంచి తొలక రించగనే నాగటి చారున నాటుటకు వీలులేదు.

వెదజల్లు పద్ధతి గోదావరి లంకలలోను, దక్షిణాదిని విస్తారముగ చవలచిన బడుచున్నది

నీరుకట్టి సాగుచేయు పద్ధతి కొంతవరకు రాయల సీమ లోను, అరుదుగ విశాఖపట్నం జిల్లాలోను గలదు. దక్షిణాదిని—ముఖ్యముగ తిర్నల్వేలి జిల్లాలో విరివిగ గలదు.

కంటె చేలకు గూడ సంతర తొలకరి సస్యములకువలెనే వెనుకటి శీతాకాలము నుండియు పేలగు దున్నుచుండుట నుంచిది. కాని సామాన్యముగ దుక్కి వేసవి వర్షములతో పోరంభింతురు. వేసవి వర్షములు లేనిచో తొలకరించిన

పిమ్మటనే దున్నుదురు. కాని ఫలితము దుక్కి ప్రారంభించిన కాలము ననుసరించియే యుండును.

గంటెకు జొన్నకు కావలసినంత దుక్కి యవసరము లేకపోయినను అధమము నాలుగు సార్లయినను దున్నుట యవసరము. ఇనుప నాగటితో రెండుసార్లు దున్ని పిమ్మట రెండు మొదలు నాలుగు సార్లు గుంటకను తోలుచో పని సుఖపడును.

గంటె సాగుచేయు నేలకు సత్తువ జేయుటకు దుక్కి పూర్తియైన పిమ్మట గొర్రెలను, మేకలను మందగట్టి పైని గుంటక తోలవలెను. ఎకరము 1 కి సుమారు 800-1000 వరకు గట్టవచ్చును. లేక పశువుల యెరువును, ఊరపెంటను తోలి పరచి కలియదున్నివేయవచ్చును. ఒక యెకరమున నగు 120 కుంచముల (సుమారు 900 పానుల) గంటెలును, సుమారు రెండు బండ్ల (2000 పానుల) దంటును నేలనుండి సుమారు 21 పానుల నత్రజనిని తీసికొనును. దీనిని భర్తీచేయుటకు విడికొట్టపు తెరువును సుమారు రెండుబండ్లును, సామాన్యపు తెరువు నిందులకు రెట్టింపును వేయవలసి యుండును. కాని యీ పరిమితి నేటేట వేయుటకంటె రెంజేండ్ల కొకసారి దీనికి రెట్టింపు అనగా నెకరమునకు 8 బండ్లచొప్పున వేయుట యనుకూలము. ఈ యెరువును తొలకరిలో దుక్కి ప్రారంభించుటకు ముందే తోలి పరచవలెను.

తొలకరి వర్షములు హెచ్చుగ కురిసి నేల యివక జేయునని తోచినచోట్ల పైన చెప్పినట్లు సత్తువజేసి తయారు చేసిన నేలపై విత్తుటకు లేక నాటుటకు ముందు బరువైన

పట్టె నొకసారి తోల నేల బిగియునట్లు చేయుట మంచిది. ఇట్లుచేయుచో విత్తిన పిమ్మట వర్షము లధికమయినను, నేల యంతగా నూట చేయదు.

విత్తులను నెడజల్లు నెడల బలమయిన నేలలలో నెకర మునకు 2½ సేర్లు (4-5 పౌనులు) చాలును. సామాన్యపు నేల లలో 5-6 సేర్ల వరకు (8-10 పౌనులు) చల్లవలసియుండును. గొర్రుతో విత్తులను జల్లు నెడల నెడజల్లు నప్పటికంటె తక్కువవిత్తులు సరిపోవును. వరుసల మధ్య 8-10 అం గుళముల దూరముండవలెను.

నారుపెంచి నాగటి చాలున వేయు పద్ధతిలో వెనుకటి శీతకాలమునుండియు నారుమడిని దున్ని సిద్ధము చేయవలసి యుండును. అట్లు చేయ వీలులేనపుడు వేసవిలోతడిపి బాగుగ దున్నవలెను. 5 సెంట్ల నారుమడిలో 4 సేర్ల విత్తులను జల్లిన నా నారు ఒక యెకరమునకు సరిపోవును.

సుమారు నెలదినము లెదిగిన నా రు ను నా టు ట మంచిది. కాని యదనునుబట్టి యింతకంటె లేత నారును నాటుటయు, ముదురు నారును నాటుటయు గూడ తటస్థించు చుండును. నారు మిగుల లేతగ నుండుచో నాటిన పిమ్మట యెండకు కొంత చచ్చును. ఎక్కువ నారుకూడ పట్టును. నారు మిక్కిలి ముదిరిపోయిన యెడల నది యాలస్యముగ నా టు కొని దుబ్బుచేయుట శవకాశము తగ్గుటచే పంట తక్కువగును.

నారు వర్షపు పడునుననే తరచు తీయబడును. ఒక్కొక్కప్పుడు నారుమడిని కుండలతో తడుపుట యవసరము



గావచ్చును, నాకునుదీసి కట్టయిగట్టి నాటకపుల నానకు వెంటనే తీసికొనిపోయి వేయవలెను. మిక్కిలి పొడవున నెదిగిన యెడల మొక్కల చివళ్ళు కొనివేయట ముచిత్యము.

గంటెనాకును చూచుకొని చాలున చేయవలెను. ఒక నాగటిని ముందు తోలి యీ చాలున నాకును మొక్కకును మొక్కకును సుమారు 9 అంగుళముల దూరముండునట్లు వేసి పిమ్మట మరియొక నాగటి నాప్రక్కనే తోలి యీ మొక్కల మొదళ్ళపై మంటిని దోసి కప్పవలెను. సాధారణముగ చాలు చేయుట కొక నాగలియు, దానిని కప్పుట కొక నాగలియు నున్నయెడల నాకు వేయుటకు నలుగురాడ వాండ్లుండ వలయును. వీరు దినుసునకు సుమారు రెండేకరములు నాటుదురు.

గంటె నాకు వేయునపుడును, జొన్నకువలెనే బొంగరమున నాగళ్ళు వెలుపలినుండి క్రిమముగ లాసికి పోవుచుండును. కాని యిట్లు బొంగరపు వేత వేసిన మడిలో మొక్కల వరుస ఒక గట్టునుండి మరియొక గట్టువరకు తిన్నగ నుండవు. కావున తరువాత అంతరికృషి కపకాళముండదు. కావున కొంత యాలస్యమయినను చాళ్ళను ఒక గట్టునుండి మరియొక గట్టునకు తిన్నగ నాకుపోసి వేయుటయే మంచిది. ఇందునకు పశువులను గూడ నలవాటు చేయవలెను.

నాకు వేసినపిమ్మట వర్షము స్వల్పముగ పడి మబ్బుగ నుండునెడల బాగుగ నాటుకొనును. మిక్కిలి యెండ గాయుటయు, అతివర్షము పడుటయు గూడ యనర్థమే.

వెదజల్లినచేలలో మొక్కలు 4-6 అంగుళాలు పెరుగ గనే తేలికయగు యిసుబ పండ్లమూినిని గాని. \* త్రికోణపు పండ్లచటమునిగా ను తోలుటమంచిది. అవసరముగచో గొప్ప తొవ్వి తక్కిన గడ్డిగాదముల కేరివేయవలెను. సామూన్యముగ మరియొక నెలపోయి పిమ్మట మరియొకసారి గొప్ప త్రవ్వుట గాని, కలుపుతీయుట సూత్రమే గాని యవసరముగ నుండును.

గొరుితో వసనలుగ విత్తినసస్యమునందు మొక్కలు 4-5 అంగుళము లెదిగినదిమొదలు చేను పొట్టకువచ్చుటకు 15 దినములు నుండు వరకును నప్పుడప్పుడు అవసరమును, వీలునుబట్టి వరుసలమధ్య తగిన పనిముట్టుతో ఆంతరకృషి చేయవలెను. చేను కురుచగ నున్నపుడు కారు మూినిని, మెట్ల గుంటకను ఉపయోగింపదగును. ఎదిగిన కొలదిని మెట్ల గుంటకను గాని, సామూన్యపు నాగటినేగాని యుపయోగింప వలసి యుండును. అవసరముగచో వరుసలలో నుండు గడ్డి గాదములను ఒకటి రెండుసార్లు లాగివేయవలసి యుండును.

చాలున నారు వేసిన చేలలో నారు నాటు కొని యెదుగ ప్రారంభించిన పిమ్మట వరుసలమధ్య నాగటితోగాని, H. M. No. 0 గుంటకతో గాని ఒకటి రెండు సార్లు యాసన తోలుటమంచిది. ఎర్లములు తక్కువదైన సంచత్సరమున యీసని మిక్కిలి యుపయోగకరముగ నుండును. రైతులు కొందరు నాగటితో యాసన తోలుట గలదు గాని బొంగరపు వేత యిందున కవరోధముగ నుండును. కొన్ని మొక్కలు

\* దీనిని కొన్నిచోట్ల కారుమూినిని యుండును.

చెడిననునచే ముని ఒరపు గాలమున తప్పక యానన తోలుటయే మంచిది.

అధికముగ వర్షములు గురియు సంవత్సరములలో యానన తోలుటమాని కలుపుసూత్రము తీయుట యుక్తము. యానన తోలుట వలన నట్టి శాలమున పెరిమరింత యూట చేసి యెరిబారిపోవును.

చేతు మిగుల నొత్తుగ నున్నచో కొన్ని మొక్కలను కొన్ని త్రవ్వనప్పుడుగాని, తొలిసారి అంతరకృషి చేయనప్పుడుగాని లాగివేసి పలుచన జేయుట యవసరము.

బొంబాయి రాజధానిలో కొన్నిచోట్ల చేను 20-30 దినములు పెరిగిన పిమ్మట పైని పట్టె తోలుట గలదు. ఇందు వలన తల్లిమొక్కల పెరకువ కొంత యరికట్టబడి బాగుగ దుబ్బుచేయునని యిచటి యనుభవము.

నీరుకట్టి పైరుచేయుటకు బాగుగ దున్ని సత్తువజేసిన నేలపై విత్తులనుజల్లి మళ్ళుగట్టి బోదులనేర్పరచి నీరుకట్ట వలెను. నుమారు వారము పదిదినముల కొకతడి చాలును. మొదటితడికి నుమారు 3-4 అంగుళముల నీరును, పిమ్మట ప్రతితడికిని 1½-2 అంగుళముల నీరును చాలును. పిట్టగంజె, పిచికసజ్జ మొదలగు త్వరలోఫలించు రకములను పెట్టుచో సామాన్యముగ 7-8 తడులతో నీసస్యము ఫలించును. ఇట్లు పెంచు సస్యమునకు తగినంత సత్తువజేసి మెచ్చు పంటను పండించినగాని నీటిని దోడుటకగు వ్యయము కలిసిరాదు.

నాగటిచాలున నారునాటుటకు తగినవర్షముగురియక నారు ముదిరిపోవునని తోచినపుడు, నీటివసతిగల కొన్నిచోట్ల

మళ్లలో నీరుగట్టి యందు నాటుటగలము. నాగటిచాళ్లలో నీరు పెట్టి నాటుటయు గొన్ని చోట్ల గలము.

అరణ్యప్రాంతములందలి గంటెచేలను పండులు పాడు చేయును. దట్టమయిన కంచెలువేసి కాపాడుట యవసరము. గింజ ముదిరినపిమ్మట జొన్నకంకులనుండివలెనే గంటెవెన్నుల నుండిగూడ పిట్టలు గింజల నేరుకొనితినె నప్టముగలుగజేయును. లేక వెన్నులను విరచుకొనిపోవును. మంచెలపైనుండి వడిసె లతో పిట్టలను బోద్రోలుమండవలెను.

చీడలు, తెగుళ్లు

గంటెచేలకుపట్టు చీడలలో నీక్రిందివి ముఖ్యములు.


1. ఎర్రకంబళిపురుగు (The red hairy caterpillar *Amsacta albigstriga*):- వేరుసెనగచేలకు విస్తారముగబట్టు నీపురుగు అకాలముననే యాచేల సమీపమునబెరుగు గంటె చేలకుగూడ పట్టి హనియాకులనుదిని నాశనముజేయుచుండును. ప్రతీకారవిధానములు చమురుగింజలు, ఇతర చమురుదినునులు అను గ్రంథపు 81-85 పుటలందు వివరింపబడెను. 14 బి. హెచ్. సి. 0.1% మందును పిచికారినేసి నిన్నగొంగళి పురుగులను నివారించవచ్చును. ఇంతకన్న చెట్టింపుమోతాదు నుపయోగించిగాని, పారాచియన్ (Parathion) 0.05% నుపయోగించిగాని పెద్దగొంగళిపురుగులను నివారించవచ్చును.

2. గండ్రీపుప్పి (Stem-borer-Chilo sp.): -జొన్న చేలకుపట్టు దొలుపు పురుగు గంటెచేలకుగూడ పట్టును. కాని గంటెకర్ర, జొన్నకర్రకంటె కఠినముగ నుండుటచే నీపురుగు గంటెచేల కంతగా హానిచేయజాలదు.

3. నేలమిడుత ( *Chrotogonus saussurei* ) : -  
జొన్నకుపట్టు నేలమిడుతలు గంటెచేలకుగూడ పట్టుటగలదు.  
59 వ పుట చూడుడు.

గంటె చేలకుపట్టు తెగుళ్ళలో నీక్రిందివి ముఖ్యములు.

12 వ పటము



నక్కతోక తెగులుతగిలిన  
గంటె వెన్ను

1. జామిరిగడ్డు ( *Sclerospora* ) :-

గంటెయొక్కపై జొన్నయొక్క  
లపై వలెనే యెర్రని మచ్చలేర్ప  
డుట గలదు. ఇది యెర్రనిదనము  
శీలీంధ్రమువలన గలుగును. కాని  
యిందువలన విశేష నష్టము  
కలుగుటరుదు.

2. నక్కతోక తెగులు  
( *Sclerospora canariensis* ) :- దీనివలన జొన్న  
గింజలకు బడులు నిడివిగలుగు  
పోగులేర్పడుటచే నది నక్కతోక  
వలె కుచ్చుగ నేర్పడును. 12 వ  
పటము చూడుడు. పొచ్చు  
వర్షములుగలయు సంవత్సరము  
లలో నిది యెక్కువగా గాన  
నగును. విశేషనష్టము గలుగు  
టరుదు. తెగులుతగిలిన మొక్క  
లను తీసివేయుటయే సరియైన  
ప్రతీకారము.

## కోత. కైలు

గంటెచేతును జొన్నచేతువలెనే మొదటికిగోసి పన మీద నెండుచిచ్చి చిన్న చిన్న కట్టలాగగట్టి మొదట చిన్న గుడిసెలుగను, తరువాత గూళ్ళుగను పెట్టి తీరికయైనపుడు వెన్నులను గోసికొని నూర్చవచ్చును కాని సామాన్యముగ గంటె తొలకర్చిపైరగుటచే వర్షకాలము ముగియునోపల ఫలిం చుటచేతను జొన్నవలెగాక యిది విస్తారముగ పిల్కలను బెట్టుటచే నెన్నులన్నయు నొకేచారి ముదరకపోవుటచేతను ముందు వెన్నులను గోసికొని తరువాత దంటుకు కోసికొను టయే తరచు అనుకూలముగ నుండును.

కోసిన వెన్నులను కళ్ళమీద బాగుగ మెడబెట్టవలెను. అవసరమయినయెడల వెంటనే నూర్చవచ్చును. లేక యెండిన వెన్నుల నెట్లే పొలింపనోగాని, గాదులనోగాని పోసి నూర్పిడి యచరముగనువరకును నుంచవచ్చును.

వెన్నులు కొంచెమున్నయెడల బడి తెలనోగొట్టి నూర్చ వచ్చును. విస్తారముగ నున్నయెడల పశువులచే ద్రొక్కించ వలెను. గింజలను గాలి కెగురబట్టి శుభ్రముచేసి మరి యొకటి రెండుసార్లు బాగుగ కళ్ళమున మెడబోసి నిల్వచేయవలెను.

మధ్యమసాంముగలనేలలలో నెకరమునకు 100 కుంచ ముల (720 పానుల †) గంటెలగును. అనుకూలపరిస్థితులందు 120-180 కుంచములగుట గలదు.

---

† గంటెలు కుంచమునకు సుమారు 7.2 పానులు తూగును.

గంటెలను జొన్నలనలెనే బస్తాలలోగాని, పొణకలు వగైరాలలోగాని నిలువజేయవచ్చును.

విత్తులనిమిత్తము గంటెవెన్నుల నేరి యెండబెట్టి అట్లే యుంచి విత్తుటకుముందు నలుపవలెను. వెన్నులను కుండలలో గాని, పొణకలలోగాని నిల్వచేయవచ్చును. సలిపినగింజలను బూడిదతో కలిపి కుండలలో నుంచవలెను. మరల నప్పుడప్పుడు యెండబోయించుండవలెను. బాగుగ నెండబెట్టి సీసాలలోబోసి గాలితగులకుండజేసిన విత్తుల చైతన్యము నాలుగైదు సంవత్సరములవరకు సంతగా చెడకుండును. ఒకతణి ఖోలో మొదటి సంవత్సరాంతమున నూటికి 94.5 చొప్పున మొలచెను. నాలుగవసంవత్సరాంతమున నూటికి 87.0 వంతులును, అయిదవ సంవత్సరాంతమున 61.2 వంతులును మొలచెను. <sup>35</sup>

వెన్నులను కోసికొనినవెనుక సాధ్యమయినసంవత్సర లోనే దంటునుకోసి యెండబెట్టి జాగ్రత్తపెట్టట మంచిది. కోయకుండ నుంచినయెడల దానిగణ్యతచెడును. కోసినపిమ్మట నెండకాయునను ధైర్యమున్నచో పసమీద నొకటి రెండు దినము లెండనిచ్చి పిమ్మట చిన్నచిన్న కట్టలుగగట్టి గుడిసె లుగ నిలువబెట్టి బాగుగ నెండినపిమ్మట గూళ్ళుగబెట్టి తీరిక యైనపుడు వామి వేయవచ్చును.

వర్షకాలమున గోతకువచ్చుటచే తరచు దంటు ఒబ్బిడి గాక చెడుచుండును. మరియు నీదంటు క్రిందిభాగము మిక్కిలి గట్టిగనుండుటచే సామాన్యముగ 1-2 అడుగుల గోతగాలు వదలి పైభాగమునే కోసి జాగ్రత్తపెట్టుదురు. కొన్నిమాగాణి

భూములందు దంటును గోయకయే వరి కెరువుగ దమ్ము చేయుదురు.

మొదటికి కోసినయెడల నీదంటు యెకరమునకు సామాన్యముగ  $1\frac{1}{2}$ -3 బండ్లు (1500-3000 పౌనులవరకు) అగును.

### ఆదాయ వ్యయములు

గంటెసాగున కా యా పరిస్థితులలో నెకరమునకగు వ్యయమును, అందువలన రాదగు నాదాయమును ఈక్రింద యంచనా వేయబడెను.

#### I వెదచల్లిక (ఇసుక లేక గరువకొడినేలలందు)

నెల	చేయవలసినపని	వలయుపాటు వ్యయము		
		ప.జ.	మ.	ఆ.క.ర.అ.వై.
డిసెంబరు	దుక్కి-రెండుసార్లు	8	3	9- 0- 0
ఏప్రిల్	గుంటకతోలుట-రెండుసార్లు	1	1	3- 0- 0
మే	,, -ఒకసారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1- 8- 0
	గొర్రెలను, మేకలను మందగట్టుట (800)			8- 0- 0
	గుంటకతోలుట-ఒకసారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1- 8- 0
జూన్	చిత్తులు-రి పౌనులు			1- 0- 0
	చల్లుట, కలియదున్నుట, కంప			
	తోడుగుతోలుట	3	3	9- 0- 0
	కారుమాను తోలుట-రెండుసార్లు	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1- 8- 0
జూలై-	కలుపుతీక	$\frac{1}{2}$	4	2- 8- 0
ఆగష్టు	గొప్పతొవ్వకు	1	12	7- 0- 0
ఆగష్టు	పిట్టలకాపు		6	3- 0- 0
మొత్తం		8 $\frac{1}{2}$	10	22
				47- 0- 0

\* ప.జ.=కువులజీతం; మ.=మగవాండు; ఆ.క.ర.అ.వై.=ఆడవాండు.



నెల	చేయవలసినపనులు	వలయుపాటు ప్యాయము			
		ప.జ.	పు.	అ.	రు.అ.పై.
	వెనుకపుటనుండి	రెడ్డి	10	2	17-0-0
సెప్టెంబరు	వెన్నులకోతి		1	10	6-0-0
	దంటుదొత్, కట్టిబుగ్గిలు, గుం సెలు				
	పెట్టుట		1	6	8-0-0
	వెన్నుల నూర్చిడి, ఎగురబోత	2	1	1	5-2-0
	గింజలు, దంటుతోలుట, దంటు				
	వామివేయుట	$\frac{1}{2}$	2		3-0-0
	పన్నులు				2-0-0
మొత్తము		71	18	37	71-8-0

## రాబడి

100 మ.చముల గంటెలు	రు 13 మంచెదుచొప్పున	100-0-0
దంటు 2000 పానులు	రు 1కి 200 పానులచొప్పున	10-0-0
మొత్తము		110-0-0
నికరాదాయము		38-8-0

## II గొర్రుతో వరుసలుగ విత్తుట

(కృష్ణ రేవడినేలలలో)

నెల	చేయవలసినపని	వలయుపాటు ప్యాయము			
		ప.జ.	ను.	అ.	రు.అ.పై.
డిసెంబరు	సాగు, మంచకట్టుట (పై పట్టి				
మే	కలోవరనే)	5	5		15-0-0
	విత్తులు-6 పానులు				0-12-0
జూన్	గొర్రుతో విత్తుట	$\frac{1}{2}$	1		2-0-0
మొత్తము		5 $\frac{1}{2}$	6		17-12-0

నెల	చేయవలసిన పని	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప. జ.	మ.	ఆ.	రు. అ. పై.
	బెనుకపుటనుండి	5½	6		17-12-0
జూన్	గుంటకతోలి కిప్పుట	½	½		1- 8- 0
	కారుమౌను తోలుట	¼	¼		0-12- 0
జూలై	ఆంతరకృషి-ఒకసారి	½	½		1- 8- 0
	వరుసలలో కలుపుతీత			4	2- 0- 0
సెప్టెంబరు	పిట్టలకాపు, కోత, కైలువగైరా	2½	8	25	25- 8- 0
	పన్నులు (సగము)				2- 0- 0
మొత్తము		9½	55½	29	51- 0- 0
రాబడి	100 కుంచముల గంటెలు (720 పానులు				
	రు 1 కి కుంచెడుచొప్పున				100-0-0
	దంటు 2,000 పా   రు 1 కి 200 పా   చొ॥				10-0-0
మొత్తము					110-0-0
నికరాదాయము					59-0-0

### III. నారుపోసి నాగటిచాలున వేయుట

(ఇనుకకొడి లేక గరుసకొడి నేలలలో)

నెల	చేయవలసిన పని	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప. జ.	మ.	ఆ.	రు. అ. పై.
నారుమడి 5 సెంటు					
డిసెంబరు-సాగు, మందకట్టుట జొన్నకు					
మే	వలెనే	3	5		1-14- 0
	చిత్తులు-7 పానులు	8	8		0-14- 0
	చల్లుట, కలుపుట, కంపతోలుట	¼	¼		0-12- 0
	కలుపుతీత			1	0- 8- 0
మొత్తము		7	7	1	4- 0- 0

## నాటబడు భూమి

డి సెంటరు-చుక్కి-రెండుసార్లు	3	3	9- 0- 0
మే గుంటకతోలుట-రెండుసార్లు	1	1	3- 0- 0
మొత్తము	4	4	12- 0- 0

నెల	చేయవలసినపని	ప.జ.	మ.	ఆ.	రు.అ.పై.
	వెనుకపుటనుండి	4	4		12- 0- 0
మే	ఎరువు-8 బండ్లు (సగముఖర్చు)				12- 0- 0
	తోలుట, చల్లుట (సగముఖర్చు)	$\frac{3}{4}$	$2\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	4- 2- 0
	కలియదున్నుట-1 సారి	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$		4- 8- 0
జూన్	నారతీత, మోత వనైరా		3		3- 0- 0
జూలై	యాసనతోలుట రెండుసార్లు	1	1		3- 0- 0
ఆగష్టు	పీట్టలకాపు			6	3- 0- 0
సెప్టెంబరు	వెన్ను లకోత		1	12	7- 0- 0
	చొప్పకోత, కట్టలు గట్టుట,				
	గూళ్ళు పెట్టుట		4	10	9- 0- 0
	నూర్పిడి	$2\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	6-14- 0
	గింజలు తోలుట	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
	పన్నులు-సగము				4- 0- 0
	మొత్తము	$10\frac{1}{8}$	$19\frac{3}{8}$	27	72- 0- 0

## రాబడి

గంటెలు 120 కుంజములు (రు 1కి కుంచెడుచొ॥)	120- 0- 0
దంటు 2 బళ్లు (240 పానులు) (రు 1కి 200 పాచొ॥)	11- 4- 0
మొత్తము	131- 4- 0
నికరాచాయము	59- 4- 0

పై మూడు పద్ధతులలోను తొలకరి మినుమును గలిపి మిశ్రణముగ సాగుచేయుచో విత్తులు రిపానులకు 1రూపాయి, తీత, మోత, నూర్పిడివగైరాలకు రు 3-14-0 లును, పన్నులు రు 1-0-0 చేరి మొత్తపు వ్యయము అదనముగ రు 5-14-0 లును, రాబడి గింజలు 150 పానులకు రు 15-0-0 లును, బొత్తు 300 పానులకు రు 4-8-0 లును చేరి అదనముగ రు 19-8-0 ఉండును. మొత్తముమీద ఆయా పద్ధతులలో ఆదాయము లీక్రింది విధముగ నుండును.

ఆదాయము వ్యయము నికరాదాయము

	రు ఆ పై	రు ఆ పై	రు ఆ పై
బెడజల్లు పద్ధతి	110- 0- 0	71-8-0	38-8-0
గొర్రుతో విత్తుపద్ధతి	110- 0- 0	51-0-0	59-0-0
నాగటిచాలున నారు	131- 4- 0	72-0-0	59-4-0
నాటా పద్ధతి			

ఉపయోగములు

గంటెలను పై పొట్టు పోవునట్లు దంపి చెరిగివేసి యన్నముగ వండి తినవచ్చును.\* కొందరు వడ్లనుండి ఉప్పుడుబియ్యమును తయారుజేయునట్లే గంటెలను ముందు ఉడుక బెట్టి యెండబోసి దంపి వండుకొందురు. గంటెలను పిండిగా విసరి జావ గాచుకొని త్రాగుటయు గలదు. పిండిని మజ్జిగతో తడిపి రొట్టెగ గాల్చిగాని, అట్లుగా పోసిగాని తినవచ్చును. జొన్నలనుండి వలెనే గంటెలనుండియు మాల్బును తయారుజేసి రోగులకును, పసిపిల్లలకును ఉపయోగించవచ్చును. ఆరోగ్యవం

\* పొట్టు నూటికి నూనూరు 7-8 ఫంతులు మార్చిముండును,

తులుమొలక కట్టిన గంటెలను వేచి పొడిజేసి వేడిపాలలోపేసి కొంచెము బెల్లము లేక చక్కెర కలిపి పుచ్చుకొనవచ్చును. పిండి విసరునపుడు కొన్ని యేలకులను జేర్చుచో నీమిశ్రితము రమ్యమైన పరిమళముగలిగి పాయసమువలె నుండును. పిండిని మజ్జిగ లేక పెరుగులోపేసి నాననిచ్చి కొంచెము ఉప్పునుజేర్చి పుచ్చుకొనవచ్చును. పొగచి కరివేపాకు లేక కొత్తిమిరి జేర్చిన మరింత యాకర్షవంతముగ నుండును. ఇంచుక ముదుగుగ విసరిన పిండిని వేడిపాలతో గుత్తమగు ముద్దయగునట్లు కలిపి కొంచెము నేయి, బెల్లము లేక ఏలకులపొడి జేర్చినయెడల సత్యన్నారాయణ ప్రసాదమువలె నుండును. వేడినీటితోకలిపి కొంచెము నేయి, ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి, అల్లముజేర్చిన ఉప్పుడు పికడివలె నుండును. పర్యటనము చేయువారు పైని చెప్పినట్లు తయారుజేసిన పొడిని కూడ నుంచుకొనుచో మరల వంట యవసరము లేకుండ నిట్టింపుగనుండు పలువిధములగు నాహార పదార్థములను దయారుజేసికొని తినవచ్చును. అటుకుల కంటెను, వరి, జొన్న పేలాలకంటెను నివి యెక్కువ ఆకర్షవంతముగ నుండును.

గంటెలసంఘటనము 2. A అనుబంధమున జూపబడెను. మాంసకృత్తుల యొక్కయు, చమురు యొక్కయు ప్రమాణమున గంటెలు జొన్నలకంటె శ్రేష్ఠము. గోధుమలకు గూడ దీనిపోవు. కావున వరియన్నమును దినువారు ప్రతిదినమును గంటెయన్నమును గాని, మాల్తు శు గాని కొంతవరకుతీసి కొనుచో శరీరమున కెక్కువ యనుకూలముగ నుండును. ఖనిజద్రవ్యముల విషయమునను విటమిను A విషయమునను

గూడ గంటలు జొన్నలకంటె శ్రేష్ఠము. గోధుమలశో  
తుల్యముగ నెంచవచ్చును. ఇనుము వానిలోకంటెను  
కొంచెము హెచ్చుగనే గలదు. 2. B అనుబంధము చూడుడు.

గంటయన్నము వగైరా వస్తువులకు వరియన్నము,  
జొన్నయన్నము వగైరాలకంటె వేడిచేయు స్వభావముగలదు.  
కావున వానిని ఉష్ణతత్వము గలవారు మజ్జితోను, చలువ  
తత్వము గలవారు పాలతోను వుచ్చుకొనవచ్చును.

గంటలను అన్నముగ వండి పశువులకు దాణాగా  
పెట్టుటగలదు. విశాఖపట్నపు జిల్లాలో అమ్మకమునకు బెంచ  
బడు కోడెలను తరచు యిట్లుమేపి తయారుజేయుదురు.

గంట దంటయొక్క సంఘట్టనము 2. B అనుబంధ  
మున జూపబడెను. దీనికిని జొన్నదంటనకును భేదమంతగా  
లేకపోయినను నిదియంతకంటె కొంచెము కఠినమని చెప్ప  
వచ్చును. కావున పశువు లంతబాగుగ దినవు. గంటను  
జొన్ననలె పశువులమేతకొరకు ప్రత్యేకముగ బెంచుటయు  
గలదు.

# చోడి లేక తమిద

Ragi-Eleucine coracana

అరవము-రాగి, కేల్వరగు; కన్నడము-రాగి; మళయాళము-ముట్టారి;  
ఓడ్రము-మండియా; హిందీ-రాగి; మారుతి, సంస్కృతము-రాజిక.

చరిత్ర, వ్యాపకము

చోడి కిండియాదేశమే యాదిమస్థానమయి యుండునని శాస్త్రజ్ఞుల యభిప్రాయము. ఈ దేశపు సమ ప్రదేశము లందును, హిమాలయాది పర్వతములపై 5000-8000 అడుగుల యెత్తువరకును నిప్పుడుగూడ గాననగు నొక వన్యజాతి చోడి (Eleucine Indica) \* నుండి యిది యుత్పన్నమై యుండవచ్చునని యెంచబడుచున్నది.<sup>36</sup> కాని అధర్వవేదము నందు పేర్కొనబడిన సప్తగ్రామ్యములందుగాని, బృహదారణ్యకోపనిషత్తునందలి దశధాన్యములందుగాని యిది పేర్కొనబడియుండలేదు. బహుశః నీసస్య మాకాలపు టార్యావర్తమున సేవ్యమున లేకుండెననియు దక్షిణదేశముననే సాగు చేయబడుచుండెననియు యూహింపదగియున్నది. ఇప్పటికిని యీసస్యమునకు చెన్నపురి తాజధానియందుగల ప్రాముఖ్యత యితర రాష్ట్రములందులేదు.

---

\* అరవనాడున కొన్నిచోట్ల యీ వన్యజాతిచోడికి 'తిప్పరాగి' యని పేరు.

చోళ్ళిపు డిండియాలోనేకాక ఆఫ్రికాఖండములందలి తూర్పు, మధ్య, దక్షిణ భాగములందును విరివిగ సాగుచేయబడుచున్నది. కాని ఆ యా దేశములందు చోడి సాగునందున్న విస్తీర్ణమునుదెలుపు లెక్కలులేవు.

ఇండియాలోనైనను ఆయా రాష్ట్రములందును, సంస్థానములందును చోడి సాగుగల విస్తీర్ణపు లెక్కలు లేవు. కాని చోడిపైరు విస్తారముగగల రాష్ట్రము పైని వ్రాయబడినట్లు చెన్నపురి రాజధానియే. మైసూరు సంస్థానమునగూడ నిది విరివిగ సాగుచేయబడుచున్నది. బంగాళమునందును, బొంబాయిరాజధానియందును, పంజాబు రాష్ట్రమునందును గూడ చోడిసాగు కొంతవరకు గలదు.

చెన్నపురి రాజధానిలో గంటెతరువార నిదియే విస్తారముగ సాగుచేయబడుచున్న తృణధాన్యము. ఈ సస్యము సాగు చేయబడు సామాన్యవిస్తీర్ణము (Normal area) 17,01,400 ల యెకరములుండునని యంచనా వేయబడెను. ఏ జిల్లాలోను యిది ప్రధానసస్యము కాకపోయినను అన్నిటి యందును కొద్దిగనో గొప్పగనో సాగు చేయబడుచున్నది. అంధ్రరాష్ట్రమున నిది సాగుచేయబడు సామాన్య విస్తీర్ణము 7,78,330 యెకరములు. విశాఖపట్నపు జిల్లాలోను, చిత్తూరు జిల్లాలోను దీనిసాగు హెచ్చుగా గలదు. ఆయా తెలుగు జిల్లాలయందలి విస్తీర్ణమును దెలుపు యంకె లీక్రింది పట్టిక యందు గాననగును.



జిల్లా	చోడిసాగుగల విస్తీర్ణము (ఎకరములు)
వికాఖపట్నం	2,72,000
చిత్తూరు	1,64,520
అనంతపురం	93,200
నెల్లూరు	86,850
కడప	63,470
బళ్ళారి	27,170
కర్నూలు	23,510
తూర్పు గోదావరి	20,860
గుంటూరు	17,180
కృష్ణా	5,760
పడమటి గోదావరి	4,310
మొత్తము	<u>7,78,330</u>

జొన్నయు, గంటెయు చాలవరకు మెట్టసస్యములుగనే సాగుచేయబడుచుండ చోడి చాలవరకు నీరుపెట్టి సాగుచేయబడుచున్నది. తెలుగు జిల్లాలలో నీసాగుగల 7,78,330 యెకరములలో 4,63,330 అనగా సుమారు 60 వంతులు నీరుపెట్టి సాగుచేయు సస్యమే. అందువలన దీని పంటయు వాని ఫంట కంటే హెచ్చు. తెలుగు జిల్లాల మొత్తపుపంట ఏట 4,09,480 టన్నులని యంచనా వేయబడెను. సగటున నెకరమునకు 1179 పౌనులగును. చెన్నపురి రాజధానిపై మొత్తపు పంట ఏట సుమారు 8,63,270 టన్నులుండునని యంచనా వేయబడెను. ఎకరము 1 కి సగటు 1284 పౌనులని తక్కువేలను.

చాలవర కెచట పండిన చోళ్ళచటనే వినియోగపడు చున్నవి. పొచ్చుగ పండిన జిల్లాలనుండి యితర జిల్లాలకు స్వల్పముగ వెగుమతి యగుట గలదు.

చోడిమొక్క లక్షణములు, రకభేదములు

చోడిమొక్క దుబ్బుచేసి సామాన్యముగ 2-4 అడుగుల యెత్తెధుగును. బలమయిన నేలలలో నరుదుగ 5-6 అడుగులవర కెదుగుట గలదు. జొన్న, గంటె మొక్కలకంటె నిది మృదువయినది. అన్ని యంగములందును నీరు పొచ్చుగ నుండును.

చోడివేళ్ళు వరి వేళ్ళవలెనే పీచుగ నుండును. జొన్న, గంటె వేళ్ళంత దూరమునకును, లోతునకును వ్యాపింపవు. సామాన్యముగ 9-12 అంగుళముల వరకు బోవును.

కాండము యితర తృణధాన్యములవలె గుండ్రముగ గాక కొంచెము బల్లపరుపుగ నుండును. వరిలో వలెనే మృదువయినది. ఖండములు బోలుగ నుండును. గంటె వలెనే చోడిము సనేకములగు పిల్కలనుబెట్టి దుబ్బుచేయును. నేలకు పైనుండు కణుపులనుండి గూడ పిల్కలు బయలుదేరును. మొత్తముమీద గంటెలోవలెనే చోడిదుబ్బులందును సగటున దుబ్బునకు 3-5 పిల్కలుండును. అరుదుగ 15-20 వరకు బయలుదేరవచ్చును.

కాండమందలి ఖండములలో గొన్ని మాత్రమే నిడివిగ నెదుగును, అచటచట రెండు మూడు కణుపులు దూరముగ లేక యొకదానినొకటి యంటియుండుటచే నొకేకణువుగ గన

## 13 వ పటము



బడును. ఇట్టిచోట్ల బయలుదేరిన రెండు మూడు ఆకులును ఒకేకణుపున బయలుదేరెనా యనునట్లుండును. పొడవుగ నెదిగిన ఖండములు ఒక్కొక్క కాండమున సుమారు 4-6 ఉండును. 8 వరకు నుండుటగలదు. ఒక్కొక్క ఖండపు పొడవు దానిస్థాన

మును, మొక్కయొక్క యేపునుబట్టి 3-8 అంగుళములవరకు నుండవచ్చును. కాండపు దళము ఒకవైపు  $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$  అంగుళముల వరకును, రెండవవైపున అందు  $\frac{2}{3}$  మొదలు  $\frac{1}{2}$  వరకును నుండ వచ్చును.

ఆకులు పరియాకులకంటె దళసరిగ నుండును. పొడవు తక్కువ. నెడల్పు కొంచెమెక్కువ. బాగుగ నెరిగిన యాకు నందలి తొఱిమ పొడవు సుమారు 4-6 అంగుళములుండును. లేకు పొడవు సుమారు 12-20 అంగుళములుండును.

చోడివెన్ను లేక కంకి సామాన్యముగ 4-6 రెల్లులు గలిగియుండును. అరుదుగ 7-9 వర కుండవచ్చును. ఇందొకటి విడిగా క్రిందుగ నుండును. దీనిని సామాన్యముగ బొటనవేలు (Thumb) అందురు.



చోడివెన్ను

తక్కినవి కొంచె ముబ్బిన యొకే కలుపున గుండుగ బయలుదేరును. వీనిని వ్రేళ్లు (Fingers) అందురు. కొన్ని రకములలో నీవ్రేళ్లు లోనికి ముడుచు కొని యుండుటచే కురుచ గను, చిక్కగను గనబడును. ఇట్టి రకములను

ముద్దరకము లనవచ్చును. కొన్నిటిలో నీ వేళ్ళు చాల భాగము నిడివిగ నుండి చివళ్ళు మాత్రమే చోనికివంగి యుండును. కొన్నిరకములలో నీవేళ్ళనలే నంగక నిడివిగనే యుండును. ఇట్టిరకములు రెల్ల లేక రింజ రకము లనిపించుకొనును. ఇంచును వేళ్ళ పొడవున మరల కురుచ నిడివి భేదములుగల రకములు గలవు. రెల్లలపొడవు ముద్దరకములలో ఏవునుబట్టి సుమారు  $1\frac{1}{2}$ -4 అంగుళములవరకును, రెల్ల రకములలో 3-6 అంగుళముల వరకును ఉండవచ్చును.

ఒక్కొక్క రెల్లయందనేకము (సుమారు 60-80) అల్ప కణిశములుండును. ఇవి మధ్యకాడ కిరువ్విక్కలను రెండు వరుసలుగ నమరియుండును. ఒక్కొక్క యల్పకణిశమున 5-8 తువములుండును. ఇందు క్రింది యొకటి రెంటును తప్ప తక్కినవాని పంగలలో బుసము లుండును. మొత్తముమీద ఒక్కొక్క యల్పకణిశమున 5-7 పూవులుండును. ఈ తువ బుసములమధ్య నొక్కొక్క సంపూర్ణమగు (అనగా స్త్రీపురుషాంగములు రెండును గల) పూవుండును. ఇందు రెండు ఉన్నద్రకములును, రెండు కీలములుగల యండాశయ మొకటియు, మూడు కింజల్కములును నుండును.

చోడిపూవులు రాత్రి యొంటిగంట మొదలు తెల్లవాకుజామున 5 గంటలవరకు విడచుచుండును. ముద్దరకములలో నాలస్యముగను, రెల్ల రకములలో కొంచెము ముందుగను విడువనారంభించును. ఒక వెన్నునందుండు సుమారు 1500-3000 పూవు లన్నియు విడచుటకు 8-10 దినములు పట్టును. వరి, జొన్న పూవులవలెనే చోడి పూవులు చాలవరకాత్మ

సంపర్కములచలననే గగ్గనతులగును. అరుదుగ పరసంపర్కముగలుగుట గూడ గలదు<sup>37</sup>.

చోడిగింజలు జొన్నగింజల కంటెను మిక్కిలి చిన్నవి. ఒకతులమున నుమారు 40(0 గింజలుండును. కొంచె మించు మించు గుండ్రముగనుండును. గింజపైని సామాన్యముగ నొక విధమగు గోధుమవర్ణముగల పలుచనిపొర (ఫలకవచము) గలిగి యుండును. ఇట్టి రంగు లేక కొంచె మించు మించు తెల్లగ నుండు రకములునుగలవు. గోధుమవర్ణపు రకములలో నారంగునందు లేత ముదురు భేదములుగూడ గలవు. కాని గింజల ముదురు లేతలు, ముక్కుట మొదలగు నానినిబట్టి గూడ నీరంగు నూరుచుండుటచే నీభేదములను గుర్తించుట కష్టము.

మొక్క తెరిగినకొలదిని కొన్ని చోడి రకములలో నాయా భాగములందొకవిధమగు ఊహించు బయలుదేరును. సామాన్యముగ అక్ష-తోడిమ సంధి, ఆకు వంగుచోటు, కణుపు, ఖండము, వెన్నుమొక్క తోడిమ, చెల్లులు బయలుదేరుచోటు, తుచములు, కింజల్కములు, కీలము ఇవియే ఈ రంగు కాననగు భాగములు. కొన్ని రకములలో నీరంగు స్ఫుటముగను, కొన్నిటిలో పలుచగను నుండును. స్ఫుటముగ నుండు రకములలో నిది కణుపులందును, ఖండములందును మాత్రము చేను పండబారుపరకు కాననగును. తక్కిన భాగములలో కనుచుగ మాసిపోవును. పలుచగనుండు రకములలో నిది పండబారుసరికి కొంచె మించుమించు మాసిపోయి వీనికిని ఏభాగములందును రంగులేని రకములకును భేదము

గుర్తింతుట కష్టముగనుండును. కొన్ని రకములలో నీరంగు పైని పేర్కొనబడిన భాగములన్నిటియందును లేక తుషము లందును, కింజల్కములందును. కీలములందును మాత్రమే యుండును. ఇదియు తేలికగ నుండుటచే నీరకములకును, మొక్కలం దసలు రంగులేని రకములకును భేదమును గుర్తించుట కష్టము.

చోడిరకములకు వెన్నుయొక్క వైఖరినిబట్టి ముద్దచోడి, రెల్లచోడి యనియు, గింజల రంగులనుబట్టి యెర (యెర) గోధుమ) చోడి, నల్ల (నల్లగోధుమ\*) చోడి, మబ్బరాగి, తెల్లచోడి లేక తెల్లరాగి \* యనియు కొన్ని పేర్లు ఆ యా చోట్ల కొంతవరకు వాడుకలోనున్నను ఆ యా రకములకు వానిని సాగుచేయు కాలమునుబట్టియు విధానమును బట్టియు గలిగినపేళ్లే కర్షకుల నిత్యవ్యవహారమున హెచ్చు వాడుకలో నున్నవి. సామాన్యముగ కర్షకులు ఆ యా రకములను వానిని సాగుచేయదగు విధానమునుబట్టి మెట్టచోళ్ళనియు, ఊడ్చుచోళ్ళనియు రెండుతరగతులుగ విభజించి వ్యవహరించుచున్నారు. మెట్టచోళ్లు వర్షాధారమున సాగుచేయబడును. ఊడ్చుచోళ్లు నీరుపెట్టి సాగుచేయబడును. మెట్టచోళ్లు సాగు చేయు కాలమునుబట్టి మరల తొలకరిచోళ్ళనియు, మఖ లేక పెద్దచోళ్ళనియు రెండుపతరగతులుగ విభజింపబడుచున్నవి.

---

\* మొక్కలలో ఊదారంగు స్ఫుటముగనుండు రకములను నల్లచోడి యనియు, అట్టిరంగు అసలు లేకగాని స్ఫుటముగ లేకగాని అంతటను ఆకుపసురగ గనబడు రకములను తెల్లచోడి యనియు వ్యవహరించుటకూడ గలదు.

తొలకరిచోళ్ళు పడమటివర్షములు ప్రారంభించిన వెనుకను, మఖ లేక పెద్దచోళ్ళ వర్షములు ముగియుకాలమునను విత్త బడుచుండును. ఇవి రెండును వర్షకాలమందు వెన్నువేయుటచే వీనికి రెల్ల వెన్నుల రకములుగాని కొనలుమాత్రము వంగి యుండు రకములుగాని అనుకూలము. సామాన్యముగ యెర్ర లేక నల్లచోడిరకములే యీకాలములందు సాగుచేయుబడు చుండును. తొలకరిచోడికి కొన్నిచోట్ల పునాసచోడి యని కూడ పేరుగలదు. పెద్దచోడి కది మరియొకపైరు గోసిన వెనుక సాగుచేయుటచే కొయ్యగాలు చోడియనిగూడపేరు. ఈరెండు కాలములందును ఒకేరకమును సాగుచేయవచ్చును. నారు పెంచి చాలున వేయునపుడు రెంటికిని చాలుచోడియని పేరు గూడ గలదు. ఊడ్పుచోళ్ళ పునాస లేక బురద చోళ్ళనియు పయర లేక వేసవిచోళ్ళనియు ద్వివిధము. పునాస చోడిరక ములు ముందొలకరిలో అనగా వేసవికాలాంతమునను, పయర చోడి రకములు వర్షకాలాంతముమొదలు శీతకాలాంతము వరకును నాటబడుచుండును. ఇవి సామాన్యముగ ముద్దరకము లుగ నుండును. ఎరువు, నలుపు రకముతేగాక తెలుపు రక ములుగూడ నిట్లు నీరుపెట్టి సాగుచేయబడుచున్నవి. నీరుపెట్టి సాగుచేయు రకములు వర్షాధారమునగాని, ఒకకాలమందు సాగుచేయబడు రకములు మరియొక కాలమునండుగాని పైరు చేయుటకు సామాన్యముగ నర్హముగావు. కాని ముందుల కపవాడములు తేకపోలేదు. ఆ యీ రకములు ఫలించుటకు పట్టు కాలమునగూడ వ్యత్యాసములుగలవు. ఊడ్పుచోడిరక ములు సామాన్యముగ త్వరలో (2½-3½ నెలలలో) ఫలించును.



మెట్టచోడి రకములు విక్రీణ నెలలలో ఫలింఁచును. ఆలస్యముగ పండునవి పెద్దచోళ్లనియు, త్వరలో పండునవి చురుకైన లేక తేలికచోళ్లనియు వ్యవహరింపబడుచున్నవి.

కర్షకులు సాగుచేయు చోడిరకములు సామాన్యముగ స్వచ్ఛముగ లేక యందు సలురకములమొక్కలు కొద్దిగొప్ప చేరియుండును. ఇటీవల నీరకములు అనకాపల్లి, కొండుబత్తూరు వ్యవసాయ స్థానములందు పరిశోధింపబడి వానినుండి హెచ్చుపంటనిచ్చు స్వచ్ఛమయిన వంగడము లెంచి తీయు బడెను. వానివిత్తులు వృద్ధిచేయబడి కృషీశులుర కందజేయబడుచున్నవి. అట్టి వంగడముల వివరములు 1వ అనుబంధములో యివ్వడమయినది.

చోడి సాగునకు దగిన పరిస్థితులు

చోడిమొక్క యుష్ణమండల వాసి. కాని 5000 యడుగుల యున్నతము వరకును నుండు శీతలమునకొర్పి పెరుగుచున్నది.

చోడిమొక్క జొన్న, గంటె మొక్కలకంటె మృదువయినదియు, అన్ని యంగములందును హెచ్చునీరు గలదియు సగుటచే దీనికి హెచ్చు తేమగానుండు ప్రదేశము కావలయును.

ఆయా తరగతుల చోళ్ళను సాగుచేయు కాలములు వెనుకటి శీర్షికకింద స్థూలముగ నూచింపబడెను. మెట్టచోడి సాగు ప్రారంభించుటకు ఆంధ్రదేశమున పడమటి వర్షముల ప్రారంభము మొదలు అంతమువరకు తగినకాలము. చాల

చోట్ల సీరకములను తొలకరిలో అనగా, జూన్ - జూలై నెలలలో (మృగశిరా పంచకమున) విత్తుదురు. పడమటి వర్షము లాలస్యముగను తక్కువగను గురియు నెల్లూరు జిల్లాలోను, దక్షిణ జిల్లాలలోను, కొంతవెనుకగ అనగా పడమటివర్షములు కొంతవరకు గురిసిన పిమ్మటగాని, తూర్పువర్షములు ప్రారంభించు కాలమునగాని యీ మెట్టచోడి రకములు విత్తబడును. ఉత్తర సర్కారులలో మఖ లేక పెద్దచోడి యనబడునదికూడ యీ తరుణముననే (మఖ పంచకమున) విత్తబడుచున్నది.

ఊడ్చుచోడిలో జేరు పునాసరకములలో విశాఖపట్నం జిల్లాలో విరివిగ సాగుచేయబడు బురదచోడిని ముందొలకరి యంచు (కృత్తిక, రోహిణి కార్తైలలో) నారుపోసి మే-జూన్ నెలలలో (రోహిణి, మృగశిర కార్తైలలో) నాటుచుందురు. పయరచోడిని తూర్పువర్షములు వెనుకబట్టినది (నవంబరు) మొదలు మార్చి నెలాఖరు వరకు నాటుచుందురు.

చోడిచేలు సామాన్యముగ నన్నివిధముల నేలలందును పైరుచేయబడుచున్నవి. కాని గరువనేలలును, యినుక గరుములును యిందుల కనుకూలములు. గంటెకంటె చోడికెక్కువ తేమకావలసి యుండుటచే సామాన్యముగ గంటెచేలు పెరుగు కంకర నేలలుగాని, మెరకగానుండు బొండు యినుక నేలలుగాని చోడికంతగా సనుకూలములుగావు. కాని సముద్రప్రాంతములందలి కొన్ని బొండు యినుక నేలలందు సైతము విస్తారముగ యెరువువేసి యీ సస్యమును కొంతవరకు పైరుచేయుచున్నారు. ఇనుకపాలు తక్కువగనున్న యెర్ర నేలలలో వర్షములు తక్కువగు నెడల పదును నిల్వక నేల గట్టిపడిపోవుటచే

నీసస్యమంత బాగుగ నెదుగడు. కాని చాలచోట్ల నట్టి నేలలలో గూడ నీ సస్యము పైరుచేయబడుచునే యున్నది. అట్టి నేలలలో నీరు పెట్టి సాగుచేయుట లాభకరము. కొన్ని నల్లనేలలలో గూడ నిది సాగుచేయబడుచున్నది. కాని కొన్నిచోట్ల నిది వర్షాధిక్యముచే నప్పుడప్పుడు చెడుచుండును.

పరిమళ్యలో సామాన్యముగ పయరచోడి మాత్రమే సాగుచేయబడుచుండును. కొన్నిచోట్ల వర్షము లేమిచే పరి నాట వీలులేని సంవత్సరములం దామళ్లలో పరికిబడులు పెద్ద చోడిని చాలునవేసి సాగుచేయుటయు గలదు.

చోడిచేను నేలయందు ఊరద్రవ్యములు స్వల్పముగ నున్నను అనగా కొంచెము చవటకొడి నేలలందు సైతము తక్కిన తృణధాన్యములకంటె బాగుగ నెదుగును.

ఇట్లు చోడిని అన్ని విధముల నేలలలోను సాగుచేయ వీలగుచున్నను, గరుపకొడి నేలలలో నేమంచి పంటలు పండుచున్నవి.

### సేవ్యవిధానము

మెట్టనేలలలో చోడిని కాయధాన్యములు సెనగ, నూపు మొదలగువానితో మార్చి పెట్టవచ్చును. గంట, కొర్ర, జొన్న, మెట్టవరి మొదలగు తృణధాన్య జాతులతో మార్చి పెట్టుటయు చాలచోట్లగలదు. అప్పుడు దీనికిముందు గాని, వెనుకగాని యాసంవత్సరమే యేదైన కాయధాన్యమును సాగుచేయుదురు. మాదిరికొక పరివర్తన మీకింద జూపబడిను.

మొదటిపంట

రెండవపంట

1 వ సం॥ చోడి (తొలకరి)

ఉలవ

2 వ సం॥ నూవు

చోడి (పెద్దచోడి), ఉలవకలిపి

3 వ సం॥ వేరుపెనగ, జనుము  
(విత్తులకొరకు)కలిపి

రెండవసంవత్సరముగూడ నూవు + కంది పెట్టి తరువాతి సంవత్సరము మొదటిపంటగ గంటె లేక మొక్కజొన్న వేసి పిమ్మట పెద్దచోడి సాగుచేయుటయు గలదు.

తోటభూములలో నీరుపెట్టి సాగు చేయునెడలగూడ చోడిని పై సస్యములతోనేగాక మిర్చి, వంగ, పసుపు, చిరుగడము మొదలగు నితర తోటసస్యములతోగూడ మార్చిపెట్టవచ్చును. క్రిందిపరివర్తనమును చూడుడు.

మొదటిపంట

రెండవపంట

1 వ సం॥ చోడి

మిర్చి

2 వ సం॥ పసుపు, ఉల్లి కలిపి

చోడి (పయర)

3 వ సం॥ నూవు

మిర్చి

4 వ సం॥ కర్రపెండలము

కర్రపెండలము (నిలువ)

వరినేలలలో దీనిని వరికి ముందుగాని, వెనుకగాని పెట్టవచ్చును. క్రింది పరివర్తనము చూడుడు.

పునాసపంట

పెద్దపంట

పయరపంట

1 వ సం॥ మరద చోడి, జనుముకలిపి

వరి

నూవు, నీలి కలిపి

2 వ సం॥ నీలి (పసుకటిపైరు)

వరి

పయరచోడి, తీగ

పెసర కలిపి

3 వ సం॥ తీగపెసర (నిలువ)

వరి

చెరుకు

4 వ సం॥ చెరుకు (నిలువ)

—

చెరుకు (నిలువ)

చోడితో మిశ్రణముగ పైరుచేయు కొన్ని సస్యములు పై పరివర్తనములందు పేర్కొనబడెను. మినుముగాక బొబ్బర, అనుముగూడ తరచు పెద్దచోడితో కలిపి చల్లబడుచుండును. బురదచోడితో కలిపిచల్లబడు జనుము తరువాత పరిసస్యమున కెరువుగా నుపయోగపడును. పయరచోడితో చల్లబడు తీగ పెసరయు నిట్లే తరువాతి పరి కెరువుగా నుపయోగపడును. జనుమును విత్తనముకొరకు పెద్దచోడితోగూడ కలిపి చల్లుట గలదు. కొందరిచోడితో ఆముదములనుకలిపి సాగుజేయు దురు. దక్షిణాదిని పయరచోడితోను, తొలకరి లేక వునాన చోడితోనుగూడ వేరుసెనగలనుకలిపి సాగుచేయుట గలదు.

మెట్టచోడికి నేలను బాగుగదున్ని గడ్డలు లేకుండ చూడవలెను. ఇనుప నాగటితో రెండుసార్లు దున్ని పిమ్మట 3-4 సార్లు గుంటక తోలుట యనుకూలము. నేలకు సత్తువ చేయుటకు ఎకరము 1 కి 1000 గొర్రెలను లేక మేకలను మండగట్టుట మంచిది. ఈపని కడవటిసారి గుంటక తోలుటకు ముందు జరుగవలెను. ఇది సాధ్యము కాకపోయినయెడల పశువులయెరువును వేయవచ్చును. ఒక యెకరమున బండు సుమారు 1000 పౌనుల చోళ్లమూలమునను 2000 పౌనుల దంటు మూలమునను నేలనుండి 22 పౌనుల సత్రజని పోవును. దీనిని భర్తీచేయుటకు రెండుబండ్ల విడికొట్టపుతెరువును గాని, 4 బండ్ల సామాన్యపు తెరువునుగాని వేయవలసి యుండును. ఈయెరువు నెమ్మదిగ బనిచేయుటచే నెకరమునకు 8-10 బండ్ల చొప్పున పోయదగును. దీని సత్తువ యాపంటకే గాక తరువాతి 1-2 పంటలకు గూడ కొద్ది గొప్ప కనబడును. ఈయెరు

పును దుక్కి-సమయమున జల్లవలసి యుండును. ఈ యెరువు తగినంత లభించనిచో ఎకరమునకు 5 బండ్లు మాత్రము తోలి 500 మేకలను గొర్రెలను మందగట్టవచ్చును.

పైని చెప్పినట్లు బాగుగ దున్ని సాగు జేసిన నేలపై కంపతొడుగు దోలి విత్తులను నెడజల్లి పైని ఘరల కంపతొడుగును లేక తేలికయైన పట్టెను దోలవలెను. లేక ముందు పట్టెను దోలి విత్తులనుజల్లి తేలికగ గుంటకను దోలి పైని కంపతొడుగునుగాని, పట్టెనుగాని తోలవలెను. బాగ్రిత్తగ జల్లినయెడల నెకరమునకు 3-4 శేర్ల విత్తులు సరిపోవును, కాని దక్షిణాదిని కొన్నిచోట్ల 5-6 శేర్లు చల్లుటగలదు. కాయ ధాన్యములను చల్లు నెడల చోడివిత్తులను  $\frac{1}{2}$ -1 సేరు తగ్గించి ఆ విత్తులను 1-2 సేర్లు కలుపవలెను. బీదనేలలలో కొంచెము హెచ్చుగ గలుపవలెను. సత్తువ నేలలలో తగ్గించవలెను.

గొరుగోలి విత్తులను వరుసలుగ వేయునెడల గూడ నేలను పైని చెప్పినట్లే తయారుజేసి ఎకరమునకు 2-3 సేర్లు (4-6 పౌనుల) విత్తులను వేయవలెను. వరుసకును వరుసకును సుమారు 8-10 అంగుళముల యెడముండవచ్చును. సామాన్యముగ నిందులకు 6 చాళ్ళ గొరుగొని, 12 చాళ్ళ గొరుగొని ఉపయోగింపబడుచుండును. విత్తులను కప్పటకు గుంటకను తేల్చి తోలవలెను.

నారుపోసి నాగటిచాలున నాటు పద్ధతిలో నాటవలసిన భూమిలో యెకరమునకు సుమారు ఐదుసెంట్లచొప్పున నారు మడిని తయారుచేసి యందు వర్షపువదునున 4-6 సేర్లు (8-10 పౌనుల) విత్తులనుజల్లి నారు పెంచవలెను. వర్షములేక నా

రెండిపోవుస్థితికి వచ్చుచో కుండలతో నీరుచల్లి కాపాడవలెను. అధికవర్షమువలనగాని, సత్తువ చాలకగాని నారెండినచో మూత్రపురుగుంటినిగాని, చురుకుగ బనిచేయు నితర యెరువులు గాని జల్లినచో నారు చురుకుగ నెడుగును. అవసరమగుచో నొకసారి కలుపుతీయవలయును. సత్తువగల నేలలలో వర్షము లనుకూలముగ నున్నయెడల నారు సామాన్యముగ 4 వారములలో సిద్ధమగును. నాటుటకు తగిన వర్షము కురియనిచో 5-6 వారముల వరకు నూడ నారు మడిలో నుండువలసి వచ్చుట గలదు.

నారెడుగులోపుగ నాటవలసిన నేలను మెట్టచోడికి వలెనే సిద్ధముచేసి యుంచవలెను. నారును వర్షపు పడునునగాని అవసరమగుచో కుండలతో తడిసిగాని తీసి కట్టలుగ గట్టవలెను. తీసిన కట్టలను వేళ్ళు పైకుండునట్లు బణిపెగా బెట్టి 2-3 దినములుంచిన యెడల నారు బాగుగ నాటునని చాలమంది యనుభము. చోడి నారును గంటె నారువలెనే వేయవలెను. కాని చాలువిడిచి చాలులో గాక (వతి చాలుననువేయవలెను. రెండునాగళ్లు పనిచేయునెడల 8 మంది ఆడువాండు) నారువేయవలసి యుండును.

లేతనారు వర్షమనుకూలముగ నున్నయెడల బాగుగ నాటుకొనును, కాని వరపున కంతగా నాగదు. ముదురునాటు కొంతవరకు వరపునకు చాళును. కాని యిది నాటుకొనుటకు కొంత యాలస్యమగును.

ఊడ్చుచోడికి మళ్లుగట్టి నీరుతోడి నారును పెంచవలసి యుండును. మళ్లునీటి వసతినిబట్టియు, నేలయొక్క చదునును

బట్టియు 4-8 అడుగులవరకు పొడవు వెడల్పులు గలిగి యుండవచ్చును. ఒక యెకరము భూమికి సరిపడు నారును పెండుటకు 3-4 సెంట్ల విస్తీర్ణముగల మళ్లలో 2-3 సేర్ల విత్తులను జల్లిన చాలును. శ్రద్ధతో బెంచిన రెండుసెంట్లలో నొక సేరు చల్లినను సరిపోవును. బురదచోడి నారుమడికి వర్షము లేనిచో 4-5 దినములకొకతడియు, పయరచోడి నారుమడికి వారమునకొక తడియు కావలసి యుండును.

నీరుపెట్టి నాటబడుటచే నీనారు నంతగా ముదురక మునుపే నాటవచ్చును. సామాన్యముగ నిది శి వారములలో నాటుటకు తగియుండును. ఒక్కొక్కప్పుడు చురుకుగ నెదుగుచో 15 దినముల వయసు నారునే నాటుటగలదు. సుమారొక నెల వయసు దాటిన నారు నాటుట మంచిదికాదు. చాలుచోడి నారును వలెగాక యీ నారును తీసిన వెంటనే నాటుట మంచిది.

వెనుకటి పైకును గోసినవెంటనే దుక్కి పొరంబించి నాటదలచిన నేలను సాగుజేయవలెను. దంప నేలలలో ముఖ్యముగ పయరచోడికి మెట్టనేలలందుకంటె హెచ్చుసార్లు దున్నవలసి యుండును. ఇట్లు దున్నుకాలముననే మందగట్టుట గాని, యెరువువేయుటగాని జరుగవలెను. ఇట్లు తయారుచేసిన నేలయందు నీటి వసతినిబట్టి తగిన పరిమాణము గల మళ్లను గట్టి బోదుల నేర్పరచి నీరుపెట్టి నాటవలెను. చిన్న చిన్న మళ్లనుగట్టి నాటుట నీటిని పొదుపు చేయుటకే గాక సస్యపు పెరుగుదలను మంచిదే. కాని నీరు తగినంత లభించనపుడు భూమిని సారువలు (బట్టీలు)గ గాని, పెద్దపెద్ద మళ్లుగ గాని



కట్టి నాటుటయు గలదు. వరిమళ్లలో మరల చిన్న చిన్న మళ్లను గట్టక యేకముగ తడిసి నాటుటయు గలదు. ఈపద్ధతి చెరువులనుండి కాని, కాల్వలనుండి కాని నీరు లభించు కొన్న చోట్ల నవలంబింపబడుచున్నది. ఇందొక్కొక్కప్పుడు మళ్లారిన వెనుక దున్ని సాగుచేయుటకు బదులు, వరికోతయైన కొద్ది రోజులలో మళ్లలో నీరుపెట్టి దమ్ముచేసి నాటుట గలదు. సత్తువగలిగిన నేలలలో నీపద్ధతి కొంతవరకు పనికివచ్చును. కాని మొత్తముమీద నాటుట యాలస్యము చేసినయెడల నీరు లభింపదను కారణముచే నిట్లు నాటుదురేగాని యీ పద్ధతి యంతగా సమకూలముగాదు.

ఊడ్చుచోడి నారును పునాసపంటకు నేలయొక్క సత్తు వనుబట్టి 6-8 అంగుళముల కొక మొక్కచొప్పున నాటవలెను. పయరచోడిని 4-6 అంగుళముల దూరమున నాటవలెను. ఒకయొకరమును నాటుటకు సామాన్యముగ 12-15 ఆడు పాండు కావలసియుండును.

నెడచోడి కొకసారి గొప్ప త్రవ్వవలసి యుండును. చల్లిన రెండువారములలోపల ముందొకసారి త్రికోణపు పండ్ల చట్టమునుగాని, కారుమ్రానిని లేక పండ్లమ్రానినిగాని తోలి పిమ్మట మరియొక వారము పదిదినముల కిట్లు గొప్పత్రవ్వట ముంచిది.

గొర్రుతో వరుసలుగ విత్తిన చేలలోగూడ మొదట వరుసలమధ్య నొకసారి కారుమ్రానిని దోలి పిమ్మట మెట్ల గుంటకను రెండుసార్లు తోలవచ్చును. వరుసలలో కలుపు తీయవలసియుండును.

చాలుచోడికి వర్షములెగబెట్టినప్పుడేగాని సామాన్యముగ గొప్ప త్రవ్వనవసరముండదు. అవసరమగుచో నాటిన 4 వారములలో నొకసారి కలుపు తీయవలెను. ప్రతిచాలునను మొక్కలను నాటుటచే గుంటకతో గాని, నాగటితో గాని అంతరకృషికి వీలుండదు. కాని బొంగరము వేతకు బదులు చాళ్లు నిడివిగ నుండునట్లు పోసి నాటినచేలలో కారు లేక పండ్లప్రమానిని తోలవచ్చును.

ఊడ్పుచోడికి నాటిన వెనుక నేల యారగనే ఒకసారి గొప్ప త్రవ్వవలెను. కొన్నిచోట్ల మొదట కారుమానిన తోలి తరువాత గొప్పత్రవ్వదురు.

ఊడ్పుచోడికి - ముఖ్యముగ పయరచోడికి - నాటిన వెనుక గొప్ప త్రవ్వటకుముందు ఏదేని చురుకుగ బనిచేయు యెరువును చల్లుట యనుకూలము. ఇందులకు చాలచోట్ల పాటి గోడలవద్ద తుడిచిన చౌడు ఉపయోగింపబడుచున్నది. దీనిలో నత్రితములు మెండుగ నుండును. ఎకరమునకు 10 బస్తాల చొప్పున వేయవచ్చును. ఖరీదు 5-10 రూ పాయల వరకుండును. మొదట మందకట్టిన గాని, యెరువు వేసిన గాని 5 బస్తాలు చాలును. దీనికి బదులు మూత్రముతో నూరిన మంటి నుపయోగింపవచ్చును. మంటితో జేరిన మూత్రపు పరిమితినిబట్టి ఎకరము 1 కి 3-6 బండ్ల మన్ను చల్లిన చాలును.

గొప్పత్రవ్విన పిమ్మట నేలలోని పదును తగినంత యారినపిమ్మటనే ఊడ్పుచోడికి మరల నీరుకట్టవలెను. ఆరకుండ తడి పెట్టుచో చేను యెర్రబారిపోవును. పిమ్మట భూమి స్వభావమునుబట్టి వారము పదిదినములకొకసారి నీరుకట్టవలెను.

సామాన్యముగ పయరచోడికి 5-6 తడులు చాలును. వేసవి వర్షములప్పుడప్పుడు గురియుచో పునాన ఊడ్చుచోడికి సామాన్యముగ నాటుతడి తప్ప తరువాత తడి యవసరముండదు. కాని వర్షములు లేకపోయినచో 4-7 దినములకొకసారి నీరు కట్టవలసి యుండును. కొన్నిచోట్ల పయరచోడికి నీటిని పారుదల చేయుటకు బదులు అచటచట దీయబడు గోతులలోనికి నడిపి యందుండి 'నురిటీ'లనబడు చేతి గూడలతో మళ్ళపై చల్లుదురు. సామాన్యముగ నీటిపొడుపు కొరకట్లు చేయుదురు గాని మొత్తముమీద నిది చేసకంతగా మంచిదికాదు, అయినను అడుగు పడును త్వరలో నారక పైనిమాత్రమారి గట్టి పడు నేలలందిట్లు పైపైని తడుపుచుండునెడల చే నెర్రబడకుండ పెరుగును. చిన్నచిన్న మళ్ళగట్టుటకు బద్ధకించి నీరున్నదిగదా యని నీటిని పొర్లగట్టు పద్ధతియు చేసి కంతగా ననుకూలము గాదు.

చోడిచేలకు మొత్తముమీద సరిష్టములు తక్కువయని చెప్పవచ్చును. జొన్న, గంటె, మొక్కజొన్న చేలకు వలె పిట్టలకాపలా అవసరములేదు. కాని పిట్టలకితర యాహారము దొరకనపుడవి వెన్నులను విరుచుకొని పోవుటగలదు. గోతులున్నచోట నవికూడ వీనిని కోసికొని తినును. వీనిని పంట సమయమున బెడరించుచుండవలెను. ఎలుకలు గూడ చోడి వెన్నులను కొరికి వాని కన్నములలోని కీడ్పుకొని పోవుట గలదు. చుట్టుపట్ల నెలుక కన్నములున్నచోట్ల కనిపెట్టి త్రవ్వి వానిని బట్టుటయే ప్రతీకారము. విషపు పెరలనుగూడ బెట్టవచ్చును.

చోడిచేలకుబట్టు చీడ పురుగులలో నీ క్రిందివి ప్రధానములు<sup>37</sup>:-

1. గులాబీచర్మపు పీకపురుగు (pink borer-Sesamia inferens):- ఈజాతి రెక్కలపురుగు (Moth) మొక్క-డింభము కాండమును దొలుచుటచే మొవ్వు చచ్చును. ఇది మొక్కజొన్న, చెరుకు మొదలగు వానికి గూడ పట్టును. ఉత్తరసర్కారులలోను, రాయలసీమలోను దీనివలన గొంత హాని కలుగుచున్నది. మొవ్వు చచ్చిన కర్రలను మొదటికి అందుండు పురుగుతో సహా కోసి నాశనము చేయుటయు, దంటు కోతయైన వెంటనే కోతగాలును దున్ని వేయుటయు ప్రతీకారములు. \*

2. తెల్లపీక పురుగు (Saluria inficita):- ఈజాతి రెక్కల పురుగు డింభము కాండపు క్రిందిభాగమును దొలుచును. దీనివలన రాయలసీమలో నవ్వుడప్పుడు చోడిచేలకు కొంతనష్టము గలుగుచుండును. నారు మళ్ళలో దీనిపుబోనుల నుంచి యీ రెక్కల పురుగులను జంపుచో నీచీడ తరువాత సంతగా గానబడదు. చేలలో నీపురుగు దొలిచిన కర్రలను దీని నాశనము చేయవలెను.

పై రెండును గాక జొన్నకుపట్టు పీకపురుగు గూడ చోడి చేలకు బట్టుట గలదు. 59 వ పుట చూడుడు.

3. ఆకులనుదిన పురుగు (Leaf noctuid-Laphy-

---

\* నారుమళ్ళలోను మొక్కలను నాటిన తరువాతను డి. డి. టి. 0.16% మందును సాండోవిట్ (Sandovit) తో కలిపి పిచికారీచేసిన యాకీటకబాధను అరికట్టవచ్చును.

gma exigua):- ఈ రొక్కల పురుగు డింభములు లేత యాకులను-ముఖ్యముగ నారుమళ్లలో- దినుచుండును. ఇది విశాఖపట్నం జిల్లాలోను కొన్ని యితరచోట్లను అప్పుడప్పుడు గాననగును. పురుగులను వలలలో బట్టుటయు, పాపాణపు మందులను జల్లుటయు ప్రతీకారములు. బి. హెచ్. సి. 10% (గమేక్సిన్) గాని, డి. డి. టి. 10% మందుపొడిని చల్లి యీ చీడబాధను నివారించవచ్చును.

చోడిచేలకెంచదగినంత నష్టమును గలుగజేయు తెగుల్లీ పొంతములందుగానరావు. కాని కొన్నిచోట్ల నొక్కొక్కప్పుడొక శీలీంధ్రమువలన నాకులపైని వాని తొడిమలపైని చుట్టును గోధుమ వర్ణమును మధ్య బూడిద వర్ణమునుగల మచ్చలు బయలుదేరును. కణుపులును వెన్నుల ముచికలను నల్లబడును. వెన్నెందువలన నీరసించి గింజ స్ఫుటముగనుండక పోవుటచే పంట తగ్గిపోవును. (తగిన ప్రతీకారముంకను కనుగొనబడలేదు. ఇట్లు మచ్చలు బయలుదేరినపుడు చేనికి అగ్గి తెగులు తగిలినదందురు.) 1% బోర్డోమిక్సరు (Bordeaux mixture)గాని, పెరనాక్సు (Perenox) ఒకబొమ్మ మందును  $2\frac{1}{2}$  గాలన్లు నీటిలో కలిపిగాని, చల్లి ఈ తెగులును అరికట్టవచ్చును.

### కోత, కైలు వగైరా

చోడిమబ్బులందలి వెన్నులన్నియు నొకేసారి ముదురకపోవుటచేతను దంటుతోగూడ గోసి నూర్చినచో గింజలు సులభముగ కాలకపోవుటచేతను వెన్నులను ముందుగగోసి దంటును పిమ్మట గోయటయే యీ సస్యము మహనూలున

కనుకూలముగు పద్ధతి. మరియు వర్షకాలపు పంటలను మొదటికి గోసినచో పన యెండుటయు గప్టము. వయర చోడి చేలనుమాత్రము ఎండకాలమున గోతకు వచ్చుటచేతను కురుచగ నుండుటచేతను మొదటికిగోసి కైలుచేయుట కొన్నిచోట్ల గలదు.

కోసినవెన్నులను కుప్పగావేసి కొన్నిదినములు ముక్కనిచ్చినగాని యందలి గింజలు సులభముగ రాలవు. కొన్ని లేతగింజలుగూడ ఈలోపల గట్టిపడును. మరియు నిట్లు ముక్కుటవలన గింజలలో గొన్ని మార్పులుగలిగి యవి ప్రాతగిలినట్లు లేక పాతరవేసినట్లు ఆహారమున కెక్కువ యర్హమగును. ఇట్లు ముక్కిన చోళ్ళపిండితో చేయబడిన యంబలి యుడుకుటలో హెచ్చునీటిని పీల్చుకొని తక్కువ పిండితో హెచ్చు పరిమాణముగలదగును. తినువారికి సులభముగ జీర్ణమయి సంతృప్తి కలిగించును.

గింజ లెక్కువగ ముక్కిపోయిన నల్లబడును. తక్కువగ ముక్కినచో నింపగురంగు రాకపోవుటయేగాక నూర్పిడియు కష్టమగును. కావున వెన్నుల గుట్టయొక్క పరిమాణమును బట్టియు నందలి తేమను బట్టియు అది యెంతవరకు ముక్కిన గింజలకు సరియైన తంగువచ్చునో అనుభవమువలన గనిపెట్టవలెను. సామాన్యముగ నూటికి నుమారు 25 పంతులు తేమగల నాలుగుబస్తాల చోళ్ళగు వెన్నులను గుట్టగబెట్టి మూడురాత్రులుంచిన గింజలు సమమయిన గోధుమవర్ణముగలిగి యాహారమున కనుకూలముగనుండును. తేమ తక్కువగ నున్నగాని గుట్ట చిన్నదియైనగాని హెచ్చుకాల ముం

వలసియుండును; తేమ హెచ్చుగనున్న వెన్నులగుట్టను సకాలమున నారదీయనిచో హెచ్చుగముక్తి గింజలు వల్లబడిపోవును. \* వెన్నులు కొంచెముండుచో వానిని మొదట నొకసారి పశువులచే ద్రోక్కించి గింజలను బొత్తుచు కలిపి గోనెలలో బిగువుగ ద్రోక్కి యొకటి రెండు రాత్రిలుంచి పిమ్మట నారబోసి మరల ద్రోక్కించి యపుడు గింజలచుక్కతము మరల నొకరాత్రి గోనెలలోబోసి యుదినపిమ్మట నెండబోయుట గలదు.

చోడిగింజ చాల చిన్నదగుటచే నీ వెన్నులను గాని చేనిని గాని నూర్చుటకు కళ్ళము చదునుగ జేసి మున్ను లేక కుండునట్లు పేడతో నలికి సిద్ధముచేయవలెను. అట్టి కళ్ళముపై పైనిచెప్పినట్లు ముక్కబెట్టినవెన్నులను తగినంత యెండకాయుచున్న నాడారదీసి యెండిన వెనుక గింజలు రాలుపరకు పశువులచే ద్రోక్కించవలెను. వెన్నులు కొంచెమున్నపుడు వానిని కళ్ళముపై బరచి యెండినవెనుక బడెతలతో గొట్టి నూర్చవచ్చును. చోడిచేనిని మొదట గోసినచో ననను అందలి పను

\* గింజలందును, వెన్నులందును లేత ముదురులనబట్టియుండు లేమ ఒక తణిఖలో యీక్రిందివిధముగ నుండెను. 39

తేమ నూటికి పంభాలు

1. లేతవెన్నులు	48.17
2. ముదురువెన్నులు	25.08
3. లేత ముదురు వెన్నులు కలిసి	29.12
4. లేతగింజలు	40.47
5. ముదురుగింజలు (కొత్తగా నూర్చినవి)	18.98
6. పోకగింజలు	12.98

నొన్నబట్టి నెటనెగాని కొంతవరకారిన పిమ్మటగాని బణిపెగా పెట్టి యుక్తముగ ముక్కినవెమక యెండబెట్టి నూర్చవలెను, నిన్నులకొంతు నెన్నులను ప్రత్యేకముగ ముక్కినీయకుండ నెండబెట్టి గింజలను తీయవలెను.

గింజల నితర తృణధాన్యములవలెనే గాలి కెగురబోసి శుభ్రపరచవలెను. కాని యిల్లెగురబోయుటలో గింజలనుండి రెల్లలన్నియు విడిపోవును. కావున సామాన్యముగ నొకసారి యెగురబోసి కొంతవరకు శుభ్రపరచిన గింజలను జల్లించుట యవసరము. ఇందులకొక విధమగు వెదురుపేళ్ళ జల్లెడ (చోళ్ళజల్లెడ) యుపయోగింపబడు చుండును. ఇది సామాన్యముగ 3 అడుగులపొడవు 2 అడుగుల వెడల్పును గలిగిన దంగిడ యాకారముగలిగి రెండు వెదురుముక్కలపై గట్టబడి యుండును. ఈవెదళ్ళ కొనలను ఇద్దరుమనుష్యులు పట్టుకొని జల్లించు చుండురు. జల్లించి పేరుపరచిన రెల్లలను మరల నెండబెట్టి బడితెలలో గొట్టి గింజలను దీయవలసియుండును.

నెన్నులను మొదట గోసిన పిమ్మట దంటును గోయు నెడల నీదంటును మళ్ళలోనే పనలుగా పేసి యెండనిచ్చి కట్ట వలెను. లేక పచ్చిదంటునే పశువులకుపయోగించ వచ్చును.

చోడిదంటును పశువులకు పచ్చదిగ గాని, యెండబెట్టి గాని వేసినప్పటికంటె దానిని కొన్ని వారములు ప్రత్యేకముగ గాని, జనుములో కలిపిగాని పాతర వేసిన పిమ్మట పశువులు బాగుగ దినును. కావున చట్టుచేయుట మంచిది.\*

---

\*పాతరవేయు విధానమును గురించి పశువుల మేత సస్యములను గురించిన గ్రంథమున వివరముగ వ్రాయబడును.



చోళ్లు జొన్నలంత శ్రీఘముగ పూర్చిపోవు. కావున వానిని నిల్వజేయుట మలభము. వానిని గోనెలలో గాని, పొణ కలలో గాని నిల్వ యుంచవచ్చును.

సాతర వేసిన గింజ లొక్కొక్కప్పుడు పేగులలో తోష ముగలిగించుట వలన విరేచనములు, వాంతులును సగుట గలదు. దీనికి గారణము గింజలకు ముక్కులలో నొకవిధమగు శిరింధ్రము (Heterosporum) వుట్టుటయే యని కనుగొన బడెను. <sup>40</sup>

### ఆదాయ, వ్యయములు

ఆ యా పద్ధతులపై నొకయెకతమున చోడి సాగు చేయుటకగువ్యయమును, అందువలన రాదగు నాదాయమును క్రిందిపట్టికలలో యంచనా వేయబడెను.

#### 1. మెట్టచోడి-తొలకరిని వెదజల్లుట.

నెల	చేయవలసినపని	ప.జ.	మ.	ఆ.*	ద. అ. నై
వ్యయము:-					
డిసెంబరు	దుక్కి యెండుసార్లు	8	3		9- 0- 0
ఏప్రిల్	గుంటక తోలుట 3 సార్లు	1½	1½		4- 8- 0
	పకువులయెడవు 10 బళ్లు				
	(సగము ఖరీదు)				15- 0- 9
	తోలుట, చల్లుట (సగమువ్యయం)	1	3	1	5- 8- 0
జూన్	చిత్తులు (3 పౌసులు)				1- 0- 0
	చల్లుట, గుంటకతోకలుపుట	½	½		1- 8- 0
	మొత్తము	6	8	1	36- 8- 0

\*ప.జ.=పకువులజతలు; మ.= మగకాల్గడు ఆ.=ఆడువాండ్లు.

నెల	చేయవలసినవి	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప.జ.	మ.	ఆ.	రు. అ. పై.
	వెనుతిరుగుచుండి	6	8	1	36- 8- 0
	పండ్లమార్కెట్ లు తొలగించుచున్నది	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
జూలై	గొప్ప కలుపుతీత		1	12	7- 0- 0
సెప్టెంబరు	వెన్నుకోత		1	10	7- 0- 0
	దంటుకోత, కట్టుట, మోత		2	8	6- 0- 0
	నూర్చుడి ఎగురబోత	$2\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	6-14- 0
	గింజలు, దంటుతోలుట	$\frac{1}{2}$	2		2- 0- 0
	పన్నులు				4- 0- 0
మొత్తము		$9\frac{1}{2}$	$15\frac{1}{2}$	$32\frac{1}{2}$	71-14- 0

## ఆదాయము

చోళ్ళు 160 కుంచములు (800 పౌనులు)	రు. అ. పై.
రు 1 కి 1 కుంచము చొప్పున	100- 0- 0
దంటు 1750 పౌనులు (నుమారు 1 కి బండి)	
(రు 1 కి 200 పౌనుల చొప్పున)	8-12- 0
మొత్తము	108-12- 0
నికరాదాయము	36-14- 0

## II. మెట్టచోడి-తొలకరిని చాలువేత

నెల	చేయవలసినవి	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప.జ.	మ.	ఆ.	రు. అ. పై.
వ్యయము:- నారుమడి 5-సెంటు					
డి-సెంటరు- దుక్కి-2సార్లు, గుంటక తోలుట-					
మే	4 సార్లు	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
	మేకలను మందగట్టుట (200)				4- 0- 0
		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		5- 8- 0

నెల	చేయవలసిన పని	నలయుపాటు			వ్యయము
		ప. జ.	మ.	అ.	రు. అ. పై
	వెనుక పుటనుండి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		5- 8- 0
<b>నాలునవేయు పొలము</b>					
జూన్	విత్తులు-8 పొనులు				1- 0- 0
	చల్లుట గుంటకతో కలుపుట	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		0- 6- 0
డి సెంబరు	దుక్కి-2 రెండుసార్లు	3	3		9- 0- 0
	గుంటకతోలుట-2 సార్లు	1	1		3- 0- 0
మే	పశువులయెరువు 10 బండ్లు (సగము ఖరీదు)				7- 8- 0
	తోలుట, చల్లుట (సగము వ్యయము) 1		3	1	2- 12- 0
	కలియ దున్నుట	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$		4- 8- 0
జూలై	నారుతీత, మోత వర్గైరాలు		2	4	4- 0- 0
	నాగటిచాలున వేత	1	1	4	5- 0- 0
ఆగష్టు	కలుపుతీత		1	12	7- 0- 0
సెప్టెంబరు	వెన్నులకోత		1	12	7- 0- 0
	దంటుకోత, ఎండిన వెనుక కట్టలు				
	కట్టుట, మోత		2	9	6- 8- 0
	నూర్పు, ఎగురబోత	3	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	8- 4- 0
	గిరిజలు, దంటు తోలుట	$\frac{1}{2}$	2		3- 0- 0
	పన్నులు (సగము)				3- 0- 0
మొత్తపు వ్యయము		$9\frac{1}{2}$	$27\frac{1}{2}$	$48\frac{1}{2}$	77- 6- 0

ఆదాయము

	రు. అ. పై
చోళ్ళు 125 కుంచములు (1000 పౌనులు)	
రు 1 కి 1 కుంచము చొప్పున	125- 0- 0
దంటు 2000 పౌనులు (సుమారు 2 బళ్ళు)	
రు 1 కి 200 పౌనుల చొప్పున	10- 0- 0
మొత్తము	135- 0- 0
నికరాదాయము	57-10- 0

పెద్దచోడి మరియొక పంట తరువాత సాగు చేయబడుటచే 100 కుంచముల (800 పౌ.) గింజలును, సుమారు 1 $\frac{3}{4}$  బండి (1750 పౌ.)దంటును నిచ్చును. ఆదాయము రు28-8-0 వ్యయము పై విధమున సుమారు రు 27-4-0లు పోను నికరాదాయము రు 7-4-0 లు చూత్రమే యుండును. కాని దీనితో సామాన్యముగ అనుము, లేక బొబ్బర గలిపి పెట్టబడుటచే వీనినుండి వచ్చు నికరాదాయముతో జేరి మొత్తపు నికరాదాయము సుమారు రు 13-0-0 లు ఉండును.

III ఊడ్చుచోడి-పునాస

నెల	చేయవలసినపని	వలయుపాటు	వ్యయము
		ప.జ. మ. ఆ. రు.అ.పై.	

వ్యయము:-

నారుమడి-4 సెంటులు

డిసెంబరు-దుక్కి 2 సార్లు, గుంటకతోలుట

వీప్రిల్ 4-సార్లు	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1- 8- 0
మే మండిట్టుట 200 మేకలు			3- 0- 0
మొత్తము	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	4- 8- 0

నెల	చేయవలసినపని	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప. జ.	మ.	ఆ.	రు. ఆ. పై.
	వెనుకపుటునుండి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		4- 8- 0
	విత్తులు-6 పానులు				0-12- 0
	మల్లగట్టి చల్లుట, కలుపుట		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0-12- 0
	మోటుతో చోడి నీరుగట్టుట-తీరసమ				
	యమున కలిపి రసార్థ (11 అం.)	$1\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$		5- 0- 0
	మొత్తము	$1\frac{3}{4}$	$8\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	11- 0- 0
నాటబడు మల్లు					
డి సెంటరు-	దుక్కి-2 సార్లు	8	8		9- 0- 0
ఏప్రిల్	గుంటకతోలుట-4 సార్లు	2	2		6- 0- 0
	ఎరువు 10 బండ్లు (సగముఖరీడు)				15- 0- 0
	తోలుట, చల్లుట				
	(సగమువ్యయము)	1	8	1	1-12- 0
	మొత్తము	$7\frac{3}{4}$	$11\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	43-12- 0
మే-జూన్	మల్లు బోదులు కట్టుట		4		4- 0- 0
	నారుతీర. మోత		4		4- 0- 0
	నీరుతోడుట (8 అం.)	$4\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$		13- 8- 0
	నాటుట		1	12	7- 0- 0
జూన్	గొప్పతవ్వుట		1	12	7- 0- 0
	నీరుతోడుట-2 సార్లు (4 అం.) 6		6		18- 0- 0
ఆగష్టు	వెన్నులనీరుట		1	14	8- 0- 0
	చొప్పకోత, కట్టుట, మోత		2	11	7- 8- 0
	నూర్చిడి, ఎగురబోత	$8\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{4}$	9-10- 0
	గింజలు, దంటుతోలుట	$\frac{3}{4}$	3		4- 8- 0
	పన్నులు				2- 0- 0
	మొత్తము	$22\frac{1}{2}$	$39\frac{3}{4}$	$52\frac{1}{2}$	128-14- 0

## ఆదాయము

240 కుంచముల (1920 పౌనుల) చోళ్లు రు 1కి 1 కుంచముచొ॥	240-0-0
దంటు 8000 పౌనులు	15-0-0
మొత్తము	255-0-0
నికరాదాయము	128-2-0

## IV. ఊడ్పుచోడి-పయర

నెల	చేయవలసినపని	కలయుపాటు	వ్యయము
ప. జ.	మ.	ఆ.	రు. ఆ. పై

## వ్యయము:-

నారుమడి 4-సెంటు

అక్టోబరు చుక్కి-2సార్లు, గుంటకతోలుట-

నవంబరు- 4 సార్లు  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  1- 8- 0

డిసెంబరు మేకలనుమందగట్టుట (200) 8- 0- 0

విత్తులు-6 పౌనులు 0-12- 0

మళ్ళుగట్టి చల్లుట, కలుపుట  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  0-12- 0

డిసెంబరు-మోటుతో నీరు తోడి కడుపుట-

జనవరి తీరసమయముననహా4సార్లు (8అం.) 1 1 3- 0- 0

మొత్తము  $1\frac{1}{2}$  2  $\frac{1}{2}$  9- 0- 0

## నాటబడు మళ్ళు

నవంబరు- చుక్కి- కెండుసార్లు 3 3 9- 0- 0

డిసెంబరు గుంటకతోలుట 4సార్లు 2 2 6- 0- 0

పశువులయెరువు 10 బండ్లు

(సగము ఖరీదు) 15- 0- 0

తోలుట, చల్లుట (సగమువ్యయము) 1 3 1 2-12- 0

మొత్తము  $7\frac{1}{2}$  10  $1\frac{1}{2}$  41-12- 0

నెల	చేయవలసిన పని	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప.జ.	మ,	ఆ	రు. అ. పై
	వెనుకటి పుటనుండి	7½	10	1½	41-12-0
జనవరి	మళ్ళు, బోదులు కట్టుట		4		4-0-0
	నారుతీత, మోత వగైరాలు		4		4-0-0
	నీరుతోడుట (3100)	4½	4½		13-8-0
	నాటుట		1	12	7-0-0
ఫిబ్రవరి	గొప్పకత్తివ్రుట		1	12	7-0-0
ఫిబ్రవరి	నీరుతోడుట 3 సార్లు (6 అం.)	9	9		37-0-0
మార్చి	నీరుతోడుట 2 సార్లు (4 అం.)	6	6		13-0-0
	వెన్నుల నేరుట			12	7-0-0
	దంటుకోత		2	10	7-0-0
	నూర్పు, ఎరుగబోత	3½	13½	13½	8-10-0
	గింజలు, దంటు లోటుట	3½	1½		3-0-0
	పన్నులు				2-0-0
	మొత్తము	26½	41½	49½	149-14-0

## రాబడి

చోళ్లు 240 కుంచములు (1920 పౌనులు)	రు. అ. పై
రు 1 కి 1 కుంచము చొప్పున	240-0-0
దంటు 2500 పౌనులు (మూడు 2½ అళ్ళు)	
రు 1 కి 200 పౌనుల చొప్పున	12-8-0
మొత్తం	252-8-0
నికరాబాయము	102-10-0

అనుకూలమగు పరిస్థితులందు తగిన కృషిచేయుచో డొడ్డుచోడి పంట యెకరమునకు 300 కుంచములకుపైగా కావచ్చును. అనకాపల్లి జ్యేష్ఠమున 1939-40వ సంవత్సరమున నెం. 525 రు చోడి పునానపంటగా నెకరము 1 కి 2669

పానులచొప్పున నిచ్చెను. మరియొక వంగడము కోయంబ తూకు వ్యవసాయ స్థానమున 1930-31 వ సంవత్సరమున ఎ 2.66 సెంట్లపై సగటున నెకరమునకు 3492 పానులచొప్పున నిచ్చెను. ఇటీవల నాక్షేత్రమున నెంచి తీయబడిన మరియొక (నెం. 3517 రు) వంగడము ఎ 1-24 సెంట్లపై నెకరమునకు 4075 పానులచొప్పున నిచ్చెను. కావున పరివలెనే చోడియు శ్రద్ధగ సాగుచేయుచో మిగుల క్షేమపంటనిచ్చి ప్రజల కంత కంటెను పుష్టికరమగు నాహారము నొసగు విలువయైన సస్య మని చెప్పవచ్చును.

### ఉపయోగము

చోళ్ళను విసరి యాపిండితో అంబలిజేసిగాని, రొట్టె కాల్చిగాని తినవచ్చును. \* మైసూరురాష్ట్రమున 'సంకటి'గా వండి తిందురు. కొందరు దీనిని పరి, జొన్న మొదలగువాని పిండితో కలిపి యుపయోగింతురు. గింజలను మొలకకట్టి కొంచెముపేచి పిండిగావిసరి యాపిండితో జావనుకాచి పాలను బెల్లము లేక చక్కెరను చేర్చిగాని మజ్జిగను, ఉప్పును జేర్చి కాసి ఉదయము కాఫీకిబదులు పానీయముగ పుచ్చుకొనుటకు ముఖ్యముగ శరీరవైశ్రమ గలవారికి - చాల యనుకూలముగ నుండును.

నాలుగునమూనాల చోళ్ళసంఘట్టనము I-A అను బంధమున జూపబడెను. చోళ్ళ పౌష్టికశక్తియందు జొన్నల

---

\* పిండిగావిసరి చెరిగినచో పొట్టు నూటికి 5-6 వంతులుమాత్రమే పోవును. జొన్నలను, గంటలను దరిపి బియ్యము చేయుచో వరుసగా నూటికి 14.8 వంతులు పొట్టుపోవును. 24



కంటెను, గంటెలకంటెను యించుక తక్కువ. చోళ్ళు మేహ శామకములు. ఉష్ణతత్వము గలవారికి మిక్కిలి యుపయోగించును.

చోడిదంటు సంఘట్టనము I.౯ అనుబంధమున జూపబడెను. అందలి యంకెలనుబట్టి చూచినయెడల నిది జొన్నదంటున కంతగా తీసిపోదు. కాని దీనివిలువ రసాయనిక సంఘట్టనమును బట్టిమాత్రమే నిర్ణయింప వీలులేదు. పశువులకు మేపి యితర తృణధాన్యముల దంటుతోపోల్చిన నిది యెంత సత్త్వవశేయునో తెలిసికొనవలయును.

# కొర్ర

Italian millet-Setaria Italica

అలెగ్జియా-తైనై; కన్నడము-విలిసరగు; మళయాళము-తెన;

మైథిలము-కంగు; హిందీ-కంగు; సంస్కృతము-ప్రియంగు.

## చరిత్ర, వ్యాపకము

కొర్ర ఇండియా దేశమున ప్రాచీనకాలము నుండియు సాగునందున్న తృణధాన్యములలో నొకటి. యజుర్వేదము (3-2-5)లో బేర్కొనబడిన సప్తగ్రామ్యములలోను, బృహదాంశ్యశోపనిషత్తు (2-13) నందలి దశధాన్యములలోను నిది యొకటిగ బేర్కొనబడెను. కొటిల్కుని అర్థశాస్త్రమున (2-24) నిది వర్షకాలపు పైరులలో నొకటిగ బేర్కొనబడెను.

ఇట్లు ప్రాచీనకాలమునుండియు కొర్ర ఇండియాలో సాగునందుండుటచేతను, హిమాలయపర్వత ప్రాంతములందिది యిప్పటికిని వన్యస్థితిగ గాననగుటచేతను నీజాతి కిదియే అదిమ స్థానముగ నెంచబడుచున్నది. కాని చీనాదేశమున నుచూరు కీ॥ పూ॥ 3700 సంవత్సరములకిందట చక్రవర్తిచే ప్రతిసంవత్సరమును వ్యవసాయారంభకాలమున స్వయముగా విత్తించు సంవధాన్యములలో నిదియొకటిగ బేర్కొనబడియుండుటచేతను ఇండియాలోకంటె ప్రాచీనకాలముననే యిది చీనాయందు సాగునందుండెనని కొందరు శాస్త్రజ్ఞు లూహించు

చున్నాడు. జపాను దేశమునగూడ నిది వ్యవస్థితమందు గాన వచ్చును.

కొర్ర లిపు డిండియా దేశముననే గాక కొన్ని యితర దేశములలోగూడ గొంతువరకు సాగుచేయబడుచున్నవి. ఐరోపా దక్షిణభాగమునను \* చీనా, జపాన్ దేశములందును, ఉత్తరాఫ్రికా యందును, అమెరికాలోని సంయుక్తరాష్ట్రము లందును, కెనడాలోను దీనిసాగు కొంతవరకు గలదు. కాని ఆయా దేశములందీ సస్యము సాగుచేయబడు విస్తీర్ణము తెలియదు.

ఇండియా దేశపు వ్యవసాయపు లెక్కలలోగూడ కొర్ర చేలవిస్తీర్ణము ప్రత్యేకముగ తెలుపబడుటలేదు. కాని యిది చాలరాష్ట్రములలో కొద్ది గొప్ప పైగుచేయబడుచున్నది.

చెన్నపురి జాజధానిలో కొర్ర సాగు చేయబడు సామాన్య విస్తీర్ణము (Normal area) 1,5,46,040 యెకరములు ఇందు 1,4,94,950 యెకరములు అనగా నూటికి 94 వంతులు తెలుజిల్లాలలోనివే. అందును బళ్ళారి, కర్నూలు, అనంతపురంజిల్లాలు మూడింటియందుమాత్రమే దీనిసాగు విస్తారముగా నున్నది. ఈ మూడుజిల్లాలలోని విస్తీర్ణముచేరి మొత్తపువిస్తీర్ణం నూటికి సుమారు 80 వంతులుండును, ఆయా జిల్లాలయందలి విస్తీర్ణ మింకింది పట్టికయందు జూపబడెను. <sup>4</sup>

---

\* ఇటలీదేశమున విరివిగ సాగుచేయబడుచుండుటచేతనే దీనికి Italian millet అని పేరు గలిగెను.

జిల్లా	ఎకరములు
బళ్ళారి	519,000
కర్నూలు	442,000
అనంతపురం	320,000
కడప	101,000
గుంటూరు	58,500
నెల్లూరు	25,700
విశాఖపట్నం	21,000
తూర్పుగోదావరి	8,670
చిత్తూరు	2,800
కృష్ణా	650
పడమటిగోదావరి	530
మొత్తము	14,94,950

### కొర్రమొక్క సామాన్య లక్షణములు, రకభేదములు

కొర్రమొక్క సామాన్యముగ 3-5 అడుగులవర కెదుగును. కొంతవరకు గంటెమొక్కనుబోలి యుండును. కాని అంతకంటె కాండములును, ఆకులును గూడ సన్నము. గంటెవలెనే కొర్రయు దుబ్బుచేయును.

వేళ్ళు గంటె వేళ్ళకంటెను సన్నముగ నుండును. సామాన్యముగ నుచూరు 6-9 అ. లోతువరకును బోవును. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులయందు క్రిందికి 2½ అ. లోతువరకును, పక్కలకు 1½ అ. దూరము వరకును వ్యాపించుట గలదు. భూమిపైనుండు యొకటి రెండు కణుపులనుండి గూడ వేళ్ళు పోయుటయు యందు కొన్ని నేలలోనికి దిగి వ్యాపించుటయు గలదు.

కాండము గంటె కాండమువలెనే పైని వేడుచు కొనబెడుచు గలిగి అంతకంటె సన్నమగును. గట్టిగను నుండును. మొక్కలందలి దీర్ఘతమమయిన ఖండములు సామాన్యముగ 3-6 అంగుళముల పొడవుండును. కాని కొనుగ నెదిగిన మొక్కలలో కొన్ని 7-8 అంగుళముల పొడవుండుట గలదు. లావు సామాన్యముగ  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  అంగుళమువరకుండును.

ఆకుల కొనలు నిడివిగ పాగి సన్నని మొన దేరి యుండును. దీర్ఘతమ మయిన యాకు లొడిమి పొడవు సుమారు 4-6 అంగుళములుండును. రేకు 12-18 అంగుళముల పొడవును,  $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{4}$  అంగుళము వెడల్పును గలిగియుండును.

కొర్రవెన్ను సుమారు 5-8 అంగుళముల పొడవును,  $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{4}$  అంగుళములవరకు లావును గలిగి యుండును. అరుసుగ

15 వ పటము



కొర్రవెన్ను ( $\frac{1}{2}$  పైజు)

10-12 అంగుళముల పొడవు వరకుండవచ్చును. పండినపుకు వరివెన్నువలెనే సొంపుగ పంగి యుండును. నిలువుగనేయుండు రకములు గొన్నిగలవు. అల్ప కణిశములు గుత్తులు గుత్తులుగ వెన్నునందు మరచుట్టుపెఱిని దగ్గర దగ్గరగ నమరియుండును. కావున నీవెన్ను గంటె వెన్నువలె నిజమైనకంకి(Spike)కాక పోయినను దానివలె చిక్కగను, వర్తలముగ నుండును.

క్రిందివైపునకొంచెములావుగనుండి కొననునన్న గిలియుండును. అల్పకణిశములు ఒక్కొక్క గుత్తిలో సుమారు 40-50 వరకుండును. ఇవిగాక కొన్ని చుట్పకణిశముల కాడలు తుషములు గాని పూవులుగాని లేక రోమములు లేక ముండ్లుగ పరిణామము నొందును, ఇట్టి రోమములు కొన్నిరకములలో పొడవుగనుండి వెళ్ళు వైకి వచ్చుటచే నట్టిరకములు ముండ్ల కొర్రలనిపించును చున్నవి. వెన్ను లేతగ నున్నపుడు ముండ్ల రంగు ఆయారకములలో ఆకుపసరు, ఊదా, గోధుమవర్ణ భేదములు గలిగియుండును. గంటె రకములలో వలెనే కొర్రరకములలోను రోమములు లేక ముండ్లు ఎక్కువగ నుండు రకములలో పూవులుంగు అల్పకణిశములు పలుచగ నుండుట చే నెచ్చు ముద్దరకములలోనున్నంత చిక్కదనము లేకుండును.

ఒక్కొక్క వెన్నునందలి పూవులన్నియు విడచుటకు సుమారు 10-15 దినములు పట్టును. పూవులు చాలభాగముగాగ్రి 8 గంటలు మొదలు ఉదయము 10 గంటలలోపల విడచును. వాయువునందు ఆర్ద్రత హెచ్చుగనుండి ఉష్ణత తక్కువగనుండు కాలమున అసగా పడిరాత్రియందే యవి చురుకుగ విడచును. పూవుల నిర్మాణ మింత్యసంపర్కమునకే యనుకూలముగ నున్నది. కాని అరుదుగ పరసంపర్కమువలన గూడ నొక్కకపూవు గర్భవతి యగుట గలదు.<sup>43</sup>

కొర్రగింజ విన్నది. తులచునకు సుమారు 4000 గింజలు తూగును. గింజ నాచరించుముందు చాలుగవ తుషము యొక్కయు, అందలి బుసముయొక్కయు రంగునుబట్టియే కొర్రలలో రంగుభేదము లేర్పడుచున్నది. సామాన్యముగనివి

లేబసిమిరంగు గలిగియుండును. ఈరంగుతో యించుక ఎరువు రంగుగాని, మసర వర్ణముగాని సంయోగించి యుండురకములును, కేవలము యెరువుగనుండు రకములును, మసర లేక నలుపు రకములును గూడ గలవు.<sup>43</sup>

చోడిలోవలెనే కొర్రలోను మొక్కయొక్క కొన్ని కొన్ని భాగములందు ఊదారంగుండు రకములును, నుండని రకములును గలవు. ఈరంగుండు రకములలోగూడ రంగు యొక్క సాంద్రత యందును, అదిగనుండు భాగములందును వ్యత్యాసములుండును. కాని సామాన్యముగ సాగునందున్న రకములలో రంగులేని మొక్కలును రంగు గలవియు గూడ కలసియే యుండును.

కొర్ర మొక్క లెదుగు యెత్తు సామాన్యముగ పరిస్థితులనుబట్టి యుండును. కాని యిది కొంతవరకాయా రకముల ప్రత్యేక లక్షణమనికూడ కనుగొనబడెను.<sup>44</sup>

కొర్రలలో పైని చెప్పినట్లనేక లక్షణభేదములున్నను సామాన్యముగ రక భేదములను గుర్తించుటలో గింజల రంగు నకును వెన్నుయొక్క వైఖరికిని అందలి రోమముల స్వభావమునకును మాత్రమే ప్రాముఖ్యమొసగబడు చున్నది. ఈ క్రింద యాంధ్రదేశమున సేవ్యమునందున్న ముఖ్యరకముల పేర్కొనుచు వాని ప్రధాన లక్షణములును దెలుపబడును.

1. తెల్ల లేక పచ్చకొర్ర:-చాలచోట్ల సాగునందున్న రక మిదియే. గింజలు లేబసిమి రంగుగలిగి యుండును. మొక్క దుబ్బుచేయుటలో మధ్యమము. వెన్ను పెద్దదిగ నుండును, రోమములు తక్కువ, అరుదుగ గాని పైకి కన్పించును.

పవు. ఇట్లు రోమములు లేక నున్నగనుండు వెన్నుల రకములకు కర్నూలు, నెల్లూరు జిల్లాలలో కొన్నిచోట్ల బోడికొర్రయను పేరుగలదు.

2. ఎర్రకొర్ర:— ఇందు గింజ యెర్రగ నుండును. కర్నూలు జిల్లాలో కొన్నిచోట్ల సాగునందుగలదు. మొక్క బాగుగ దుబ్బుచేయును. వెన్ను పెద్దది. వరపున కాగును.

3. నల్లకొర్ర:—గింజలు నల్లగనుండును. బళ్ళారి జిల్లాలో కొన్నిచోట్ల నరుదుగ సాగునందుగలదు.

4. జడకొర్ర:—ఇందు వెన్ను నందలి యల్పకణిశముల గుత్తులు పైరకములలోకంటే నిడివిగ నుండి జడయల్లినట్లమరి యుండును. రోమములు తక్కువ. కాని మొదటి రకములోకంటే హెచ్చుగ పైకి గనుపించుచుండును. అంత బాగుగ దుబ్బుచేయదు. నీరుపెట్టి సాగుచేసిన మంచిపంట నిచ్చును.

5. మొండికొర్ర:—ఇందు వెన్ను తక్కిన రకములలో వలె ఆదోకగా నుండక క్రిందను మీదను కొంచెమించు సమమైన లావుగలిగి కొన మొండిదేరి యుండును. అల్పకణిశపు గుత్తులు చిక్కగ నమరియుండును. రోమములు తక్కువ. కొంచెమించు ముంచు మొదటిరకమువలె నున్నగ నుండును. ఇది బళ్ళారి, విశాఖపట్నం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలలో నరుదుగ సాగునందున్నది.

6. బొంతుకొర్ర:—ఇందు రోమములు తక్కిన రకములలోకంటే హెచ్చుగను, పొడవుగను నుండును. వెన్నును అంత చిక్కగ నుండదు. విశాఖపట్నం జిల్లాలోని ఈకల కొర్రయు, నెల్లూరుజిల్లాలోని బొచ్చు కొర్రయు నిట్టిరకములే.



7. పోటికొర్ర:—ఇది విశాఖపట్నం జిల్లాలో కొండ పోళ్ళలో సాగునగల రకము. ఇందు కాండ ఖండములనుంట్ల పొచ్చుగ (10-18) ఉండును. ఆకులదలి రేసలు కురుచగ నుండును. వెన్నుపొడవును, లావును పొచ్చుగ ఉండిన చెనుక రెల్ల త్వరలో రాలిపోవును. గింజ లించేము ముసుగు.

పై ముఖ్య రకములు కాక పిచ్చకొర్ర (కడప), పెద్ద కొర్ర (బళ్ళారి), గూబకొర్ర (కర్నూలు), సన్న కొర్ర, చిప్పకొర్ర (గుంటూరు) అను పేళ్లతో వ్యవహరించబడు చున్న రకములు ఆయా జిల్లాలలో గలవు.

సక్కకొర్ర యనునది కొర్రజాతిలోనిది కాక ఆ గణ ములోనే జేరిన మరియొక ప్రత్యేకజాతి (*Setaria pallidiflora*) లోని దగుటచే దానిని గురించి వేరుగ వ్రాయబడును.

ఈ రాజధానియందంతటను నిట్లు వివిధముగ పేళ్లతో నున్న ప్రత్యేకరకముల చేలయందలి మొక్కలను బాగుగ పరీక్షించిన నందు కొన్ని కొన్ని లక్షణములందు భేదములు గల పెక్కు రకములను మొక్కలు గాననగును. కొయంబ తూరు చికుధాన్య పరిశోధనా స్థానమున బరీక్షింపగా 44 నిర్దిష్ట లక్షణములుగల ప్రత్యేక రకముల మొక్కలు బయలు జేరెను. ఇట్టివానినుండి ఆయా వ్యవసాయ స్థానములందేర్ప రుపబడిన కొన్ని స్వచ్ఛమైన వంగడములివుడు రైతుల కంద జేయబడుచున్నవి. దీనినిగురించి అనుబంధములో యివ్వడ మయినది.

## కొర్రకుదగిన పరిస్థితులు, సేవ్య విధానము .

కొర్ర యాసేతు హిమాలయపర్వతమును సముద్ర మట్టము మొదలు 6500 అడుగుల యెత్తువరకును సాగునందు ఉన్నది. కావున నిది వేడిమికిని కీతలమునకు గూడ తాళునని చెప్పవచ్చును. ఇది గంటె కంటె యించుక హెచ్చు తేమ గల పరిస్థితులలోగూడ పెరుగ గలదు.

కొర్ర సామాన్యముగ మెట్ట నేలలో పడమటి వర్షములు తగినంత గురియుగనే విత్తబడి తొలకరిపంటగ సాగు చేయబడుచుండును. చల్లిక ఉత్తర సర్కారులలో సామాన్యముగ జూన్-జూలై నెలలలోను, దత్తమండలములలో జూలై మొదలు సెప్టెంబరు వరకును జరుగుచుండును. బళ్ళారిజిల్లాలో ప్రత్యేకముగ జల్లు నెడల జూలై మధ్యనుండి ఆగష్టు మధ్య వరకును, ప్రత్తితోకలపి చల్లునెడల ఆగష్టు మధ్యమొదలు-సెప్టెంబరు మధ్యవరకు జల్లుబడును. నీరుపెట్టి సాగుచేయు చోట్ల కొర్ర (సామాన్యముగ జడకొర్ర) పయర లేక వేసవి పంటగగూడ సాగుచేయబడుచున్నది. విశాఖపట్నం జిల్లాలో నిది మాగాణి భూములలో పరికిముందు పునాసపంటగ సాగు చేయబడుచున్నది. కొర్రచేను రకమునుబట్టి సుమారు 3-4 నెలలలో ఫలించును.

కొర్రకు జగురు నేలనుకూలములు. కావున జొన్న వలె నిదియు ప్రత్తి లేవడి నేలలలోనే విస్తారముగ సాగుచేయబడుచున్నది. తాని పండలి నేలలలో నిది ప్రశస్తముగ ఫలించును. కొన్ని యెర్రనేలలలోను, బలపరచిన యిసుకకొడి

నేలలందును గూడ నిది పైరుచేయబడుచున్నది. అట్టి నేలలలో పంట పరిమితి నేల సత్త్వముబట్టి యుండును.

కొర్ర రేవడి నేలలలో జొన్న, ప్రత్తి, సెనగ, ఆముదము మొదలగు సస్యములతో మార్చి సాగు చేయబడుచుండును. అట్టి నేలలలో దీనితో కలిపి సాగుచేయబడు ముఖ్య సస్యము ప్రత్తి. ఈ సస్యము విస్తారముగ పైరుచేయబడు బళ్ళారిజిల్లాయందవలంబించబడు కొన్ని ముఖ్య పరివర్తనములును, మిశ్రణములును ఈకింద తెలుపబడును.

సామాన్యపు అనగా వర్షములు కొంచెము పెనుకగ  
గురియు సంవత్సరములలో

తొలకరి లేక పెద్ద లేక

ముంగారుపంట హింగారుపంట

1 వ సం॥

కొర్ర

ప్రత్తి

ముందుగా అనగా

లేక

జూలై నెలలో

కొర్ర + పునాసజొన్న జొన్న లేక  
(మేతకొర్రకు) సెనగ

తగినంత వర్షము  
గురియుచో

లేక

—

కొర్ర + ప్రత్తి

వర్షములు పెనుకగ  
గురియుచో

2 వ సం॥

—

జొన్న + సెనగ +  
(ఒక్కొక్కప్పుడు) కుసుంబా  
లేక

—

జొన్న + కాయధాన్యములు

తగినంతభూమి గలిగినవారు మూడవ సంవత్సరమున ఆముదములు, సెనగలు సాగుచేసి నాలుగవ సంవత్సరమున మరల కొర్ర, ప్రత్తి కలిపి సాగుచేయుట గలదు.

గోదావరి జిల్లాలోని వండలి నేలలలో నీక్రింది పరివర్తనము లవలంబింపబడు చున్నవి.

	మొదటిపంట	పెద్ద లేక పయరపంట
1 వ సం॥	కొర్రు	పెసగ
2 వ సం॥	—	పొగాకు
3 వ సం॥	—	జొన్న + ఉలవ
	లేక	
1 వ సం॥	—	పొగాకు
2 వ సం॥	కొర్రు*	ఉలవ
	లేక	
1 వ సం॥	కొర్రు	పెసర
2 వ సం॥	మెట్టవరి	అనుము
3 వ సం॥	—	పొగాకు లేక మిర్చి

కొర్రుతో కొన్ని చోట్ల వేరు పెసగ, నీలికలిపి కూడ పైరుచేయబడుచున్నవి. కొన్ని చోట్ల కొర్రును మెట్టవరి లేక చోడితోగలిపి సాగుచేయుట గలదు.

రాయలసీమలో కొర్రు సాగుచేయబడు రేవడినేలలను దానినిమార్చి పెట్టబడు జొన్నకువలెనే తయారుచేయుదురు. (40 వ పుట చూడుడు) ఇతర నేలలను చోడికిని గంటెకును వలెనే తయారుచేసి విత్తవలెను. 101, 102 పుటలు చూడుడు.

కొర్రును నెదజల్లుచో భూమినిబట్టి 3-4 † సేర్ల (7-9 పౌనుల) గింజులు చల్లవలెను.

\*పొగాకు పువత సాగుచేయబడు కొర్రు ఆ సస్యమునకు చేయబడు సత్తువను దీసికొని మంచి పంట నిచ్చును.

† కొర్రుగింజులు తక్కిన తృణధాన్యము:కంటెను, కాయధాన్యముల

రాయలసీమలో వరుసలుగ జల్లునవుడు సామాన్యముగ ఆరుచాళ్ల గొర్రు నుపయోగింపబడుచుండును. మూడు చాళ్ళ గొర్రు నుపయోగించుటయు గలదు. ఆరుచాళ్ల గొర్రుతో విత్తునవుడు (జూలై నెలలో) సామాన్యముగ రెండవచాలును, అయిదవచాలును విత్తక వదలివేయబడును. ఈచాళ్లలో పిమ్మట (ఆగష్టు-సెప్టెంబరు నెలలలో) ప్రత్తిగింజలు అక్కడి గొట్టముతోగాని, నాగటి చాలునగాని విత్తబడును. ఆరు చాళ్లలోనుగూడ మొదట గొర్రుతో విత్తులను జల్లినయెడల పిమ్మట 2-3, 4-5, 6-7 వరుసలకు మధ్యగా నొక వరుస ప్రత్తిగింజలు పైని చెప్పినట్లు విత్తబడుచు. కొర్ర తరువాత జొన్నను చల్లదలచినయెడల మొదట కొర్రతో వునాన జొన్న విత్తులను కలిపి చల్లి ఈ జొన్నను కొర్రకు ముందుగనే పశువుల మేతకొరకు గోసికొందురు. పిమ్మట సెప్టెంబరు-అక్టోబరు నెలలలో ప్రతి రెండు కొర్రవరుసలకును మధ్యగాని, రెండేసి వరుసలకొక వరుసచొప్పున గాని పెద్దజొన్న విత్తులను జల్లుదురు. మూడుచాళ్ళ గొర్రు నుపయోగించిన యెడల మొదట మధ్యచాలున కొర్ర విత్తునములు వేయుట మాని పిమ్మట అక్కడి గొట్టముతో ప్రత్తిగింజలు వేయుదురు. పైని చెప్పినట్లు ప్రత్తితో గలిపి సాగుచేయునవుడు 2-3 సేర్ల (4½-7 పా.) విత్తులు చాలును.

నీరుకట్టి సాగుచేయునెడల విత్తులను వెడజల్లి మళ్ళు, బోదులు ఏర్పరచి నీరు కట్టవలెను. సుమారు వారము పది

కంటెను బరువు. కుంచమునకు 9½ పౌనులవరకు తూగును. అనగా సేరుకు సుమారు 2½ పౌనులు తూగును.

దినములకొకతడి చాలాను. ఎకరమునకు 3-4 సేర్ల విత్తులను జల్లవలెను.

నారుపోసి నాలుగైదల ఊడ్చుకొడికి వలెనే మొదట నారుపెంచి బాగుగ దున్ని బలపరచి తరువాత చేసిన సేలతో మళ్ళీ బోదులు ఏర్పరచి నీరుపెట్టి నాటవలెను.

అంతరకృషికి చోడికిగలనే జేయవలయు.

గంట, జొన్నచేరు వలెనే కొర్రచేరు కూడ పంట సమయమున పట్టలభాధ కలదు. సామాన్యసింహాది మొదలు వెన్నులనవి విరచుకొని తీసికొనిపోవును. వానిని బెదరించి పొందోలుచుండుట యననరము.

కొర్రచేలకు కీటక బాధ అంతగా గాల్పించదు. కాని రానులసీమలో నొకవిధమగు మిదుత (Deccan grass-hopper-Coleman's Sphenari) నలన నీ చేలకు బాల నష్టము గలుగుచుండును. ఈ మిదుత లేళ్ళమొక్కలను, ఎదిగిన వాని యాకలకుకూడ పూర్తిగా దివిజేయును. నల్లలగోను సంచులగోను బట్టుటయు వి. హెచ్. సి 10% (గ్రేస్సిన్) పొడినిచల్లి అరికట్టవచ్చును. విషపు తెరలను బెట్టుటయు ముఖ్య నివారణోపాయములు. ఒక విధమగు చిన్న పండు పురుగు (Leaf-weevil - *Myliocerus discolor*) కూడ అప్పుడప్పుడు పట్టి యాకులను దివివేయును. ఈ పురుగులను చేతితో నేరివేయుటయు, పల్లలగో బట్టుటయు నివారణోపాయము.

కొర్రచేలకు పట్టు నెగుళ్ళు తక్కువ. ఒక్కొక్కప్పుడొక విధమగు శిలీంధ్రము (*Schleropora graminicola*)

వట్టుటవలన గలతె వెన్నులను నే కొర్ర కొర్రలు నూడ నక్క-  
తోకవలె పుచ్చుగా నెఱుఁగెను. ఈ తెఱఱునట్లే కొర్ర  
మొక్కల యాకులనూడ నుభయముగ నాది గాలికి చీలిపోయి  
యెండి గోవును. బొడువలకు మొక్కలు నీఁపించును. సామా-  
న్యముగ నీ తెఱఱు తీవ్రరూపమును గొల్చి పక్షులును గలు-  
గించుటయు, గలతెచేలిన పక్షు శిలీఘ్రభాగము, ఇదియు  
కించి ద్వేషము గలిగి యున్నద. యిటీవల గురగానబడెను.<sup>42</sup>

కోర్ర, కైలు

వర్షకాలమున గోశకు నుట్టుటచే సామాన్యముగ  
వెన్నులను గోసిగొని కొర్రలు దగటుల నోసికొనటంబునుకూ-  
లము. కాని తరచు వన్నెము లేని సమయమునూచూచి మొదటికి  
గోసి నంటనే కాని పన వెడగనిచ్చి గాని నూర్చుటయుగలదు.

వెన్నులను బడెత్తుచో కొర్రలన్ని పశువుల చే  
దొక్కిరిచిగాని నూర్చుకలెను. కొర్రలచే వల పననుచలె  
బల్లలపై గొట్టుటనూడ గలదు. కొర్రలు విచారముగా నున్న  
పుడు తొన్న వెన్నులను వలనే పైకి గాడి బంధము దోలి  
నూర్చుటయు గలదు.

తెలుగు జిల్లాలలో మిశ్రణముగ సాగుచేయు విస్తీర్ణ-  
ముకలిపి సగటున కొర్రపంట యెకరము 12 కిరి! పానులు  
(40 కుంచములు) లెక్కనీయబడెను. ప్రత్యేకముగ సాగు  
చేయుచో మధ్యమ సారముగల నేలలను 70-80 కుంచములు  
(650-750 పానులు) ఫలించుచున్నను. మహలిభూములలోను,  
చోట భూములలోను నీను పెట్టి సాగుచేసినపుడు 100-120  
కుంచములవరకు సండుట గలదు.

# అదాయ, వ్యయములు

ఒక యెంబరు కింగ్రీచే సాగునకగు వ్యయమును, దానివలన వచ్చు చిదాయమును ఈ క్రింది పట్టికలలో అంచనా వేయబడినది

## I. ప్రత్యేకముగ వెదజల్లునపుడు గరువకొడి నేలలలో

శేషవిధానము

187

నెల	చేయవలసినపని	వలయుపాటు	వ్యయము
ప.బి.	మ.	అ.*	రు. అ. పై
	వ్యయము		
డిసెంబరు	దుక్కి - రెండు సార్లు	8	8
ఏప్రిల్	గుంటక తోలుట - రెండుసార్లు	1	1
	గొర్రెలను మేకలను పరిడ		
	కట్టుట (300)		12- 0- 0
మే	గుంటక తోలుట - ఒకసారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
జూన్	చిత్తులు - రిపొనులు		1- 8- 0
	వెదజల్లుట, గుంటక తోలుట	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
జూన్	పండ్లచట్టము తోలుట 2 సార్లు	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
జూలై	కలుపుతీరి	$\frac{1}{2}$	4
ఆగష్టు	పట్టలకాపు		6
సెప్టెంబరు	వెన్నులకొరి	1	6
	చొప్పు కొరి	2	6
	నూర్పిడి	2	1
	గింజలు, దంటు తోలుట,		
	వామివేయుట	$\frac{1}{2}$	2
	పన్నులు (సగము)		2- 0- 0
	మొత్తము	క	12 23 54- 8- 0

\* ప.బి.=పశువులదిరి; మ.=వగిశాంధ; అ.=అడుపాంధ్రు.



## రాబడి

శిల ముదముల కొర్ర ౧.౧౫ కి ముదము నొ॥	80- 0- 0
1½ లబడి చుట్టు (1600 పౌ) ౫ 1 ౬ 400 పౌనుల నొ॥	36- 0- 0
మొత్తము	96- 0- 0
నికరాడాయము	41- 8- 0

## II. గొర్రుకోరి పశుసలుగ విత్తుట (రేవడి నేలలలో బ్రత్యేకముగ)

నెల	చేయుచునీకపని	వలయుపాటు	వ్యయము
		ప. బ. మ. ఆ.	రు. ఆ. పై.
<b>వ్యయము</b>			
	పెద్దయినుప నాగటితో జాలుగు		
	సంవత్సరములకోరిసారిలో తుగ		
	దున్నుటకగువ్యయములో నాలా		
	గవ వంతు	2 2	6- 0- 0
డి సెంబరు-గుంటక రెండుసార్లుతోలి వెను			
జనవరి కటి కోతగాలు గోకివేయుట	1 1		3- 0- 0
ఫిబ్రవరి-			
జూలై గుంటకతోలుట ౫ సార్లు	1½ 1½		4- 8- 0
జూలై విత్తులు-4 పౌనులు			0- 8- 0
గొర్రుతో వేయుట	½ 1		2- 0- 0
జూలై			
ఆగష్టు ఆంతరకృషి-రెండుసార్లు	1 1		3- 0- 0
ఆగష్టు-			
సెప్టెంబరు పిట్టలకాపు		6	3- 0- 0
సెప్టెంబరు కోత, కైలు వగైరా	2½ 6 13		17- 8- 0
పన్నులు			2- 0- 0
మొత్తము	8½ 12½ 19		41- 8- 0

రాబడి

కొర్రెలు 60 చు.చములు రు 1 కి 1 కుంచెడు చొ॥	రు.అ.పై.
	60- 0- 0
దంటు 1000 పౌనులు రు 1 కి 100 పౌనుల చొ॥	10- 0- 0
మొత్తము	70- 0- 0
నికరాదాయము	23- 8- 0

III. ప్రత్తితోకలిపి సాగుచేయుచో

నెల	చేయవలసిపని	వలయుపాటు	వ్యయము
		ప.జ. మ. ఆ.	రు.అ.పై.

వ్యయము

డిసెంబరు సాగువ్యయము వైపట్టికలోవలె			
నగు దానిలో సగము	2½	2½	6-12- 0
విత్తులు-రి పౌనులు			0- 6- 0
నామినో విత్తులు	½	1	2- 0- 0
జూలై-			
ఆగష్టు ఆంకకృషి వ్యయములో సగము	½	½	1- 8- 0
ఆగష్టు పట్టుల కాపలా			6 3- 0- 0
నెవ్రెంబరు కోతి, కైలు వగైరా	1½	4	9 12- 0- 0
పన్నులు			2- 0- 0
మొత్తము	5	7½	19 27-10- 0

రాబడి

కొర్రెలు 40 చు.చములు రు 1 కి 1 కుంచెడు* చొ॥	40- 0- 0
దంటు 600 పౌనులు రు 1 కి 100 పౌనుల చొ॥	6- 0- 0
మొత్తము	46- 0- 0
నికరాదాయము-ప్రత్తివలన వచ్చునదిగాక	18- 6- 0

\*కొర్రెలు కుంచెమునకు 9½ పౌనులు తూగును.

కొర్రలను బాగుగ నెండబోసి నిల్వజేసినచో వానికి పురుగుంతగా పట్టదు. ఇతర జాతుల విత్తులను పురుగు పట్టకుండ కాసాడుటకుగూడ వానిని మూటగట్టి కొర్రల రాశిలో పెట్టి యుంచుట గలదు.

### పయోగము - ఆహార యోగ్యత

కొర్రలను గంటెలకువలెనే పైపొట్టు సోపునట్లు దంపిరి అన్నముగవండి తినవచ్చును. శేక పిండిగ విసరి, రొట్టెచేసి తినవచ్చును. గింజల సంఘట్టనము 1-4, B అనుబంధములందు తెలుపబడెను. అందులి అంకెలనుబట్టి చూచినచో మాంస కృత్తులు గంటెలలో కలెను. హెచ్చుగ గలవని తేలును. కాని కొర్రలందు చోడిలోకంటెను నారపదార్థము హెచ్చుగ నుండుటచే నీయన్నము జీర్ణమగుట కష్టము. కొర్రయన్నము మిక్కిలి వేడిచేయును.

కొర్రదంటుయొక్క సంఘట్టనము దెలుపు అంకెలు లభింపలేదు. కాని సామాన్యముగ కొర్రదంటు, జొన్న, గంటె దంట్లకంటె సన్నముగ నుండుటచే పశువులు వాని కంటె బాగుగ దినును. కొర్రచేలను పశువుల మేతకొరకు బ్రత్యేకముగ బెంచుటయు గలదు.

# నక్కొర్ర

Pigeon grass . Setaria Pallidifusea.

అరవము-కొరళి; హిందీ-బుచ్చా; కన్నడము-కొరళె.  
(తెలుగున దీనికి వరిగ లేక నక్కర యనికూడ పేర్లు గలవు)

చరిత్ర, వ్యాపకము

ఇది కొర్రగణములో చేరిన మరియొక వృక్షాభావ్య జాతి. చాలచోట్ల నిది వన్యస్థితి-చుందు గాననచ్చుటచే ఇండియా యే దీని కాదిమస్థానమయి యుండవచ్చునని యూహింపబడుచున్నది. అరుదుగ గొన్నిచోట్ల నిది ప్రత్యేకముగ సాగుచేయబడుటయు గలదు. విశోభవట్టువుజిల్లాలోని సర్వత ప్రాంతములందును, నీలగిరులందును దీనిసాగు కొంతగలదు. బొంబాయి రాజధానిలోకూడ దీనిసాగు స్వల్పముగ గలదు. మధ్యరాష్ట్రములందు వన్యస్థితిలో బెరుగు మొక్కల గింజలను తీసి తిందురు. కొన్నిచోట్ల నిది సశువులమేతకు ప్రత్యేకముగ సాగుచేయబడుచున్నది.<sup>42</sup>

మొక్కయొక్క లక్షణములు

నక్కొర్ర మొక్క సుమారు 1½-3 అడుగుల యెత్తెదిగి కొంచె మించు మించు నీరసముగనున్న కొర్రమొక్కవలె నుండును. కాని సత్తువగలచోట్ల హెచ్చుగ దుబ్బుచేయును. ఒక్కొక్కర్రలో 5-9 ఖండములవరకుండును. వీనిలో గరిష్టపు పొడవుగలది 3-5 అంగుళములుండును. లావు  $\frac{1}{10}$ - $\frac{1}{8}$  అంగుళమువరకుండును. బాగుగ నెదిగిన యాకులందు తొడిమ 2½-4

16 వ పటము



నక్కకొర్రపెన్ను  
(పూర్ణాకృతి)

అంగుళముల పొడవు వరకును, రేకుపొడవు 8-2 అంగుళముల వరకును, వెడల్పు  $\frac{1}{2}$  అంగుళములవరకును గుండును

వెన్ను సామాన్యముగ సన్నగిలిస కొర్ర వెన్నునుబోలి 2-4 అంగుళముల పొడవుండును. బాగుగ నెదిగినది 6 అంగుళములవరకుండుటగలదు. అల్పకణిశముల నిర్మాణము కొర్రలోవలెనేయుండును. శివ తుషపు పంగలోనే పూవును, ఋసమును నుండును. గింజ కొర్రగింజనుబోలియేయుండును. కాని అంత కంటె చిన్నది. వెన్నునందలి క్రిందిభాగమున కొంతమేర అల్పకణిశముల గుత్తులందు పూవులుగాని, గింజలుగాని యేర్పడక రోమములు మాత్రముండును.

నక్కకొర్ర పెరుగు పరిస్థితులు,

సేవ్యవిధానము

నక్కకొర్ర సముద్రమట్టము మొదలు నుమారు 7000 అడుగులవరకు ఉన్నతముగల ప్రదేశములందు పెరుగగలదు. రాళ్ళతోగూడి వదును చాల తక్కువగ నిలచు నేలలందు సైతము పెరుగును.

విశాఖపట్నంజిల్లాలో కొండలప్రాంతములందు కొన్ని చోట్ల నక్కకొర్రను అరికతోకలిపి తొలకరిలోవిత్తి సాగుచే

యుదురు. గింజలు చిన్నవిగ నుండుటచే నీ విత్తులను 1½ సేన్ల విత్తులకంటె హెచ్చుగజల్లరు. మరియేకృషియు చేయ నవసరము లేకయే రెండు, రెండున్నర నెలలలోనే యీసస్యము ఫలించును. ఈ వెన్నులను సకాలమున గోయనిచో అల్ప కణిశములు రాలిపోవును. ఈ వెన్నులను ముందుగ గోసికొని అరికను పెరుగనిత్తురు. అరిక ను మూడు మరి రెండున్నర నెలలకు గోతకు వచ్చును. సామాన్యముగ నీమిశ్రితమున నక్క కొర్రెలు 25-30 కుంచములకంటె హెచ్చుగ గావు. ప్రత్యేకముగ జల్లుచో 40-50 కుంచములగింజలు కావచ్చును.

గింజల యాహారయోగ్యతను గురించిన పరిశోధన జరిగినట్లు కావగాదు, దంటుగాని, ప్రత్యేకముగ మేతకొరకు పెంచబడిన కొప్పగాని సన్నముగ నుండుటచే వ శువులు బాగుగ దినును. కాని యీ సస్యము సాగుచేయు ప్రదేశములలో పశువుల మేతకు లోటు లేకపోవుటచే దంటుకు గోసి యుపయోగించుటరుగు.

సామాన్యముగ బీళ్ళలోగాననగు చికిలింత (*Setaria verticillata*) యను, అర్రెంగిగడ్డి (*Setaria intermedia*) యనుగూడ కొర్రెగణములోని జాతులే.

# ఆ రి క

Kodo millet - Paspalum scrobiculatum.

ఆరికము-వరగు; కన్నడము-చాగకుహస్లు; హిందీ-కోడో;

ఓడ్రీము-ఖొడ్డి; సంస్కృతము-కోద్రీవః.

చరిత్ర, వ్యాపకము

ఇండియాలోని కొన్ని యుష్ణభాగములం దారిక వన్యస్థితి యందు గాసవచ్చుటచే నీ దేశ మే దీనికాదిమస్థానమయి యుండవచ్చునని యూహింపబడు చున్నది. కాని యిది యజుర్వేదమందలి సప్త గ్రామ్యములలోగాని, సప్తారణ్యకములలోగాని, బృహదారణ్యకోపనిషత్తునందలి దశధాన్యములలోగాని పేర్కొనబడక పోవుటచే నీధాన్యపు ఉపయోగము అందు పేర్కొనబడిన వానికంటె వెనుకగా నార్యులచే గుర్తింపబడె ననిచెప్పవచ్చును. రామాయణమునందీధాన్యము (కోద్రవః) కలియుగ వ్యవసాయ లక్షణచిహ్నముగ జెప్పబడెను.

ఈసస్యమితర రాజధానులందుగాని, ఇతర దేశమాలందు గాని యెచట నెంతెంత విస్తీర్ణమునై సాగుచేయబడుచున్నదో తెలుపు అంకెలు లభించుటలేదు. ఇండియా యందలి రాష్ట్రములలో చెన్నపురి రాజధానియందును, బొంబాయి రాజధానియందును మాత్రము ఈపైరు కొన్నిచోట్ల విరివిగ సాగు చేయబడుచున్నది.

చెన్నరాజధానియం దీపైను సాగుచేయబడు సామాన్య విస్తీర్ణము (Normal area) 10,23,780 యెకరములని యంచనా వేయబడ్డెను. కాని యిందు తెలుగుజిల్లాలలోని విస్తీర్ణము 2,88,510 యెకరములు మాత్రమే. ఈ సాగు నెల్లూరు, కర్నూలు, అనంతపురము, కడప, చిత్తూరు జిల్లాలలో మాత్రము కొంత విరివిగగలదు. ఆయా జిల్లాలయందలి విస్తీర్ణ మింకీంద తెలుపబడెను.

జిల్లా	ఎకరములు
నెల్లూరు	96,600
కర్నూలు	85,300
అనంతపురం	40,800
కడప	28,700
చిత్తూరు	18,600
ఇతర తెలుగుజిల్లాలు	19,010
మొత్తము	<u>2,88,510</u>

ఆరిక మొక్క లక్షణములు, రకభేదములు

ఆరిక మొక్క సామాన్యముగ  $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  అడుగుల యెత్తైదుగు దుబ్బు. పిల్కలు - ముఖ్యముగ కొన్నిరకములలో - ప్రక్కకు వ్రాలియుండును. మొక్క చిన్నదిగ నున్నపుడు క్రిందిపిల్కలు నేలపై సాగిలబడుటయు గలదు.

వేళ్ళు కొర్రలోకంటెను సన్నముగ నుండును. భూమి యందలి పదునునుబట్టి కొంత లోతుగగాని, ప్రక్కలకుగాని వ్యాపించుచుండును. పై పెరకువనుబట్టి చూచిన వేళ్ళవ్యాపకము కొర్ర, చోడి మొదలగు జాతులలోకంటె హెచ్చనిదే చెప్పవచ్చును.



ఆరిక కాండము కొర్రకాండముకంటెను సన్నము. ఒక్కొక్కదుబ్బున సామాన్యముగ 3-8 కర్రలవరకు నుండును. అనుకూలపరిస్థితులలో బెరిగిన కొన్నిదుబ్బులలో 15-20 వరకుండుట గలదు. ఒక్కొక్కకర్రయిండు సామాన్యముగ 5-6 ఖండములుండును. నాలుగేకాని, 7, 8 వరకుగాని యుండుటయు గలదు. ఖండములపొడవు క్రిందివానిలోకంటె పైవానిలో క్రమముగ బెరుగును. గరిష్టపు పొడవుగలది సామాన్యముగ 4-6 అంగుళములవరకు నెదుగును. లావు  $\frac{1}{2}$  అంగుళము మొదలు  $\frac{3}{4}$  అంగుళములవరకుండును. ఆకులందలి నోడిమల గరిష్టపుపొడవు కొర్ర, చోడి మొదలగువానిలోకంటెను హెచ్చు. సామాన్యముగ 6-9 అంగుళములవరకుండును. రేకు గరిష్టపు పొడవు సామాన్యముగ 12-18 అంగుళములుండును. వెడల్పు  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  వరకుండును. ఇంతకు తక్కువ వెడల్పుండు రకములుగూడ గలవు. వెడల్పు రకములలో రేకులు మధ్యకు చోడిలోపల వంగి వ్రాలియుండును. సన్నని రేకులుగల రకములలో నవి యిట్లువంగి వ్రేలాడక సామాన్యముగ చివర వరకు నిక్కబొడుచుకొనియేయుండును.

ఆరిక వెన్నులు సామాన్యముగ కాండమునందలి తుది రెండు కణుపులందును బయలుదేరుచుండును. మొదటి వెన్ను కోటాకు బయలుదేరు కణుపునందుగాక దాని క్రింది కణుపున బుట్టును. వెన్నుల తొడిమలు తక్కిన తృణజాతులలో వలె నిడివిగ నుండక పోవుటచేతను ఆకుల నోడిమలు పొడవుగ నెదుగుటచేతను, వెన్నులు తరచు వానినుండి పూర్తిగ పైకి రాక కొంతవరకు లోపలనే యుండిపోవుటయు, తొడిమెను

17 వ పటము



ఆరికవెన్ను  
( $\frac{1}{2}$  నైజా)

జీల్చుకొని పైకి వచ్చుటయు గలదు. క్రిందియాకుల తొడిమలు పై యాకుల తొడిమలపై కెదిగియుండుటచే వెన్ను ఒక్కొక్కప్పుడు రెండేసి తొడిమలచే గప్పబడియుండుటగలదు. వెన్ను సామాన్యముగ మూడేసి చిళ్ళలు లేక రెల్లలు గలిగి యుండును. ఒకదానికి తొడిమ యుండదు. తక్కిన రెంటి తొడిమలలోను ఒకదాని తొడిమ రెండవదాని తొడిమకంటె పొడవుగ నెదుగును. సామాన్యముగ నీ రెల్లలపొడవు 1-3 అంగుళములుండును. అరుదుగ 5 అంగుళములకు మించి యుండుటయుగలదు.<sup>30</sup> బలముగ నెదుగు కొన్ని రెల్లలు మరల పైవిధముగనే మూడేసి పిల్లరెల్లలుగ జీలుటయు మరల సందోకటి రెండు అట్లే మూడుగ జీలుటయు గలదు. కాని

సామాన్యముగ పిల్ల రెల్లలు పెరుగక నోవుటచే ఒక్కొక్క వెన్నున మొత్తముమీద 2-5 రెల్లలుగాని, పిల్లరెల్లలుగాని కాననగును. ఇట్లు మరల పిల్లరెల్లలుగ జీలిన రెల్లలలో అల్పకణిశములు తక్కువగ నుండును. ఇట్లు చీలని వానిలో హెచ్చుగ నుండును. పొడవుగ నెదిగిన రెల్లలలో నూరు అల్పకణిశములవర కుండుటగలదు. ఒక్కొక్క రెల్ల లేక పిల్లరెల్లలో అల్పకణిశము లొక బల్లపరువుగనుండు కాడ కొక

వృక్క రెండువరుసలుగ నమరియుండును. అల్పకణిశముల తొడిమలు మిగుల కురుచగ నుండును. కొన్ని రకములలో నీతొడిమలు కొంచెము పొడవెరిగి జీలుటయు రెండేసి, మూడేసి, లేక నాలుగేసి అల్పకణిశము లొక్కొక్కగుత్తిగ బుట్టుటయుకూడ గలదు.<sup>45</sup>

అల్పకణిశమునందు మొదటితుపము లోపించును. రెండవది చిన్నది. మూడు నాలుగు తుపములు పెద్దవి. నాలుగవ తుపపు పంగళో పూవును, బుసమును నుండును. పూవునందు ఉన్నద్రీకములురెండును, అండాశయములు ఒకటియు, కీలములురెండును, కింజల్కములుమూడును ఉండును, ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కొక్క అల్పకణిశమున రెండేసి పూవులు బయలుదేరుట గలదు. రెండవతుపమున కెగువను, నాలుగవ తుపమున కెదురుగనుండు బుసమునకును మధ్య మతియొక తుపమును, బుసమును పుట్టి పానిమధ్య నీ రెండవ పూవేర్పడును.

సామాన్యముగ ఆరిక పూవులు విడువకముందే గర్భవతు లగునని కనిపెట్టబడెను. నూటికి 10-15 పూవులలో మాత్రము గర్భోత్పాదనము విడచినవెనుక జరుగును. విడచు పూవులు తెల్లవారుజామున 2½-3 గంటలు మొదలు సూర్యోదయము వరకు విడచుచుండును. విడచినపుడు మరలనుమారు 1½ గంటలలోనే మూసికొనిపోవును. గింజ కొంచెము కోలగను, గుండ్రీదేరియు యుండును. దీనిని నాలుగవ తుపమును, బుసమును గట్టిగ నంటిపట్టుకొనియుండును, ఇవి లేత గోధుమ వర్ణముగలిగి యుండును. లోని గింజయు నదేరంగు గలిగి

యుండును. గింజలు కొర్రలకంటెను, గంటెలకంటెను పెద్దవి. కాని గంటెలవలెనే తేలిక. తులమునకు సుమారు 2000 గింజలు తూగును. ఒక్కొక్క యల్పకణిశమున రెండేసి గింజలుండు రకముల గింజలు చిన్నవిగనుండును. <sup>45</sup>

ఆరిక మొక్కలలో నవి యెదిగినవోలదిని వివిధభాగము లందు ఊదారంగేర్పడును. రంగుండుభాగములలో ముఖ్యములు ఆకుపంగ, ఆకు తొడిమ, సంధి, రేకు (ముఖ్యముగ చివరభాగము, అంచులు), వెన్నులకాడలు, తుషముల చివరలు, కీలములు. సామాన్యముగ దుబ్బులు వెన్నువేయుట కారంభించినది మొదలు గింజ పాలుపోసికొనువరకు నీరంగు స్ఫుటముగ నుండుటచే చేనంతయు ఊదారంగుతోగూడిన పసరువర్ణముతో గనబడును. కొన్నిరకములలో నీ యూదారంగు పలుచగ నుండుటచే చేను ఆకుపసరుగనున్నట్లే యగువడును. కాని బాగుగ పరిశీలించిన కొన్నిభాగములందీరంగు గాననగును.

ఆరికలో పెద్ద ఆరిక యనియు, చిన్న ఆరికయనియు రెండు ముఖ్యరకములు సూత్రమే కర్షకులచే గుర్తింపబడుచున్నవి. పెద్దఆరిక సుమారు ఆరుమాసముల పంట. ఇది తమిళనాడునను, నెల్లూరుజిల్లాలోను విస్తారముగ సాగుచేయబడుచున్నరకము. తెలుగుజిల్లాలలోచాలచోట్ల సాగునందున్న ఆరిక సుమారు నాలుగు నెలలలో ఫలించు చిన్నఆరికయే. ఈరెండునుగాక చెంగప్పట్టుజిల్లాలో నీరుపెట్టి సాగుచేయు రక మొకటికూడ గలదు.

మొక్కలందలి ఊవారంగునందును, వెన్నులందును పైని వివరింపబడిన భేదములుగల దుబ్బులు పైరెండరకములందును గాననగును. కోయంబత్తూరునందలి చిరుధాన్య స్థానమందు జరుగుచున్న పరిశోధనల ఫలితముగ నీ తృణధాన్య జాతిలో నింకను బ్రశస్తముగు వంగడము లెంచి రైతుల కందజేయబడియుండలేదు.

నీటియారిక యనునది పరిమళిలోను, నీరునిలచు సేతర చోట్లను పెరుగు నొకజాతి యారిక.

మరియొక జాతి (P. Dilatatum) యారిక నీలగిరులందును, కొన్ని యితర శీతలప్రదేశములందును పశువుల మేతకొరకు పెంచబడుచున్నది.

ఆరికకు దగిన పరిస్థితులు, సేవ్యవిధానము

ఆరిక కుష్ఠమండల మనుకూలమగు ప్రదేశము. కాని 7000 అడుగులవరకు ఉన్నతముగల ప్రదేశములందలి చలి కొర్చి యట్టిచోట్లగూడ నిది కొంతవరకు పైరగుచున్నది. మరియు నీరసము తక్కిన తృణధాన్యముల కంతగా పనికిరానంత తక్కువగా పదునునిలుచు రాతికొడి యెర్రినేలలలోను, నీరసముగనుండు యిసుక నేలలలోనుగూడ కొంతవరకు ఫలించు మోటయినజాతి.

ఆరికను విత్తుటకు తొలకడియే యుక్తకాలము. సామాన్యముగ నిది ఉత్తరసర్కారులలో జూన్ నెలలోను, నెల్లూరు జిల్లాలోను రాయలసీమయందును జూలై-ఆగష్టు నెలలలోను విత్తబడుచుండును. మిగుల హీనమగు నేలలలో సామాన్యముగ

స్వముగ ఆరిక నొక సంవత్సరము సాగుచేసి ఒక సంవత్సరము నేలను కొర్చుంచు చుందురు. సామాన్యపు నేలలలో ఆరికను నూపు, గంటె, చోడి, ఉలవ మొదలగు వానితో మార్చి పెట్టవచ్చును.

ఆరికతో కలిపి సాగుచేయబడు ముఖ్య సస్యము కంది. 'అయితే ఆరిక కాకుంటే కంది' అను సామెత అందరికి తెలిసి వచ్చే. కొన్ని చోట్ల దీనితో నూపుగలిపి సాగుచేయుట గలదు. ఒక్కొక్కప్పుడు గోగు, ఆముదములు, మినుము, పెసర మొదలగు వానినిగూడ కలిపి విత్తుటయు గలదు. విశాఖపట్నం జిల్లాలోకొన్ని చోట్ల దీనితో నకెరలనుగలిపి సాగుచేయుదురు. 172, 173 వ పుటలు చూడుడు.

ఆరిక సామాన్యముగ మెట్టసస్యముగనే సాగు చేయబడుచున్నది. నేలను రెండుమూడు సార్లు మాత్రమే దున్ని విత్తులను జల్లుదురు. వెదజల్లు నెడల పైని నాగటితో తేలికగ రెండుసార్లుదున్ని కంపతొడుగు లేక పంటతోలుదురు. గొర్రుతో విత్తులను జల్లునెడల పైని గుంటక తోలవలెను. కందితోకలిపి సాగుచేయునెడల 5 ఆరిక వరుసల కొక కంది వరుస వేయవచ్చును. ఎకరమునకు 12-20 పౌనుల (2-3 కుంచముల) విత్తనములు పట్టును. ఆరికకు యెరువు వేయుటరుదు.

గొర్రుతో వరుసలుగ జల్లినపుడు ఒకసారి అంతర కృషి చేయవచ్చును. వెదజల్లునపుడు ఒకసారి గొప్ప త్రవ్వకము. లేక పండ్లమార్పిని గాని, త్రికోణపు పండ్లచట్టమును

గాని మొక్కలు మొలచిన పిమ్మట 15 దినములలో తోలవలెను.

ఆరిక కరిష్టములంతగా లేవు. జొన్న, గంట చేలకు వలె పిట్టల కాపవసరములేదు. ఒక్కొక్కప్పుడు జొన్న నెన్నులకు వలనే యా వెన్నులకును కాటుక తెగులు పట్టును. ఇదియొక విధమగు శిలీంధ్రము (*Sorosporum paspali*) వలనగలుగుచున్నదని కనిపెట్టబడెను.<sup>4</sup> ఈ శిలీంధ్ర బీజములు అవి యంటుకొనిన విత్తులమూలముననే వ్యాపించును గాన, తెగులులేని చేల విత్తులనే చల్లవలెను. లేక విత్తులను నూటికి 1.5 పాలు మైలతుత్తముకలిపిన నీటిలో అరగంటసేపు నానబెట్టి మరల నెండించి విత్తవలెను. ఇట్లు సంస్కరింపబడిన గింజల చైతన్యము సుమారు రెండు నెలలవరకు యెడదు. ఏప్రిల్-జూన్ నెలలలో తగినంత వర్షము గురియుచో తెగులు తగిలిన భూమిలో పెట్టబడు మరుచటి పంటకు తెగులంతగా పట్టదందురు.

ఆరిక చేనిని కోసి పస యారినవెనుక కుప్పగా పెట్టి తీరిక యయినపుడు సూర్చవచ్చును. లేక 1-2 రోజులు కొంచెము ముక్కనిచ్చి పశువులచే వెంటనే త్రొక్కించవచ్చును.

ఆదాయ, వ్యయములు

ఆరిక నొక సంవత్సరమున సాగుచేయుటకగు వ్యయమున, అందువలన రాదగు రాబడియు నీ క్రింద అంచనా వేయబడెను,

# I. ప్రత్యేకముగ నెదజల్లుచో

నెల	చేయవలసిన పని	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప.జ.	మ.	ఆ.*	రు. అ. వై
వ్యయము					
జూన్	దుక్కి-రెండుసార్లు	3	8		9- 0- 0
	గుంటక తోలుట	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
జూన్	విత్తులు-20 పౌనులు				1- 0- 0
	చల్లుట, కలియదన్నుట	3	3		9- 0- 0
జూలై	పండ్లమౌను తోలుట	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
ఆక్టోబరు	కోత, కట్టుట, మోత		2	8	6- 0- 0
	మార్పిడి, ఎగురబోత	$1\frac{1}{2}$	2	1	5- 8- 0
	గడ్డి, గింజలుతోలుట	$\frac{1}{2}$	1		2- 0- 0
	పన్నులు				2- 0- 0
మొత్తము		9	12	9	37- 8- 0

## **రాబడి**

గింజలు 120 కుంచములు* రు 1 కి 3 కుంచముల చొ॥	40- 0- 0
గడ్డి 1 బండి (1200 పౌనులు)	2- 0- 0
<b>మొత్తము</b>	42- 0- 0
<b>నికరాదాయము</b>	4- 8- 0

కంది కలుపుచో అదనపు వ్యయము రు 2-12-0 లును, అదనపు రాబడి రు 6-0-0 లును ఉండుటచే నికరాదాయము రు 3-4-0 లు ఉండును.

\* ప.జ.=పశువులజీతము; మ=మగవాండ్లు; ఆ=ఆడవాండ్లు.

† అరికలు కుంచము 1 కి మూడు  $7\frac{1}{2}$  పౌనులు తూగును.



## II గొర్రుగో పరుసలుగ వేయుచో (కందితోకలిపి)

నెల	చేయవలసినపని	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప. జ.	మ.	ఆ.	రు. అ. పై
	<b>వ్యయము</b>				
జూన్	దుక్కి - రెండుసార్లు	3	3		9- 0- 0
	గుంటకతోలుట - సికసారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
జూలై	గొర్రుతో విత్తుట	$\frac{1}{2}$	1		2- 0- 0
	గుంటకతోలుట	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
	గింజలు - అరికలు 2 కుంచములు (14 పౌ)				0-10- 6
	1 $\frac{1}{2}$ సేరు కందులు (3 పౌనులు)				0- 6- 0
ఆగష్టు	అంతరకృషి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
నవంబరు	శోత, కట్టుట, మోత		2	8	6- 0- 0
డిసెంబరు	నూర్పిడి, ఎగురబోత	1 $\frac{1}{2}$	2	1	5- 8- 0
	కందినరకుట, కైలుచేయుటవగైరా	$\frac{1}{2}$	7	4 $\frac{1}{2}$	9-12- 0
	గింజలువగైరా కళ్లమునుండి				
	తోలుట	$\frac{1}{2}$	1		2- 0- 0
	<b>పన్నులు</b>				2- 0- 0
	<b>మొత్తము</b>	<b>7<math>\frac{1}{2}</math></b>	<b>17<math>\frac{1}{2}</math></b>	<b>13<math>\frac{1}{2}</math></b>	<b>41-12- 6</b>

### రాబడి

ఆరికలు 100 కుంచములు రు 1కి 3 కుంచములచొప్పున	33- 5- 6
కందులు 20 కుంలములు రు 1కి కుంచెడుచొప్పున	20- 0- 0
ఆరికగడ్డి 900 పౌనులు రు 1కి 800 పౌనులచొప్పున	1- 8- 0
కందికంప 600 పౌనులు రు 1కి 150 పౌనులచొప్పున	4- 0- 0
<b>మొత్తము</b>	<b>58-18- 6</b>
<b>నికరాదాయము</b>	<b>17- 1- 0</b>

ఆరికను ప్రత్యేకముగ బెట్టుచో 18 పౌనుల విత్తలను జల్లదగును. 120 ఘంచముల ఆరికలు కావచ్చును. అందు వలన రాబడి రు 12-0-0 లు, వ్యయము రు 10-8-0 లు అగును. నికరాదాయము రు 1-8-0 లు.

ఆరికల లేక ఆళ్ల సంఘట్టనము I-A, B అనుబంధము లందు తెలుపబడెను. ఇందు మాంసకృత్తులు తక్కువయు, నారపదార్థము హెచ్చును అగుటచే తక్కిన తృణధాన్యములతో బోల్చిన సారహీనమును, కష్టజీర్ణమునునగు దినుసుగ పరిగణింపబడుచున్నది.

ఆరికగింజలలో నొక్కొక్కప్పు డొకవిధమగు మత్తు ద్రవ్య మేర్పడుటచే వాని నాహారముగ గొనువారికి తల నాజును, శోకులు వెళ్ళుటయు గలుగవచ్చును. ఇట్టివిషద్రవ్య మేర్పడిన గింజలు నీటిలో తేలును. వేచిన పేలాలుగాక మాడి పోవును. ఇట్టిగింజలను పేడనీటిలో నానబెట్టిన విషము కొంత వరకు నశించునందురు, బహుశః ఆరిక నివకనేలలందు పైరు చేసినపుడును, పైరుగుచుండగా దీర్ఘకాలము మబ్బుగరుండు పరిస్థితు లేర్పడినపుడును గింజలిట్లు చెడునని యందురు.

ఆరికలను ఒకవిధమగు కర్మతిరుగటితో విసరి వైపొట్టు పోవునట్లుజేసి యుపయోగింతురు. ఈ తిరుగలి ఒంటిపలుక గలిగి యుండును. రెండవ పలుకకుబదులు నేలయే యుపయోగింపబడును. పొట్టు నూటికి సుమారు 40 వంతులుండును. ఆరికపిండి తరుచు తృణధాన్యముల పిండితో కల్పించేయుట కుపయోగింపబడు చుండును.

ఆరిక గడ్డి సంఘట్టనము I-C అనుబంధమున తెలుపబడెను. అందలి యంతెలనుబట్టిచూచిన వరిగడ్డికి గాని, చోడి, గంటె మొదలగువాని దంటునకు గాని యిది అంతగా తీసిపోవునట్లు కనబడకపోయినను, అనుభవమున నిది వానికంటె నిస్సారమును, గరునును, అగుటచే సామన్యముగ పశువులకువయోగింపబడుటలేదు. మరియు గింజలందు వలెనే గడ్డిలోను పైని పేర్కొనబడిన కొన్ని ప్రతికుల పరిస్థితులలో నొక విధముగా విషద్రవ్య మేర్పడుటచే నట్టి గడ్డిని తిను పశువుకు తిక్కగలుగుటయు గలదు. కావున నీగడ్డిని తరచు చొటి నేలలను బాగుపరచుటకెరువుగా నుపయోగింపబడుచుండును. మామిడి పండ్లు మొదలగు వానిని కావు వేయుటకును, పొగాకు మండలను కప్పియుంచుటకును యిది కొన్ని చోట్ల వాడబడుచున్నది.

## చామ \*

Little millet - *Panicum miliare*.

అరవము-కామై; మళయాళము-కాచు; కన్నడము-చివి, కామైహుల్లు;  
ఓడ్రీము-సునీవా, సుహా; హిందీ-కావన్; సంస్కృతము-శ్యామాకః.

### చరిత్ర, వ్యాపకము

చామ శాదిమస్థానమేది యయినదియు నిర్ధారణగ  
దెలియదు. కొందరిది యిండియాకు చాల పురాతనకాలము  
నందే ఈజిప్టు దేశమునుండి వచ్చియుండుననియెంచు  
చున్నారు. ఆదిమస్థానమెద్దియైనను వన్యస్థితియందు బెరుగు  
చామలిండియాలో చాల ప్రాచీన కాలముననే యాహారముగ  
నుపయోగింపబడుచుండెననుటకు సందేహములేదు. కృష్ణయజు  
ర్వేద సంహితలో (4-7-4)నీ చామల (శ్యామాకః) ప్రశంస  
గలదు. ఆకాలపు సప్తారణ్యములలో నిది యొకటికగనుండెను.<sup>†</sup>  
బృహదారణ్యకోపనిషత్తునందు పేర్కొనబడిన దశధాన్యము  
లలో నిది జేరకపోవుటచే నిది పిమ్మట కొంతకాలమునకుగాని,  
ఆర్యావర్తమున సాగునకు దేబడి యుండలేదని యూహింప  
దగి యున్నది. కాని తొలుత నీసస్యము సాగునకు దేబడిన  
దిండియాయేయని యెంచబడుచున్నది.<sup>47</sup>

---

\* తూర్పు కొదావరి జిల్లాలో చామ యను పేరుతో వ్యవహరింప  
బడు చిరుధాన్యము నిజముగ ఊదయే. కొన్నిచోట్ల నిజమగు చామకు గంగ  
చామ యని కూడ పేరుగలదు.

† ఇప్పటికిని యొక జాతి చామ (*Panicum Psilopodium*)  
ఇండియాలోను, బర్మాలోను, మలయాద్వీపములోను వన్యస్థితిలో గలదు.

చామ యిప్పుడు ఇండియాలోను, సింహళములోను మాత్రమే కొంత విరివిగ సాగుచేయబడుచున్నది. మరికొన్ని దేశములలో స్వల్పముగ సాగునందున్నది. ఇండియాలో ఆయా రాష్ట్రములందలి విస్తీర్ణము ప్రత్యేకముగ తెలియదు. చెన్నరాజధానియందీ సాగుగల సామాన్యవిస్తీర్ణము (Normal area) 5,50,840, ఎకరములు. ఇందు 1,49,020 ఎకరములు మాత్రమే తెలుగు జిల్లాలలోనివి. అనంతపురం జిల్లాయును, విశాఖపట్నం జిల్లాయును ఈ సస్యమును విస్తారముగ సాగుచేయబడు జిల్లాలు. క్రింది పట్టికను చూడుడు.<sup>5</sup>

జిల్లా	సామాన్య విస్తీర్ణము
అనంతపురం	85,000
విశాఖపట్నం	20,000
చిత్తూరు	14,800
బళ్ళారి	12,200
ఇతర తెలుగు జిల్లాలు	37,020
మొత్తము	<u>169,020</u>

దక్షిణాదిని యిది సేలం, కోయంబత్తూరు, తిర్నల్వేలి, మధుర జిల్లాలలో విరివిగ సాగు చేయబడుచున్నది.

రాజధాని మొత్తమునను, తెలుగు జిల్లాలలోను కూడ నీసస్యపు విస్తీర్ణమిటీవల చాల తగ్గిపోయెను. 1926-27 సంవత్సరమున నీసస్యము చెన్నపురి రాజధాని మొత్తముపై 8,40,789 ఎకరములపై నుండెను. తెలుగు జిల్లాలలో ప్రత్యేకముగ 3,37,7879 ఎకరములపై నుండెను. విశాఖపట్నంలోని చామ సాగు అ సంవత్సరము 1,47,561 ఎకరములుండెను. ఈ జిల్లాలో నిపుడివిస్తీర్ణము 20 వేలకు తగ్గిపోవుటకు యిటీవల

ఒరిస్సాలో జేరిపోయిన ఆజిల్లాలోని ఏజన్సీభాగపు విస్తీర్ణము మినహాయించబడుటకూడ కారణము. చిత్తూరు జిల్లాలోని విస్తీర్ణపు తగ్గుదల నుమారు 22 వేల యెకరములు మాత్రమే.

చామ మొక్క సామాన్యలక్షణములు, రకభేదములు

చామ మొక్క నీరసించిన కొర్ర మొక్కనుబోలి 2, 3 అడుగులయెత్తున దుబ్బుగా నెడుగును. విశాఖపట్నంజిల్లాలోని ఏజన్సీప్రాంతములందలి రకములు కొన్ని 5 అడుగులవరకెడుగుట గలదు.

చామవేళ్ళు కొర్రవేళ్ళకంటెను సన్నముగ నుండును. దుబ్బుయొక్క పెరకువకు తగిన వ్యాపకము గలిగియుండును. సామాన్యముగ 4-6 అంగుళముల దూరమున రకు వ్యాపించును.


ఒక్కొక్క దుబ్బున సామాన్యముగ 3-6 పిల్కలవరకుండును. అరుదుగ 25 వరకుండుట గలదు. పిల్కలు పై కణుపులనుండిగూడ బయలుదేరుటగలదు. కాండము కొర్రలో కంటెను సన్నముగ నుండును.

ఒక్కొక్క కర్రలో సామాన్యముగ 4-6 ఖండములు మాత్రము నిడివిగ నెడుగును, కర్రలలో గరిష్టపు నిడవిగల ఖండములపొడవు సామాన్యముగ 3-6 అంగుళములుండును.

అకుకూడ చిన్నదిగనే యుండును. బాగుగ నెదిగిన యాకు తొడిమ 2-4 అంగుళముల పొడవుండును. రేకు12-20 అంగుళములపొడవును,  $\frac{1}{2}$ -1 అంగుళము వెడల్పును ఉండును. క్రింద పొచ్చు వెడల్పుగనుండి పైని క్రిమముగ సన్నగిలును.

చామవెన్ను అనేక రెల్లలును గలిగి వరి వెన్నువలె రింజగా నుండును. ముదిరిన కొలదిని వరి వెన్నువలెనే యండముగ వ్రాలును. సామాన్యముగ 6-12 అంగుళముల పొడవు వరకుండును. అరుదుగ 18 అంగుళముల పొడవు వరకుండుట గలదు. అల్పకణిశములు మిగుల చిన్నవి.  $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$  అంగుళము పొడవుండును. పిల్ల రెల్లలందివి జంటలుగా నుండును. కాని వాని కొనలందివి తరుచు ఒక్కొక్కటియే యుండును. క్రింది తుపము కురుచుగ నుండును. 2 వ, 3వ తుపములు నిడివిగను

### 18 వ పటము



వరిగవెన్ను ( $\frac{1}{5}$  వైజు)

కొంచెమించుమించు సమముగనునుండును. మూడవతుపము సంగలోనుండు పూవు స్త్రీపురుషాంగములు లేనట్టిగాని, కింజల్కములు మాత్రమే గలిగి యుండునట్టి గాని గొడ్డుపూవు.

నాలుగవతులము సంపూర్ణమగుపూవును ఆవరించియుండును. ఈ పూవు తక్కిన జాతులలోవలెనే 2 ఉన్నద్రోణములును, 3 కింజల్కములును, 1 అండాశయమును, 2 కీలములును గలిగియుండును. కోయంబత్తూరు పరిస్థితులలో పూవులు ఉదయము 9 మొదలు 11½ గంటలవరకు విడచుచుండును. మఱియు 12 గంటల వరకును విడచు చుండును. పూవుల విడుపు నెన్నువేసిన రెండవ మూడవరోజున సాగ్రంభించి 15 రోజులవరకు జరుగుచుండును. 6-7వ దినమునందు హెచ్చుగ నుండును.<sup>47</sup>

పూవులు సామాన్యముగ ఆత్మ సంపర్కమువలననే గర్భవతులగును. కాని అరుదుగ (పదివేలలో నొకటికి మించకుండ) ప్రకృతి సిద్ధమగు పరసంపర్కమువలన గర్భవతులగుట గలదు. ప్రత్యేక కృషివలన నూటికి 35 వరకు పరసంపర్కమునకు లోనగునట్లు చేయవీలగునని కనుగొనబడెను.

చామగింజ తువ బుసములచే గట్టిగ నావలిపబడి కొంచెము మొనదేరి కోలగనుండును. కొర్రగింజల కంటెను యిండుక చిన్నది. తులమునకు సుమారు 4400 గింజలు తూగును.

చామలలో నవి ఫలించు కాలమును బట్టియు గింజల రంగును బట్టియు నెన్నుల వైఖరిని బట్టియు కొన్ని రకభేదములు గుర్తింపబడుచున్నవి. సామాన్యముగ చామ లనబడు నవి-వీనిని పిన్నచామలనవచ్చును- 2½ మొదలు 3½ నెలలలో ఫలించును. ఈ చేలు కురుచగ (సుమారు 1½-2 అడుగుల యెత్తుగ) నెదిగి బొగుగ దుబ్బుచేయును. ఈ భేదమందంతటను



చాలచోట్ల సాగునందున్న రకశులీతరగతిలోనివే. ఇందు మరల గింజల రంగునుబట్టి మిగుల లేత గోధుమ ముదురు గోధుమ భేదములు గల రకములుగలవు. లేతగోధుమ వర్ణము గల రకములు తెల్లచామ లనియు ముదురుగోధుమ రంగు గింజలుగల రకములు నల్లచామ లనియు వ్యవహరింప బడు చుండును. ఈ రెండు ఉపతరగతులలోను సామాన్యముగ మొక్కలందలి వివిధ భాగములందు ఊదారంగు తక్కువగ నుండు మొక్కలును, హెచ్చుగనుండు నవియును జేరియే యుండును. వెన్నుల వైఖరిలో రింజ వెన్నులు వేయరకము లును, రింజతనము తక్కువగ నుండునవియును గూడ గలవు.

పెద్దచామ లేక బొంతచామ యనునది ఫలించుటకు సుమారు 3½-4½ నెలలు పట్టును. ఈ మొక్కలు 3½-4 అడుగులు యెత్తువరకెదుగును. ఇందును గింజల రంగునందు లేత ముదురు భేదములు గలవు. ఈతరగతిలోగూడ ఊదావర్ణము తక్కువగనుండు మొక్కలును హెచ్చుగనుండు మొక్కలును కలసియేయుండును. ఇట్లు ఊదారంగు తక్కువగాని హెచ్చు గగాని యుండు మొక్కలలో ఊదారంగు అసలేలేని మొక్కలు చేరియుండు రకములు గూడ గలవు. వెన్నులు తరుచు రింజగ నుండును. వెన్ను నిలచియుండు రకములును, పరివెన్నువలె వంగియుండు రకములునుగూడ గలవు. ఇవియు తరుచు కల సియేయుండును. కొన్నిరకముల వెన్నులు, కొనదేలి యుండక కొర్రలలోవలె కొనవరకు కొద్ది గొప్ప లావుబారి యుండును. వీనికి మొండిచామలని పేరు.

పైని పేర్కొనబడిన పిన్న, పెద్ద, తెల్ల, నల్ల, మొండి మొదలగు తరగతుల చామలనుండి ప్రత్యేక లక్షణములుగల మొక్కల నెంచుచో నీ చెన్నపురి రాజధానియందే కొన్ని వందల ప్రత్యేకరకముల నేర్పరుపవచ్చును. వీనిలో గొన్ని సామాన్యముగ సాగునందున్నవాటికంటె హెచ్చుపంటనిచ్చు వంగడములు తేలవచ్చును. కాని యీవని యింకను జరిగినట్లు తోచదు.

చామకు దగినపరిస్థితులు, సేవ్యవిధానము

చామ ఆరిక వలెనే సామాన్యముగ బీద నేలలలో సాగుచేయబడుచుండును. కాని దీని కారికకువలె బొగ్గరపు పరిస్థితులనుకూలములుగావు. చామ బాగుగ పెరుగుటకు అంతకంటె హెచ్చుతేమగనుండు పరిస్థితులు కావలసి యుండును. కొంతవరకిది యివకకుగూడ తాళును. కావున సామాన్యముగ హెచ్చు వర్షములు గురియుటచే నితర సస్యములను సాగుచేయ వీలుపడని కాలములందిది యిసుకకొడి నేలలందును, ఎర్రనేలలందును సాగుచేయబడును. అరుదుగ గరప నేలలందును బంక గరుములందును సాగుచేయబడుటయు గలదు.

పరిస్థితులనుబట్టి చామ జూన్ మొదలు అక్టోబరువరకు విత్తబడుచుండును. అనంతపురం జిల్లాలో నిది చాలవరకు జూలై-ఆగష్టు నెలలలో విత్తబడును. విశాఖపట్నం జిల్లాలో దీనిని తరుచు సెప్టెంబరు-అక్టోబరు నెలలలో విత్తుదురు. దక్షిణాదిని తగినంత వర్షమును గురియచోట్ల నిది ముండోలకరిలో అనగా ఏప్రిల్లో విత్తబడుటయు గలదు.

చామ సామాన్యముగ మెట్ట పంటగనే సాగుచేయబడుచుండును. అరుదుగ నీరుపెట్టి (చోడివలె) సాగుచేయబడుటయు గలదు. కాని, కిట్టుబాటగుట యరుదు. సామాన్యముగ నిది యేదేని తొలకరి సస్యమునకు బిమ్మట రెండవ పంటగ గాని అరుదుగ చానికి బదులుగ గాని సాగుచేయబడుచుండును. ఇదియే ప్రధానసస్యముగ సాగుచేయబడు అనంతపురం జిల్లాలోని బీద నేలలందు దీనితో ఉలవను రెండేడ్ల కొకసారి మార్చి పెట్టుదురు. లేక దీనిని కొంత ముందుగ సాగుచేసి కోసికొని పిమ్మట ఉలవను విత్తుదురు. విశాఖపట్నం జిల్లాలో దీనిని చోడి తరువాత చిత్తి సాగుచేయుదురు. కొన్ని చోట్ల తొలకరిలో మెట్టవరిని సాగుచేసి దీనిని రెండవపంటగ విత్తుట గలదు.

తొలకరిపంటతో మిశ్రణముగ సాగుచేయబడు ముఖ్య తృణధాన్యములు గంటెయు, ఆరికయ్యనై యున్నవి. వర్షమధికమయి యీ రెండును చెడినను చామ తప్పక ఫలించును. అరుదుగ దీనిని తొలకరిని నూపుతో గలిపి సాగుచేయుటయు గలదు. రెండవపంటగ సాగుచేయునపుడు దీనితో తరుచు ఉలవ, మినుము, అనుము కలిపి విత్తబడుచుండును. చల్లక యాలస్యమగుచో ఆముదములను, ఆవను కలుపుటయుగలదు.

కొండపోళ్ళలో అందలి తుప్పలను, చెట్లనువరకేసేసిన పిమ్మట నచట దున్నకయే విత్తులుచల్లబడును. సామాన్యపు సాగుభూములందు చామలను రెండు మూడుసార్లు దున్నిన నేలపై వెదజల్లుదురు. ఎరువువేయుటరుదు. ప్రత్యేకముగ జల్లు నెడల యెకరమునకు సుమారు 6-8 సేర్ల (12-16 పౌనుల)

గింజలు చల్లదగును. గొర్రుతో చల్లుచో నెకరమునకు 5-6 సేళ్లు చాలును. విత్తులను వెదజల్లుచో పైన నొకటి రెండు సార్లు నాగటిని తేల్చి దున్ని కంపతొడుగు తోలవలెను. గొర్రుతో విత్తి నపుడు పైని గుంటకతోలి కప్పవచ్చును. మెట్ట నారు పెంచి చోడివలె నాగటిచాలున వేముటయు కొన్ని చోట్ల గలదు.

చామకు గొప్పత్రవ్వటగాని, అంతరకృషి చేయుట గాని యరుదు. కొన్నిచోట్ల సామాన్యముగ నొకసారి కలుపు మాత్రము తీయుదురు.

చామ కరిష్టములు తక్కువ. పిట్టలకాపు అవసరము లేదు. దీనినిబాధించు కీటకములును సంతగా లేవు. ఒకవిధమగు శిలీంధ్రము (*Uromyces linearis*) వలన గలుగుటగలదు. ఇట్టితెగులుపట్టిన మొక్కలయాకులపై నిడివియగు తామ్ర వర్ణముగల మచ్చలు బయలుదేరును, కాని యీ తెగు లెచట గాని తీవ్రముగ నుండునట్లు గానరాదు.

### కోత, కైలు వగైరా

చామచేనిని పరిచేనివలెనే మొదటికిగోసి పనను సాధ్య మయినంతవర కారనిచ్చి వెంటనే పశువులచే దొక్కించి నూర్చవచ్చును. కొంచెమున్నచో కాళ్ళతోదొక్కివచ్చును. పన బాగుగ నెండుచో కుప్పగబెట్టి పిమ్మట దీరికయైనపుడు నూర్చవచ్చును. సామాన్యముగ నెకరమునకు 60-90 కుంచ ముల \* (500-750 పౌనుల) చామలును, 1-1½ బండ్లు

\* చామలు కుంచము 1½ సుమారు 8½ పౌనులు తూగును.

(1000-1500 పౌనుల గడ్డియు నగును. మంచి నేలలలో 120 కుంచముల (1000 పౌనుల) గింజలును, 2 బండ్ల (2000 పౌనుల) వరకు గడ్డియు నగును. మిశ్రణముగ 30-65 (250-450 పౌనుల) కుంచముల గింజలును,  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  (500-750 పౌనుల) గడ్డియు నగును.

### ఆదాయ, వ్యయములు

చామచేనిని తొలకరిలో ప్రత్యేకముగ వెదజల్లి సాగు చేయుటకగు వ్యయమును, అందువలన రాదగు నాదాయమును ఈక్రింద యంచనా వేయబడెను.

నెల	చేయవలసినపని	వలయుపాటు	వ్యయము
		ప.జ.	మ. ఆ. రు. అ. పై.
<b>వ్యయము</b>			
మే-జూన్	దుక్కి-రెండుసార్లు	8	3 9-0-0
	గుంటకతోలుట-ఒకసారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$ 1-8-0
జూన్	విత్తులు-6 సేర్లు (12 $\frac{1}{2}$ పౌనులు)		1- 9- 0
	కలియదున్నుట, కంపతొడుగు		
	తోలుట	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$ 4- 8- 0
జూలై	కలుపుతీత (అవసరమగుచో)	$\frac{1}{2}$	6 3- 8- 0
సెప్టెంబరు-అక్టోబరు	కట్టు, మోత	2	8 6- 0- 0
అక్టోబరు	నూర్చిడి, ఎగురబోత	1 $\frac{1}{2}$	2 5- 8- 0
	కళ్ళమునుండి తోలుట	$\frac{1}{2}$	1 2- 0- 0
	పన్నులు (సగము)		1- 0- 0
<b>మొత్తము</b>		<b>7 10<math>\frac{1}{2}</math></b>	<b>15 34- 9- 0</b>

\* ప. జ. ఇతర ఫలదాయకములు; మునుపగ నాండు; ఆలలడునాండు.

**రాబడి**

గింజలు80 కుంచములు రు 1 కి రెండుకుంచముల చొ॥	40- 0- 0
గడ్డి 1000 పొరులు రు 1 కి 100 పొరులు చొ॥	10- 0- 0
మొత్తము	50- 0- 0
నికరాదాయము	15- 9- 0

గొర్రుఁగో విత్తులను వరుసగ జల్లుచో 10 పౌనులు మాత్రమే జల్లనగును. మొత్తముమీద వ్యయము రు 10-3-0 లగును. రాబడి రు 12-8-0లు అగును. నికరాదాయము రు 2-5-0 లుండును.

ఉలవలతోగలిపి చోడితరువాత రెండవపంటగ సాగు చేయుచో నాదాయవ్యయము లీక్రిందివిధముగ నుండును.

నెల	చేయవలసినపని	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప.బి.	మ.	ఆ.	రు. అ. పై
	<b>వ్యయము</b>				
సెప్టెంబరు	దుక్కి-రెండు సార్లు	8	8		9- 0- 0
	గుంటక పోలుట-	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
అక్టోబరు	విత్తులు-చానులు 6 పౌనులు				1- 0- 0
	ఉలవలు-8పౌనులు				1- 0- 0
	విత్తులుచల్లి కలియదున్నుట, కంప				
	తొడుగుతోలుట	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$		4- 8- 0
	కలుపుతీత		$\frac{1}{2}$	6	3- 8- 0
డిసెంబరు	చానుతోత		6	2	6- 0- 0
	కైలు, తోలుట	$1\frac{1}{2}$	2	1	5- 8- 0
జనవరి	ఉలవతీత, కైలువగైరా	$\frac{1}{2}$	1	6	5- 0- 0
	పన్నులు (సగము)				1- 0- 0
	<b>మొత్తము</b>	7	$10\frac{1}{2}$	21	38- 0- 0

## రాబడి

	రూ. అ. పై.
చామలు 50 కుంచములు రూ 1 కి 2 కుంచముల చొ॥	25- 0- 0
గడ్డి 890 పానులు రూ 1 కి 100 పానుల చొ॥	8- 0- 0
ఉలవలు 200 పానులు రూ 1 కి 10 పానుల చొ॥	20- 0- 0
బొంతు 500 పానులు రూ 1 కి 50 పానుల చొ॥	10- 0- 0
మొత్తము	63- 0- 0
నికరాదాయము	25- 0- 0

చామలను పొట్టుపోవునట్లు దంపి అన్నముగా గాని, అంబలిగాగాని వండితినవచ్చును. పొట్టు నూటికి 40-45 పాళ్ళ వరకు పోవును. పండిన వెంటనే ఉపయోగించుచో పొట్టు తోనే వడ్లపలె నుడికించి యెండబెట్టి ఉప్పుడు బియ్యమును తయారుచేసి యుపయోగింతురు. చామలను కొందరు పిండిగా విసరి కొట్టెలను గాల్చి తిందురు. వీనిని గొండరు పాలతో నుడికించి సగ్గుబియ్యముతోవలె పాయసము దయారుచేసి-ముఖ్యముగ నుపచాస దినములందు-బుచ్చుకొనుట గలదు. చామల సంఘట్టనము 1-A, B అనుబంధములలో తెలుపబడెను. అందలి యంకెబట్టి యవి ఆరికలకంటె సారవంతమయినవిగ గన్నడును. హంసకృత్తుల పరిమితిలో నివి చోళ్ళకంటె శ్రేష్టములుగ గనబడును. కాని యిందు బొంతెక్కువగా నుండుటచేతను ఇంత రుచివంతము గాకపోవుట చేతను నీ ధాన్యము చోడి, జొన్న మొదలగు వానియంత ప్రీతికరముగ వాడబడుటలేదు.

చామగడ్డి పరిగడ్డివలెనే మృదువుగ నుండుటచే దీనిని కూడ పశువులు బాగుగ తినును. సంఘట్టనమును దెలుపు

అంకెలు లభింపలేదు. కాని యిది వరిగడ్డికంటె హీనముగ పరిగణింప బడుచున్నది. కొండపోళ్ళలోని చామచేలను కొంత యెత్తున గోసి క్రిందిభాగమును తగుల బెట్టుదురు. ఉత్తర హిందూస్థానమునను, మరికొన్ని రాష్ట్రములందును గడ్డిని యెరువుకుప్పలో చేర్తురు. కాని కొన్నిచోట్ల దీనిని పశువుల మేతకొరకు ప్రత్యేకముగ పెంచుటయు గలదు. పశువులమేత సస్యములనుగురించిన భాగమున నీవిషయమయి విపులముగ వ్రాయబడును.



# వరిగ లేక బరిగ

Common millet - *Panicum miliaceum*.

అరవము-కడకన్ని; కన్నడము-బర గు; ఒడ్రము-రాలా;  
హిందీ- వేహ్న, చిన్వా; సంస్కృతము-అణవః

చరిత్ర, వ్యాపకము

వరిగ చామ గణములో జేరిన మరియొక జాతి చిరు ధాన్యము. ఇది గోధుమవలెనే చాల పురాతనకాలము నుండియు సాగునందున్న సస్యముగ నెంచబడుచున్నది. పూర్వార్ధగోళమే దీని కాదిమస్థానమని నెంచబడుచున్నది. కాని ప్రదేశము నిర్ధారణచేయ వీలుగలుగలేదు. ఇది ఉత్తర చీనానుండి మధ్య ఆసియా రష్యాలమీదుగా మధ్య ఐరోపాకు వ్యాపించి యుండునని కొందరూహించు చున్నారు.<sup>48</sup> ఇండియాదేశమునకిది ఈజిప్టు నుండి గాని, అరేబియానుండిగాని వచ్చియుండునని కొందరు శాస్త్రజ్ఞుల యభిప్రాయము.<sup>49</sup> ఆదిమస్థాన మెద్దియైనను ఈ సస్యమిదేశమున క్షౌత్రీకాలమునుండియు సాగునందుండెననుటకు దృష్టాంతములు గలవు. యజుర్వేదమునందలి చమకము నందు (4-7-4) పేర్కొనబడిన ధాన్యజాతులలో నది (అణవః) యొకటిగ నుండెను. బృహదారణ్యకోపనిషత్తు (31-13) నందు పేర్కొనబడిన దశ ధాన్యములందు గూడ నది చేరియున్నది.

వరిగ యిండియా దేశమునందంతటను, మధ్యధరా సముద్రమునంటియున్న ఆఫ్రికా, ఐరోపా ఖండములందలి

కొన్ని దేశములందును, రష్యా, చీనా, జపాన్ దేశములందును సాగునందున్నది. ఉత్తర అమెరికాలో నిది యిటీవలనే బ్రవేశపెట్టబడెను.

వరిగ ఆయా దేశములందుగాని, ఇండియాలోనే ఆయా రాష్ట్రములందుగాని యెంతెంత విస్తీర్ణముపై సాగు చేయబడుచున్నదో తెలుపు అంకెలు లభింపలేదు. కాని యిది సాగుచేయబడుచున్న ముఖ్య రాష్ట్రములు పంజాబు, సంయుక్త రాష్ట్రములు, మధ్య రాష్ట్రములు, బొంబాయి చెన్నపురియునై యున్నవి.

చెన్నపురిరాజధానిలో నైనను యీసస్యపు సాగు విస్తీర్ణములెక్కలలో ఇతర తృణధాన్యములు అను శీర్షికక్రింద జేర్చబడుచున్నందున బ్రత్యేకముగ తెలియదు. ఐనను నిది సుమారు 5 లక్షల యెకరములపై సాగు చేయబడుచున్నదని యంచనా వేయబడెను. విరివిగ సాగుచేయబడు తెలుగు జిల్లాలలో గుంటూరు ముఖ్యము. నెల్లూరు, కృష్ణాజిల్లాలలోను, రాయలసీమలోను కూడ నీసాగు కొంతవరకు గలదు. ఆనకట్టకు పూర్వమిది గోదావరి డెల్టాలో గూడ కొంత విరివిగా సాగుచేయబడుచుండెను. తెలుగు జిల్లాలలోని మొత్తపు వరి సాగు విస్తీర్ణము సుమారు 35 లక్షల యెకరములుండును. తమిళనాడున నీసాగుగల ముఖ్యజిల్లాలు మధుర, తిర్నల్వేలి, కోయంబత్తూరు.

వరిగ సాగు విస్తీర్ణము కొంతకాలము క్రిందటి కంటె నిటీవల తగ్గెను. పొగాకు మొదలగు శీతకాలపు పంటల విస్తీర్ణము హెచ్చుటయే యందుకు గారణము.

## వరిగమొక్క సామాన్య లక్షణములు

వరిగమొక్క చాచా శొంకనుబోలి సామాన్యముగ 2-3 అడుగుల ఎత్తువరకెదుగును. చామకంటె బాగుగ దుబ్బు చేయును. నేలను బాగుగ గ్రమ్మును. మొక్కయందు చాల భాగములు నిడివియైన రోమకళను కొద్దిగొప్ప కలిగియుండును. చామ మొక్క కంటె యిది కొంచెము హెచ్చుగ వేరుపోయును.

తొండము సన్నముగ నుండును. చామకంటె బలహీనమయినదగుటచే చేప తరచు నేల్లపై పోలుచుండును. మొక్క మొదటినుండి పుట్టు పిల్లలుగక పైకణపులనుండి గూడ శాఖలు బయలుదేగును. ఒక్కొక్క కర్రలో సామాన్యముగ 4-6 నిడివిగ నెదుగు ఖండములుండును.

ఆకునందలి తొడిమ లీఖండములను కొంచె మించు మించు పూర్తిగ గ్రమ్మియుండును. వీనిపై ముఖ్యముగ క్రింది యాకు తొడిమలమీద నిడివియైన రోమములు గుంపులు గను నుండును. రేకు చామ రేకుకంటె కొంచెము వెడల్పుగ నుండును. కాని కురుచ. సామాన్యముగ 6-15 అంగుళములు పొడవెదుగును. వెడల్పు  $\frac{1}{2}$  శీ అంగుళమువరకుండును. చాల రకములందు రేకులమీద గూడ రోమము లుండును.

వరిగవెన్ను చామ వెన్నునుబోలి సుమారు 6-10 అంగుళముల పొడవుండును. చామ వెన్నుకంటెను నెక్కువ రెల్లలు (10-15 వరకు) గలిగి అంతకంటె రింజగనుండును. గింజ ముదిరిన కొలదియు వరి వెన్నువలె నందముగ వంగును.

19 వ పటము



బాదవెన్ను (1 వైజా)

వంగని రకములును గలవు. రెల్లలు అనేక పిల్ల రెల్లలు గను, చిత్తలుగను జీలి తునుకు రెండేసి (అరుదుగ మూడేసి) యల్పకణిశములు గల విశ్వ లేర్పడును. బిల్బ కణిశములు చానుకోకంటె యిం చు క పెద్దవి. సుమారు  $\frac{3}{4}$  అం. ఉండును. 1వ తువము, 2, 3వ తువములకంటె కొంచెము చిన్నదిగ నుండును. చూడవ తువపు వంగలో బుస నుండును. కాని యీ తువ బుస ముల సంభవ నుండు పూవు సామాన్యముగ చచ్చునకన్నె యుండును. అరుదుగ నిండు

మూడు కింజల్కములు (నూత్రి) యుండుటయుగలదు. నాలుగవ తువము 2, 3 తువములకంటె నిండుక చిన్నది గనున్నను నాని కంటె జిగిగా నుండును. ఇందలి బుసయును గట్టి జిగిగా నుండును. ఈతువ బుసములమధ్య పూర్ణముగ పూవొకటి యుండును. పూవునందు రెండు ఉన్నద) గలుగును, వూడు కింజల్కములును, ఒకఅండాశయమును, రెండు చాకలవంటి కీలములును ఉండును. అరుదుగ (నొగ నిజేశపు రకమున) కొన్ని యల్పకణిశములందు ఫలవంతముగ పుష్పముగల యైదవతువ

మును, బుసమును బయలుదేరుటవలన ఒక వడ్లగింజలో రెండు బియ్యపుగింజలేర్పడునట్లే జంటగింజలు బయలుదేరుట గలదని కనిపెట్టబడెను.<sup>48</sup> ఒక వెన్నుపందలి పూవులన్నియు వికసించుటకు సుమారు 10 రోజులు పట్టును. చాల భాగము 7 దినములలో విడచును. పూవులు సామాన్యముగ పగలు 10-12 గంటలకు మధ్య 5-7 నిమిషములు మాత్రమే తెరచియుండి మరల మూసికొనిపోవును. ఆత్మ సంపర్కమే సామాన్యము. పర సంపర్కము చాల యరుదు. గింజ బొన్న, ఆరిక తప్ప తక్కిన చిరుధాన్యములకంటె పెద్దది. తులమునకు సుమారు 2200-2300 గింజలవరకు తూగును.

వరిగింజను తుష బుసములు పరివేష్టించి యుండును. గింజలమొక్కయు వానిని కప్పియుండు తుష బుసముల మొక్కయు రంగు సామాన్యముగ మసర లేక ధూమ్రవర్ణముతో గూడిన గోధుమ వర్ణముగ గాని లేబసిమిలో గూడిన తెలుపు వర్ణముగగాని యుండును. ఎరువుతోగూడిన నారింజ వర్ణముగల విదేశపు రకములు గూడ గలవు.

మొక్కలందు కొన్ని భాగములందు సామాన్యముగ నూదారంగుండును. కాని యిది చామగోవలె స్ఫుటముగ నుండకపోవుటచే బాగుగ పరిశీలించినగాని కనబడదు. ఈరంగు సామాన్యముగ తుషముల కొనలందును, కీలములందును మాత్రము గాననగును. ఒక్కొక్కప్పుడు లేత మొక్కలందు క్రింది యాకుల తొడిమలందు గూడ నీరంగుండ వచ్చును. ఈరంగును అల్పముగ నుండి భూతఅద్దముతో జూచినగాని

తెలియని రకములును అసలు రంగే లేని రకములును గలవు.<sup>48</sup>

వరిగలలో పైని వ్రాయబడినట్లు సామాన్యముగ మొక్కలందన్ని భాగముల పైనను రోమములుగడును. కాని వీని సాంద్రతలో తారతమ్యములుగల రకములు శాస్త్రజ్ఞులచే గుర్తింపబడుచున్నవి. రోమహీనుమగు రకములును గొన్ని గలవు. రోమహీనుమని యెంచబడు రకములలో క్రిందియాకుల తొడిమలపై యించుక రోమకళ గలిగి యుండుటయు గలదు. ఇట్లు శాస్త్రజ్ఞులచే గింజల రంగుభేదమునుబట్టియు, ఊదా రంగు భేదమునుబట్టియు, రోమకళనుబట్టియు ననేకరకములు గుర్తింపబడుచున్నను, కృషివలురచే నీ రక భేదము లంతగా గుర్తింపబడుటలేదు. సామాన్యముగ నాగునందున్న వరిగలలో యించుక బసిమిగనుండు తెలుపు గింజలును, ధూమ్ర వర్ణముగల గింజలును కలిసి యేయుండును. కాని కొన్నిచోట్ల కొంచె మించు మించు స్వచ్ఛముగనుండు నీరెండురకములును వేర్వేరుగ నాగుచేయబడుచున్నవి.

వరిగకు దగిన పరిస్థితులు, సేవ్యవిధానము

వరిగకు యిదివరలో వ్రాయబడినట్లు ఉత్తర చీనాయో మధ్య ఆసియా యో ఆదిమస్థానములు యుండుటచే దీని పెరకువకు గోధుమకువలె కొంత శీతల మవసరము. కావున నిండియాలో చాలచోట్ల నిది యితర శీతకాలపు సస్యములవలె వర్షకాలాంతమున గాని, శీతకాల ప్రారంభమున గాని విత్తుదురు. నేలయందప్పటికుండు పదునుతోను, మంచు సహాయ

మునను\* బెరిగి నురల యెండ తీప్రిమగు తోపల ఫలించును. మరియు నిది గోధును, జొన్న మొనలుగు నితర శీతకాలపు తృణధాన్యములకంటెను తక్కువ తేమగోనే పెరుగగలదు. అంతకంటె తక్కువకాలములో తోతకువచ్చును. వరిక పైని వ్రాయబడినట్లు వర్షకాలము ముగిసిన పిమ్మట పైరుచేయు సస్యమగుటచే దీనికి గోధుమకును, సెనగకును వలెనే తేమను వట్టియును రేవడి లేక వండలి నేలలు అనుకూలములు. తేలిక నేలలలో దీనిని సాగుచేయుచో నీటి పాకుడల యవసర మగును.

ఆయా ప్రదేశములందు వర్షములు గురియు కాలమును బట్టియు, స్వపాతపు స్వభావమును బట్టియు, నేలయొక్క స్వభావమును బట్టియు వరిగను నొంచును నాందు నెనుకలుగ విత్తుచుందురు. ఆంధ్రప్రదేశమున నీసస్యము హెచ్చుగ సాగు నందుగల గుంటూరు జిల్లాలోని రేవడి నేలలందు దీనిని అక్టోబరు-నవంబరులలో విత్తుదురు. గోవావరి ఒకలలో దీనిని వరదభయము వూర్తిగా తొలగిన వెనుక నవంబరులో విత్తుదురు. రాయలసీమలో వర్షములు తక్కువగ గురియుటచే దీనిని జూలై-ఆగష్టు నెలలలోనే విత్తుటగలదు. దక్షిణాదిని కొన్ని చోట్ల దీనిని మెట్టసస్యముగ సెప్టెంబరులోను, నీరుపెట్టి నవంబరు మొదలు జనవరి నరకును విత్తుచుందురు. బొంబాయి రాజధానిలో కొన్ని చోట్ల దీనిని తొలకరి వంటగ సాగుచేయుటయు గలదు. బంగాళా రాజధానిలో దీనిని ఆగష్టులో గాని,

\* మంచుసహాయమున బెరుగుటచేతనే దీనికి అరచమున 'పనివరగు' అనగా మంచువరిక అను నర్థమునిచ్చు పేరు గలిగెను.

ఫిబ్రవరి-మార్చి నెలలలో నాని విత్తుడుదురు. వరి 7 నిత్తిన 2½-3 నెలల లోపలనే ఫలించును.

వర్ష కాలాంతమున నేలలోనుండు వరుసుతోనే పెరు గవలసి యుండుటచే నీవరిగను నీరుపెట్టకుండా సాగుచేయుచో తొలకరిలో విత్తబడు తృణధాన్యములకు కంటే దీనికి నేల వెక్కువ బాగుగ సాగుచేయవలసి యుండును. గుంటూరు జిల్లాలో మొత్తముమీద 4, 5 సార్లు నేలను దున్ని కడవటి రెండుసార్లు గుంటకను తోలుదురు.

విత్తులను వెదజల్లు పద్ధతియు, గొరుతో వరుసలుగ జల్లు పద్ధతియు గూడ గలవు. గుంటూరు జిల్లాలోను, దత్త మండలములోను రెండవ పద్ధతియు, గోదావరి జిల్లాలోను, కోయంబత్తూరు జిల్లాలోను మొదటిపద్ధతియు అవలంబింపబడు చున్నవి. ఎకరమునకు సుమారు 4-5 సేర్లు (8 పానులు) గొరుతో విత్తిన చాలును. వెదజల్లినయెడల 5, 6 సేర్ల (10-12½ పానుల) విత్తులను చల్లదగును.

అంధ్రదేశమున వరిగను నీరుపెట్టి సాగుచేయుటగుదు. కాని అరవదేశమునను, బంగాళా రాజధాని మొదలగు వితర రాష్ట్రములందును నీపద్ధతి విరివిగ గలదు. నీరుకట్టి సాగుచే యునెడల నేను బాగుగ పున్న విత్తులను వెదజల్లి మళ్లగట్టి బోదులనుచేసి నీరుపెట్టవలెను. సామాన్యముగ 4, 5 తడులు చాలును. బొంబాయి రాజధానిలో తొలకరిలో నారుపెంచి మళ్ళలో నీరుగట్టి ఋరదచోడివలె నాటి తరువాత సామాన్య ముగ తడి పెట్టకుండగనే సాగు చేయుదురు.



వరిగకు గొప్ప త్రవ్వటగాని, అంతరకృషి చేయుట గాని యరుదు. కాని విత్తిన వెనుక వర్షము గురియిచో మరల నేల యారిన పిమ్మట నెడజల్లిన చేనిలో నొకసారి గొప్ప త్రవ్వటగాని, గొర్రుతో విత్తినచూనిలో ఒకటి రెండు సార్లు అంతరకృషి చేయుట గాని యవసరముగను.

వరిగను చామవలె మొదటికిగోసి పన నెండనిచ్చి కైలు చేయవచ్చును. మొట్టపంట సుమారు 80-100 కుంచముల గింజల నిచ్చును. నీరుపెట్టి సాగుచేయునెడల సామాన్యముగ 150 కుంచములవరకు పండును. కోయంబత్తూరు జైత్రీమన 1921-22 వ సంవత్సరమున అనుకూలముగ మన్ని మందగట్టి నీరుపెట్టి సాగుచేసిన యొకపైరు సుమారు 300 కుంచముల వరిగలవరకు నిచ్చెను.

### ఆదాయ, వ్యయములు

వరిగను సాగుచేయుటకగు వ్యయమును, అందువలన రాదగు నాదాయమును ఈ క్రింద చూచనా వేయబడెను.

#### I. మొట్టపంట-గొర్రుతో విత్తు వద్దతి

నేల చేయవలసిన పని వలయుపాటు వ్యయము  
ప.జ. మ. ఆ. రు. అ. పై

#### వ్యయము

కాల్చె-			
ఆగవ్వు దుక్కి-రెండుసార్లు	3	3	9- 0- 0
పెట్టెంబరు దుక్కి- ఒకసారి	1½	1½	4- 8- 0
మొత్తము	4½	4½	13- 8- 0

\* ప.జ.=పశువులజతలు; మ= మగవాండ్లు; ఆ=ఆడువాండ్లు.

నెల	చేయవలసిన పని	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప. జ.	మ.	ఆ.	రు. అ. పై.
	వెనుక పురుసుండి	4½	4½		18- 8- 0
	గుంటక తోలుట-బికసారి	½	½		1- 8- 0
అక్టోబరు	గుంటక తోలుట-రెండుసార్లు	1	1		3- 0- 0
	విత్తులు 10 పౌనులు				1- 4- 0
అక్టోబరు	గొయితో వరుసలుగ వేయుట	½	1		2- 0- 0
	గుంటక తోలి కప్పుట	½	½		1- 8- 0
నవంబరు	అంతరక్కసి (అవసరమగుచో)	1	1		3- 0- 0
జనవరి	కోతి, కైలు వనైరా (చామకువలె) 2		5	9	13- 8- 0
	పన్నులు				4- 0- 0
	19- 4- 0	10	18½	9	43- 4- 0

### రాబడి

80 కుంచముల వరిగలు (నుమారు 660 పౌనులు)	
రు 1 కి 1½ కుంచముల చొప్పున	53- 5- 4
గడ్డి 1 బండి (నుమారు 1000 పౌనులు)	
రు 1కి 100 పౌనుల చొప్పున	10- 0- 0
మొత్తము	63- 5- 4
నికరాదాయము	20- 1- 6

## II. నీరు పెట్టి సాగుచేయు పద్ధతి

నెల	చేయవలసిన పని	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప. జ.	మ.	ఆ.	రు. అ. పై.
వ్యయము					
అక్టోబరు					
నవంబరు	దుక్కి-రెండుసార్లు	3	3		9- 0- 0
డిసెంబరు	గుంటక తోలుట-రెండుసార్లు	1	1		3- 0- 0
	మొత్తము	4	4		12- 0- 0

నెల	చేయవలసిన పని	వలయుపాటు			వ్యయము
		ప. జ.	మ.	అ.	రు. అ. పై.
	వెనుకపుటనుండి	4	4		12- 0- 0
	మం నకట్టుట-1000				15- 0- 0
	గుంటకి నోలుట	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
	విత్తుట, గుంటకతోలుట, బో				
	దుల కేర్పరచుట, మగ్గు				
	గట్టుట	$\frac{1}{2}$	5		6- 0- 0
	నీగతోడుట ( $2\frac{1}{2}$ అం )	$3\frac{3}{4}$	$3\frac{3}{4}$		11- 4- 0
జనవరి-					
	ఫిబ్రవరి నీయతోడుట-3 సార్లు (6అం.)	9	9		27- 0- 0
ఫిబ్రవరి	కోత, కైలునకైరా	$2\frac{1}{4}$	5	10	14- 8- 0
	పన్నులు-సగము				2- 0- 0
	మొత్తము	20	7 $\frac{3}{4}$	10	89- 4- 0

## కాబడి

150 కుంచములు (1250 పా.) రు 1 కి $1\frac{1}{2}$ కుంచము పోవున	100- 0- 0
గడ్డి బండ్లు- 2	20- 0- 0
మొత్తము	120- 0- 0
నికరాదాయము	30-12- 0

1923-24 వ సంవత్సరమున కోయంబత్తూరు జైల్లో మున నిట్లు పైరుచేసిన సస్యమువలన నెకరమునకు రు 44/- ల వరకు నికరాదాయము వచ్చెనట.

## ఉపయోగములు

వరిగభాస్యమును చామనువలె పై పొట్టు పోవునట్లు దంపి అన్నముగ వండిగాని విసరి పిండిచేసి రొట్టెగచేసిగాని తిన

వచ్చును. పై పొట్టు నుమారు 3 వ వంతుండును. వరిగలియ్య ముతో క్షీరాన్నమును చేయుటగూడ గలదు.

వరిగల సంఘట్టనము 2 వ అనుబంధము A లో తెలుపబడెను. అందలి యంకెలనుబట్టి కొర్రలుకాక తక్కిన చిరుధాన్యము లన్నిటికంటెను, గోధుమలందుకంటెను వరిగలలో మాంసకృత్తులు హెచ్చుగ నున్నవని తేలెను. పొట్టు పోవునట్లు దంపిన బియ్యమునందు నాగవదార్థము తక్కువ కావున నీయన్నము వరియన్నమువలె సులభముగజీర్ణమగును. అందువలన నీగింజలపైగూడ చామ, ఆరికలందువలె పొట్టు హెచ్చుగ నున్నను నివి వానికంటె హెచ్చు నెలగలిగి యుండును.

చామగడ్డివలెనే వరిగగడ్డినికూడ పశువులు బాగుగ దినును. కాని దీనిసంఘట్టనమును దెలుపు అంకెలు లభింప లేదు. పంజాబులో దీనిని మేతకొరకే ప్రత్యేకముగ పెంచుట గూడ గలదు.

# ఊద

Sanwa millet-Echinochloa colona, Var  
trumentaceum

అరవము-కుదరైచాల్; కన్నడము-కాడుదాగైహుగ్గు; హిందీ-సాన్ వాక్.

చరిత్ర, వ్యాపకము

ఊదను కొన్నిచోట్ల (తూర్పుగోదావరిజిల్లాలో) చామ  
యని పిలుచుట గలదు. శాస్త్రజ్ఞులుగూడ నిటీవలివరకు  
ఊదను చామగణములోని జాతిగానే పరిగణించుచుండిరి. కాని  
యిప్పుడు దీనిని ప్రత్యేకగణములో జేర్చిరి. వరినేలలలో కలు  
పుగా పెరుగు ఊద (Echinochloa colona) గడ్డిలో నిది  
యొక యుపజాతి. పెద్ద ఊద లేక బొంత ఊద యనునది  
(Echinochloa crusgalli) అను ప్రత్యేకజాతిగా పరిగణింప  
బడుచున్నది. ఈసస్యపు చరిత్రనుగూర్చి మనకంతగా తెలి  
యదు. ఐనను యిండియాలోనే యిది వన్యస్థితినుండి మొట్ట  
మొదట సాగులోనికి తేబడెననియు చాల పురాతనకాలము  
నుండియు సాగునందుండెననియు శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పుదురు.<sup>50</sup>  
కాని కృష్ణయజుర్వేదసంహిత (5-2-5) లో బేర్కొనబడిన  
సప్తగ్రామ్యములలోగాని, బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో పేర్కొ  
నబడిన దశగ్రామ్యములలోగాని దీనిపేరు కానరాదు. అరణ్య  
కములుగ పేర్కొనబడినవానిలో నైనను ఇది యేదియో నిర్ధా

రణగ దెలియుట లేదు. ఇండియాలోనేగాక యిది పూర్వ పశ్చి చూర్ధ గోళములందలి యుష్ణమండలములందును సమశీతోష్ణ మండలములందును నన్యస్థితియందు గాననగును.

ఊద యిప్పు డిండియా. చీనా, జపాను, డచ్చి యిండి యాద్యీపములలోను కొంతవరకు ఆఫ్రికాలోను పండింపబడి బీదలచే నాహారముగ నుపయోగింపబడుచున్నది. కాని ఆ యా దేశములందును, యిండియాలో నా యా రాష్ట్రము లందును ఇది సాగుచేయబడు విస్తీర్ణమును దెలుపు అంకెలు లభింపలేదు. చెన్నపురిగాజధానిగోనైనను దీనిసాగు విస్తీర్ణము ఇతర తృణధాన్యములలో జేర్చబడుటచే బ్రత్యేకముగ దెలి యుటలేదు.

ఆంధ్రదేశమున ఊద సాగుచేయబడు జిల్లాలలో విశాఖపట్నం ముఖ్యమయినది. కొంతవరకు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోగూడ దీనిసాగుగలదు. తమిళనాడున దీనిసాగు కోయం బత్తూరు, తిర్నల్, తేల్లి జిల్లాలలో కొంతవరకు గలదు.

మొక్కయొక్క లక్షణములు, రకభేదములు

ఊదమొక్క దుబ్బుచేసి సామాన్యముగ 2-3½ అడుగుల యెత్తువరకు నెదుగును. చాతుకంటె మోటయినది. చురుకుగ నెదుగును. వేళ్ళు చావుతోకంటె కొంచెము మెండుగ నుండును. అంతకంటె యించుక దూరముగను వ్యాపించును. కాండము పరిగ. చావు కాండములకంటె లావుగనుండును. చోడిలోవలె కొంచెము బల్లపరువుగనుండును. సామాన్యముగ నొక్కొక మొక్కలో 2-5 పిల్గులుండును. గరిష్ఠపు

20 వ పటము

ఉదదుబ్బు ( $\frac{1}{2}$  వైజు)

పొడవుగల ఖండము సామాన్యముగ 5-8 అంగుళములు ఉండును. బాగుగా నెదిగిన యొకటి లందలి తొడిమ 3-4 $\frac{1}{2}$  అంగుళముల సరకుండును. రేకుపొడవు 9-15 అంగుళములవరకుండును. నెడల్పు సుమారు  $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{6}$  అంగుళముండును.

సన్న సామాన్యముగ 4-6 అంగుళముల పొడవుండును. అరుదుగ 8 అంగుళముల వరకుండుట గలదు. రెల్లలు (కణిశములు) ఉనేకము - సామాన్యముగ 8-20 వరకు - దగ్గర దగ్గరగ నమరియుండును. ఇవి

ఒక్కొక్కచోట 3-4 చొప్పునగాని అరుదుగ రెండేసియేగాని యదుగాని యమరియుండును. గుర్రపుశోకమును సర్థమిచ్చు నీసస్యపు అరవపేరు కుదరైవాల్ ఈ వెన్ను యొక్క నైఖరిని దెలుపును. బాగుగా నెదిగిన వెన్నులందు ఒక్కొక్క కణిశపు పొడవు సుమారు 1 $\frac{1}{2}$ -3 అంగుళములవరకుండును. ఒక్కొక్క కణిశమునందనేక యల్పకణిశములు 3-4 చొప్పున గుంపులుగ నమరియుండును. రెండేసిగాని, 5 వరకుగాని కూడియుండుటయు గలదు. ఒక్కొక్క కణిశమందు సగటున 15-30 అల్ప కణిశములుండవచ్చును. వీనిపొడవు సుమారు  $\frac{1}{2}$  అంగుళము

వరకుండును. అల్పకణిశమున 1 వ తుషముకంటె 2, 3 తుషములు పెద్దవి. 3 వ తుషపు పంగలో బుసముండును. కాని యీ తుష బుసములచుద్ధ్య పూవురాడదు. ఉన్నను నది మగ పూవైయుండును. నాలుగవ తుషమునకును దాని బుసమునకును మధ్య సరపూర్ణమగు పూవుండును. పూవునందు రెండు ఉన్నద్రోకములును, మూడు కింజల్కములును, ఒక యండాశయమును, రెండు కీలములును ఉండును.

నెన్ను రోటాకునుండి వెలువడుటకు కోయంబత్తూరు పరిస్థితులలో 9-13 దినములు పట్టుననియు, పూవులు 19-25 రోజులవరకు విడచుచుండుననియు గనిపెట్టబడెను. 6 వ రోజు మొదలు 8 వ రోజువరకు హెచ్చుపూవులు వికసించును. పూవులు హెచ్చుగ వికసించుకాలము ఉదయము 6-7 గంటలకు మధ్యనైయున్నది కాని 5 గంటలకే ప్రారంభమై సుమారు 10 గంటలవరకు కొద్దిగాప్ప విడచుచునేయుండును. పూవు వికసించి మూసికొనుటకు రెండునిమిషములు మాత్రమే పట్టును. పూవులు ఆత్మసంపర్కమువలననే గర్భవతు లగును. కాని కృత్రిమముగ పరసంపర్కము గలిగించుట కవకాశము గలదు. <sup>57</sup>

గింజలు చామగింజలకంటె యింపుకపెద్దవి. తులమునకు సుమారు 3500-3800 వరకు తూగును. బొంతుకూడ అంతయుండదు. కాని మొత్తముమీద గింజలు తృణాధాన్యములన్నిటిలోకంటె తేలిక. కుంచమునకు 6 $\frac{1}{2}$  పౌనులు మాత్రము\* తూగును.

\* వడ్లు సుమారు 7 పౌనులును, ఆరికలు 7 $\frac{1}{2}$  పౌనులును, గంటెలు



ఉదాలో రకభేదము లంతగాపాటించబడుట లేదు. కాని సామాన్యముగ ఉదాచేలలో కొన్ని భాగాలను దూదారంగు గల మొక్కలను అది బొత్తిగాలేని మొక్కలను గుర్తింప వచ్చును. ఉదారంగులేని మొక్కలు నెంచి వృద్ధిచేసిన యూదకు కొన్నిచోట్ల పాలయూదయును పేరు. ఉదారంగుగల మొక్కలలోగూడ శాస్త్రజ్ఞులు ఆరింగుమొక్క - సాంద్రతను బట్టియు, అదియుండు భాగములనుబట్టియు మూడురకములను గుర్తించుచున్నారు. వెన్నులవైఖరిలోగూడ కణిశముల యను రికనుబట్టి జల్లి, చిక్కన, మధ్యమము అని మూడురకములు గుర్తింపబడుచున్నవి. సామాన్యముగ కర్నకులచే సాగుచేయ బడు ఉదాకే కొన్నిచోట్ల బురిఉదా యనికూడ పేరు. పెద్ద ఉదా లేక బొంతుఉదా యనునది శాస్త్రజ్ఞులచే ప్రత్యేకజాతిగ పరిగణింపబడుచున్నది. ఈమొక్క బురిఉదా మొక్క కంటెను మోటుగ నెరుగును. కాని తక్కువగ దుబ్బు చేయును. అప్పుడప్పుడు పై కణుపులనుండికూడ శాఖలు బయలుదేరును. ఒక్కొక్క కర్రలో 6 మొదలు 12 ఖండముల వరకు నిడివిగ నెరుగును, కాని యివి బురి ఉదాలోకంటె కురుచగ (సుమారు 4-5 అంగుళములు మాత్రమే) పొడవుండును. ఆకుల తొడిమలు ఖండములకంటె యింపుక నిడివిగ నుండును. రేకులు బురిఉదాలోకంటె కొంచెము పొడవు. బాగుగ నెదిగినయాకులలో సుమారు 12-21 అంగుళములుండును. రేకులవెడల్పు బురిఉదాలోకంటె చాలహెచ్చు.

7½ పౌనులును, చాచులు, పరిగలు, చోళ్ళు సుమారు 8½ పౌనులును, జొన్నలు సుమారు 8½ పౌనులును, కొర్రలు 8½ పౌనులును తూగును.

బాగుగ నెదిగినవానివెడల్పు సుమారు 3-4 అంగుళమువర కుండును. వెన్ను పొడవు 6-10 అంగుళములవరకుండును. ఇందు కణిశములు 25-40 వరకు చిక్కగ నమరియుండును. కణిశముల చివళ్ళు పండినకొలది చోడినెన్నులోని వ్రేళ్ళవలె లోనికి వంగుటచే వెన్ను జడయల్లినట్లు మరింత చిక్కగ గనబడును. అల్పకణిశములు సుమారు 3 అంగుళము పొడవువరకుండును. 3 వ తువపు కొనను 2 అంగుళముల పొడవువరకుండు చోక యుండును. ఇట్లల్పకణిశములు చోకలు గలిగి యుండుట వలననే దీనికి బొంతొడద యని పేరు గలిగెను. గింజయా పెద్దది.

### ఊదకుదగిన పరిస్థితులు, సేవ్యవిధానము

ఊద సముద్రమట్టము మొదలు 6000 అడుగులవరకు ఉన్నతముగల ప్రదేశములందు పైరగుచున్నది, స్వల్పపు వదునులో శీఘ్రముగ నెదిగి ఫలించును. ఇవకకుగూడ నాగును. కావున పదును నిలువని యేటవాలు ప్రదేశము లందును, బాడువ నేలలందునుగూడ సాగుచేయబడుచున్నది.

ఉత్తరసర్కారులలోని బురిఊద తరచు నల్లనేలలలో పరికిముందుగ మే-జాన్ నెలలలో పునానపైరుగ సాగుచేయబడుచుండును. విత్తిన 2½ నెలలలో ఫలించును. ఫలించు లోపల మళ్ళను దమ్ముచేయుటకు నీరందుచో దీనిని పశువులకు గోసివేసిగాని, వానిచే మేపిగాని వరినాటబడుచు. నిస్సారమయిన మెట్టనేలలందుగూడ యిది కొన్నిచోట్ల తొలకరిలో జాన్-జూలై నెలలలో విత్తి సాగుచేయబడుచున్నది. పెద్ద

ఊదకు బురిఁడొదకంటె సారవంతమైన నేలలు కావలయును. ఇది మెట్లనేలలలో తొలకరిపంటగగాని, మరియుక తొలకరి పంట గోసిననెనుక రెండవపంటగగాని సాగుచేయుబడుచుండును. దక్షిణాదిని పడమటివర్షము లాలస్యముగ గురియుటచే బురిఁడొదనుగూడ సెప్టెంబరు నెలలో విత్తుదురు. తొలకరిలో దీనిని మెట్టసస్యముగ సాగుచేయుచో దీనితరువాత ఊద మొదలగు పయరపంటలు పెట్టబడును.

ఊద సామాన్యముగ ప్రత్యేకముగనే విత్తబడును. తొలకరిలో మొక్కజొన్నతోను, సెప్టెంబరులో జొన్న, ప్రత్తి మొదలయినవానితోను, పయర దినుసులతోను కలిపి విత్తుట గలదు.

మెట్టసస్యముగ సాగుచేయునెడల నేలను రెండుసార్లు దున్ని విత్తులను జల్లవచ్చును. ఉత్తరసర్కారులలో తొలకరిని వర్షముగురిసిన వెంటనే అదివరకు బాగుగ కాలియున్న నేలపై విత్తులనుజల్లి రెండుసార్లు దున్నుటగలదు. పిమ్మట గోసి నూర్చుకొనుటదప్ప మరియేపనియులేదు. ఎకరమునకు 6-8 సేర్ల (9-12 పౌనుల) విత్తులు చాలును. గొర్రుతో వరుసలుగ విత్తునెడల 5, 6 సేర్లు చాలును.

కోయంబత్తూరుజిల్లాలో బురిఁడొదను నారుపోసి చోడికి వలె నీరుగట్టి నాటుటయుగలదు. 3-4 తడులతో నాటిన 6-7 వారములలోనే కోతకువచ్చును. విశావట్నంజిల్లాలో కొన్ని చోట్ల పెద్దఊదను చోడివలె నారుపోసి నాగటిచాలునవేయుట గలదు. ఊద కెరువువేయుటగాని గొప్పత్రవ్యుట మొదలగు నుత్తరకృషి చేయుటగాని యరుదు.

మెట్టసస్యముగ సాగుచేయబడుచోద సామాన్యముగ 70-100 కుంచముల (400-600 పౌనుల) గింజలును, సుమారు 1 బండి 1000-1200 పౌనుల) గడ్డిని యొసగును. నీరు పెట్టి సాగుచేయుచో 160 కుంచముల (1000 పౌనుల) వరకు గింజలును, 2000 పౌనులవరకు గడ్డియు కావచ్చును. బాగుగ నెరువువేసి సాగుచేయబడినపు డొకచోట (దేశాంతరమున) సుమారు 3300 పౌనుల (66.7 బుష్సెలుల) గింజలును, 11297 పౌనుల గడ్డియు నయ్యెనట. <sup>50</sup>

### ఆదాయ, వ్యయములు

ఊదను పరిమల్లలో వెదజల్లి సాగుచేయుటకగు వ్యయమును, అందువలన వచ్చు రాబడియు స్క్రింద అంచనా వేయబడెను.

నెల	చేయవలసినపని	ప. జ.	మ.	ఆ. +	వ్యయము రు. ఆ. వై.
	వ్యయము				
ఏప్రిల్	గుక్కి- రెండుసార్లు	3	3		9- 0- 0
మే	గుంటకతోలుట	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1- 8- 0
జూన్	విస్తలు-10 పౌనులు				1- 4- 0
	చల్లుట, నాగటితో రెండుసార్లు				
	చున్ని క- పతోడుగుతోలుట	3	3		9- 0- 0
సెప్టెంబరు	కోత, పైలు వ్రైరా	2	5	9	18- 8- 0
	పన్నులు $\frac{1}{8}$ ఫాగము				2- 0- 0
	మొత్తము	8 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	9	36- 4- 0

♦ ప. జ. = పశువులజతలు; మ. = మగ వాండు; ఆ. = ఆడ వాండు.

## రాబడి

రు.అ.పై.

100 కుంబముల ఉదల (625 పౌనులు)

రు 1కి రెండుకుంచముల చొప్పున

50- 0- 0

గడ్డి 1 బండి (1000 పౌనులు) రు 1 కి 200 పౌనుల చొప్పున

5- 0- 0

మొత్తము

55- 0- 0

నికరాదాయము

18-12- 0

## ఉపయోగము

ఉదలను గింజలపై పొట్టు పోవునట్లు దంపి అన్నముగ వండి తిందురు. పిండిచేసి రొట్టెచేయుదురు. పాలతో నుడికించి క్షీరాన్నముగజేసి తినుటయుగలదు. ఉదల రసానునసంఘట్ట నము 2 వ అనుబంధము A. లో దెలుపబడెను. అందలి యంకెలనుబట్టి ఉదలు మొత్తపు పౌష్టికశక్తి విషయముననేమి, మాంసకృత్తుల పరిమితిలోనైననేమి తక్కిన తృణభాగ్య జాతులకంటె సారహీనమనితేలును. కావున నీవి నితరగింజలు దొరకకపోయినపుడు బీదలుగూత్రమే ఆహారముగ గైకొను చుందురు. ఉదలు శరమ ఉడికించి పశువులకు చాణాగా వేయబడుచుండును.

ఉదగడ్డిని పశువులు బాగుగదిరును. కాని దీనియందలి సారమును దెలుపుఅంకెలు లభింపలేదు. ఉదను పశువులమేత కొరకు ప్రత్యేకముగజెంచి నెన్నులు పూర్తిగ ముదరకముందు మేవుచో సత్తువచేయును. ఈవిషయమయి పశువులమేత సస్యములను గురించిన గ్రంథమున వివరముగ వ్రాయబడును.

# ది స క

Brachiarla ramosa

ఆగవము-పొలపుల్, కంబన్ పుల్; కన్నడము-బెన్నె అక్కి-హుల్లు  
లేక కా-బరగుహుల్లు

చరిత్ర, వ్యాపకము

దిసక యనునది చెన్నపురిరాజధానిలో కొన్నిచోట్ల సాగు పొలములందు కలుపుమొక్కగ గాననగు తృణధాన్యజాతి. కొన్నిచోట్ల నిది ఈదురుగడ్డి, ఆండకొర్రయనుపేళ్ళతో గూడ వ్యవహరింపబడుచున్నది. ఆంధ్రదేశమునను, మైసూరు రాష్ట్రమునను నిది కొన్నిచోట్ల ప్రత్యేకముగ గింజలకొరకు సాగుచేయబడుచున్నది. దిసక మొక్క చరిత్రను శాస్త్రజ్ఞులెవ్వరును పరిశీలించినట్లు గానరాదు. ఇండియాలోని యితర రాష్ట్రములందుగాని విదేశములందుగాని యిది సాగునందున్నట్లు కానరాదు. ఆంధ్రదేశమునందైనను నీతృణధాన్యజాతి సాగునందున్న విషయము చాలమందికి దెలియదు.

లేఖరి దీనిని మొదట 1918 వ సంవత్సరమున విశాఖ పట్నం తాలూకాలో అన్నమరాజుపేటయను గ్రామమున సాగునందు చూచెను. పిమ్మట మరి 20 సంవత్సరములకు దీనిని విశాఖపట్నం సమీపమున నెల్లూరు అను గ్రామమున మరల సాగునందు గనుగొని యపుడు కొన్ని మొక్కలను కోయంబత్తూరుపంపి దాని శాస్త్రీయనామము గనుగొనెను.

ఇటీవల దీనినిగూర్చిన కొన్ని విషయములు కోయంబత్తూరు నందు పృథ్విశాస్త్రజ్ఞులుగనున్న శ్రీ కె. సి. కెకోబ్ గారు చెన్నపురి వ్యవసాయపత్రికయందు ప్రచురించయుండిరి. 51 ఇది అనంతపురంజిల్లాలోని మడకసిర తాలూకాలో నుమూరు 8000 ఎకరములపైనను, మైసూరులోను, తుమ్మనూరుజిల్లాలో 2000 ఎకరములపైనను సాగునందున్నట్లు లెక్కవేయబడెను. విశాఖపట్నంజిల్లాలోని విస్తీర్ణము తెలియదు, కాని నెల్లూరు గ్రామమందు 6 ఎకరములు మాత్రము సాగునందుండునని యంచనా వేయబడెను.

### ది సె కెయిక్కు ముఖ్యలక్షణములు

దినక ముక్క వన్యస్థితిలో తరచు బహున్నార్థకముగ బెరుగుజాతి. భూమిలో గరికవలె బ్రాహ్మణ కాండములనుండి తొలకరిలో మొలకలు బయలుదేరి పెరుగుచుండును. కాని సేవ్యమునం దేలేట విత్తులనుజల్లికూడ పెంచబడుచున్నది. దుబ్బలు 1-2 అడుగులు యెత్తువర కేదుగును. పై కణుపుల నుండిగూడ పిల్కలు బయలుదేగును.

ఆకులు తక్కిన తృణధాన్యజాతులలోకంటె కరువగ నుండును. బాగుగ నెదిగినదాని తొడిమ నుమూరు 2-3 అంగుళముల పొడవుండును. లేకు 5-6 అంగుళముల పొడవువర కుండును. వెడల్పు 3 అంగుళమువరకుండవచ్చును. ఆకు తొడి ములును లేకులునుగూడ రోమకళ గలిగిగాని లేకగాని యుండవచ్చును.

సెన్ను వరిగ వెన్నునుబోలి పెక్కు రెల్లలు గలిగి యుండును. బాగుగ నెదిగిన నుమారు 6 అంగుళముల పొడవు వరకుండును. తరచు పొట్టలోనుండి పూర్తిగ పైకిరాదు. అల్ప కణిశములు  $\frac{1}{10}$ - $\frac{1}{8}$  అంగుళము పొడవుగలిగి

21 వ పటము యుండును. సామాన్యముగ కాడలేని దొక టియు, కాడగల దొకటియు జంటగా బయలుదేరును. 1 వ (క్రింది) తుషము కంటె పై మూడును పెద్దవి. పూవు నాల్గవ తుషమునకును దాని సంగలోని బుసమున కును మధ్యనుండును. గింజలు ఊదగింజలను బోలి యాసైజుననే యుండును.



దీపక-మొక్క  
( $\frac{1}{5}$  పైజా)

సాగునకుదగినపరిస్థితులు, నేవ్యవిధానము

దీపక సముద్రమట్టమునుండి 2000 అడు

గుల యున్న తమువరకుగల ప్రదేశములందు

పెరుగుచున్నది. విశాఖపట్నపు జిల్లాలో నిది యినుకకొడి యెర్రనేలలలోను, గరుపనేలలందును సాగుచేయబడుచున్నది. సామాన్యముగ నిది జూన్-ఆగష్టు నెలలందు మొదటిపంటగ గాని యాకాలమున మరియొక సస్యమును సాగుచేసికొనిన వెనుక అనగా సెప్టెంబరు-అక్టోబరు నెలలలో రెండవపంటగ గాని సాగుచేయబడుచుండును. సుమారు 3 నెలలలోపుననే కోతకువచ్చును.

దీని ఊదకువలెనే మెట్టపంటగ సాగుచేయవచ్చును. ఎకరమునకు 6-8 సేర్ల విత్తులు చల్లవచ్చును. సుమారు 300-500 పొనులగింజలు కావచ్చును. గడ్డి  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$  బండి కావచ్చును.



## ఉపయోగము

దీనకలను పొట్టుబోవునట్లు దంపి చోళ్ళతోగలిపి యంబ  
లిగా గాని సంకటిగగాని చేసి భుజింతురు. రొట్టెగగాల్చి తిను  
టయు గలదు. విశాఖపట్నపు ప్రాంతములందలి మహమ్మ  
దీయుల కీరొట్టె ప్రీతియగుటచే వారలీ గింజలను పండించిన  
రైతులనుండి కొంత హెచ్చు వెలపెట్టి కొందురు. దీనకలు  
చామలకంటెను, ఊదలకంటెను హెచ్చు ఆహారయోగ్యము  
లుగ నెంచబడుచున్నవి. కాని వీనిసంఘట్టనము పరీక్షింప  
బడినట్లు గానరాదు. దీనకలను దంపినపుడు ఊదలలోకంటెను  
పొట్టు హెచ్చుగబోవును. కొలతకు కుంచమునకు శి తవ్వ  
లును, తూనికకు 40 పంతులునుమాత్రమే పొట్టులేనిబియ్యము  
విగులడియగును.

# గొలుగు లేక గొలివె

Job's tears. Coix gigantea (D. lachryma jobi)

చరిత్ర, వ్యాపకము

సామాన్యముగ నీతృణధాన్యజాతి గొలుగుఅని వ్యవహరింపబడుచున్నను, 'గొలివె' అనునది దీనికి సరియైనపేరు. పరిచేలలో కలుపుగా పెరుగుచుండును. ఈమొక్కల గింజలు కొన్నిచోట్ల బీదలచే నాహారముగ నుపయోగింపబడుచున్నవి. కొన్నిచోట్ల గింజలకొర కీసస్వము బ్రత్యేకముగ నెంచబడుటయు గలదు.

గొలుగున కిండియాయె యాదినుస్థానముగ నెంచబడుచున్నది. ఇది యిపుడు వన్యస్థితిలో నన్ని రాష్ట్రములందు గాననగును. బర్మా, చీనా, జపాన్, ఫిలిప్పైన్ దీవులందుగూడ నిది చాలచోట్ల గలదు.

మొక్కయొక్క లక్షణములు

గొలుగుమొక్క నుమారు 3-8 అడుగుల యెత్తువరకు నెదుగు మోటయిన ఏకవార్షికము. పరిచేలు ఫలించుసరి కంత కంటె నెత్తుగ నెదిగి పూచి కాయనారంభించుటచే నీమొక్కలను సులభముగ గుర్తింపవచ్చును. పరివలెనే యిదియు సామాన్యముగ 4-5 పిల్కలనుబెట్టును. అందుగ 50 పిల్కల వరకు బెట్టి బాగుగ దుబ్బుచేయును. పై కణుపులనుండికూడ

శాఖలును, ఉపశాఖలును బయలుదేరును. కాండము గుండ్రముగ నుండును. లోన జొన్నకగ్గివలె బెండుదేరి యుండును.

ఆకులు పరిగోకంటె వెడల్పుగ  
 22 వ పటము నుండును. సెన్నులు (కణిశములు) కాండముల చుట్టము, ఆకు పంగలలోనుగూడ బయలుదేరును. కణిశములతో ఆడుపూవు మాత్రమే గల యల్పకణిశమొకటి క్రిందుగ నుండును. దీని నావరించి యుండు చేటికాకొశము పై కొననుండి మగపూవులుండు యల్పకణిశముల గుత్తులు గల సన్ననికాడ వెలువడియుండును. ఈయల్పకణిశములు రెండేసి మూడేసి యొక్కొక గుత్తిగ కణిశపు కాడపై సమరియుండును. ఇందొకటి తొడిమలేకయు, లేకైన యొకటి రెండును తొడిమగలిగియు నుండును. మగపూవుండు యల్పకణిశమునందలి నాలుగుతువములలో క్రిందివి రెండును కొంచె మించుమించు సమముగనుండును. మూడవ నాలుగవ తువముల పంగలలో



గొలుగువెన్ను  
 (పూర్ణాకృతి)

పూవుండుటగాని, లేకుండుటగాని కలదు. పూవులో రెండు ఉన్నద్రీకములును, మూడు కింజల్కములును ఉండును. ఆడు అల్పకణిశములోని తువములలో నాలుగవదాని పంగలో బుసమును, ఆడుపూవును నుండును. ఇందొక యండాశయమును చానిపై రెండు కీలములును నుండును. మూడు గొడ్డువోయిన

కింజల్కములుకూడ నామావశిష్టముగ నుండును. ఉన్నద్రీ కము లుండవు <sup>క<sup>2</sup></sup>. కాయ ప్రత్తిగింజ యాకారముగలిగి దాని కంటె స్ఫుటముగనుండును. పెంకుగట్టి నిగనిగలాడుచు నున్నగ నుండు చేటి కాకోశముచే నావరింపబడి యుండుటచే దంతపు పూసలవలె కఠిరయ్యుచుండును. దీనినే మనము సామాన్య ముగ గొలుగుగింజయని యనుచుందుము.

గొలుగులో పైని వర్ణింపబడిన సామాన్యపు జాతిగాక ముంపుడుప్రదేశములందు చురుకుగ నెదిగి నీటిపై దేలుచుండు జాతి (*Cix aquatica*) కూడ యొకటిగలదు.

సామాన్యపు గొలుగు ఉష్ణప్రదేశము లందును, యిండుక శీతలప్రదేశములందునుకూడ పైరిగును. బలమయిన వండలినేలలు దీని కనుకూలములు.

వరిమళ్లలో నీగింజలు విత్తులతోగలిసి ప్రవేశించు నెడల వరిచేనిని గోయకముందే గింజలు రాలుటచేతను, రానితో నీదుబ్బులు తెగినను మరల క్రిందినుండి పుట్టు పిల్లలందు గింజలు మెండుగ బుట్టుటచేతను నీజాతి మిగుల శీఘ్రముగ వ్యాపించును. చెన్నువేసిపచ్చుట దీనిని గుర్తించి వేళ్ళలోనికి లాగివేసినగాని సశింపదు. విత్తులమూలమున నిదిమరల తేరకుండ చూచుటయు నావశ్యకము.

గొలుగు బాగుగపెరుగు వరిమళ్ళు సహజముగ సత్తువ గల వగుటచే నాచు వరిపంటయు బాగుగనుండును. కావున కొందరు వ్యవసాయదారులు తమ వరిచేలలో నీగొలుగు పెరుగుట శుభసూచకమని నమ్మి దీనిని సశింపుజేయుటకు దగినశ్రద్ధ వహింపదు. దీనిని సశింపుచేసినచో వరిపంట మరింతపొచ్చు

ననుటకు సందేహములేదు. కొందరి దుబ్బుల నప్పు డప్పుడు గోసి పశువులకు మేతగ నుపయోగించుచుండు నుద్దేశముతో వానిని నశింపుచేయుకుందురు.

గింజలను మానవాహారముగ నుపయోగించుట ఆంధ్ర దేశమున గానరాదు. కాని మధ్యరాష్ట్రములందును, వంగ దేశమునందును, అస్సాము, సిక్కిమ్ మొదలగు కొన్ని ప్రదేశములందును బీద లీ గింజలనుదిన బ్రతుకుచున్నారు. చీనా, జపాను, ఫిలిప్పైన్ దీవులలోగూడ నీగింజ లాహారముగ నుపయోగింపబడుచున్నవి. సింహళమున నిది గొంతవరకు వరి బియ్యమునకు బడులుగ నుపయోగింపబడుచున్నది. ఇందు గోధుమలోకంబెను, వరిబి.చ్యుఘులోకంబెను హెచ్చు మాంసకృత్తులు, చమురును గలవని తెలిసికొనబడెను.<sup>58</sup>

గొలుగుగింజలను వాని పై పెంకుపోవునట్లు తిరుగటితో విసరి లోని బియ్యమునుదీసి యన్నముగవండి తిందురు. స్వతస్సిద్ధముగ బెరుగు మొక్కలనుండి గింజల తూనికపై నూటికి 25 వంతులు నూత్రము బియ్యము దిగుబడియగును. నూటికి 75 వరకు దిగుబడియగు రకములు చీనా మొదలగు దేశములందు సాగునందు గలవని తెలియుచున్నది.

గొలుగుఅన్నము తీయగను, హృద్యముగనునుండును, కొన్ని రకముల గింజలలో నొకవిధమగు నుషాసన కూడ యుండునట. గొలుగుబియ్యమును పిండిగవిసరి రొట్టెగగాల్చి తిందురు. ఈగింజలను వేచి పేలాలుగజేసి తినుటయు, అటుకులు గొట్టి తినుటయు, బియ్యమును అటుకులను వేచి తినుటయు గలదు, జపానులో గింజలను మొలకకట్టి మాట్టును

దయారు చేసి మండనముగానిచ్చి బట్టిపట్టి యొకవిధమగు సారాయము (Beer)ను దయారు చేసి యుపయోగింతురు.

సింహళమున దీని నీ క్రిందివిధమున సాగుచేయుట యనుకూలముగ గనిపెట్టబడెను. నేలను బాగుగ దున్నిగాని త్రవ్వగాని బాగుగజీకిన పశువులయెరువు తగినంతవేసి బలవరచ వలెను.  $2 \times 2$  లేక  $2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$  అడుగులదూరమున నొక్కొక చోట మూడు నాలుగు గింజలను 1 అంగుళములోతున నాటి మంటిచే కప్పవలెను. ఎకరము 1కి 6-10 పౌనుల విత్తులు పట్టును. మొలచినవెనుక రెండేసి మొక్కలనునూత్ర ముంచి తక్కిన వానిని దీసివేయవలెను. ఇట్లు సాగుచేసిన చేను సుమారు 5 అడుగుల యెత్తెదిగి రకమునుబట్టియు, పరిస్థితులను బట్టియు 4-5 నెలలలో ఫలించును. ఎకరమునకు 320 = 600 కుంచములు లేక 2000-4000 పౌనుల (40-75 బుష్సెలుల) గింజలవర కగును. <sup>53</sup>

ఒకయెకరమున సాగునకగు వ్యయము సుమారు 5కి రూపాయలవరకును, రాబడి 76 రూపాయలవరకును ఉండునని యంచనావేయబడెను.

దంతపుపూసలవలెనుండు యీగింజల పైపొర గట్టిగ నుండుటచే నివి చాల సంవత్సరములు నిల్వయుంచబడినను పుచ్చపు. వానిపై మెరుగుచెడదు. కావున నీగింజలను పూసలకు బదులుగ దండలుగగుచ్చి కంతాభరణములుగ నుపయోగించుటయు, వీనితో నితరాలంకారములను దయారు చేయుటయు గలదు. వీనితో పూలసజ్జలను, వివిధాకృతుల బుట్టలను దయారుచేయుట గలదు.

# వెదురు

Bamboo-Bambusa arundanacea

అడవిము - నూరికెల్; సంస్కృతము - చంక

## చరిత్ర, వ్యాపకము

అడవులలో బెరుగు బహుశక్తిక జాతియగు వెదురు పొదలు పెక్కు (నుమారు అరువది) సంవత్సరములకొకసారి తెల్లజొన్న వెన్నులవంటి రింజునెన్నులనువేసి మానవాహారముగ నుపయోగించు ధాన్యమునొసగును. వెదురుధాన్యము నివారిధాన్యమువలె రాలిపోవు స్వభావము గలిగియుండుటచే పొదలచుట్టును శుభ్రముచేసి రాలినగింజలను తుడిచి తీసికొందురు. గోధుమలనుబోలియుండు నీ గింజలను పైతుషములు పోవునట్లు దుపినచో లోనిబియ్యము గోధుమవర్ణము గలిగిన సన్నధాన్యమును బోలియుండును. అన్నము వరియన్నము కంటె బిరుసుగనుండును. అడవులలో నివసించువారు లభించినపుడెల్ల నీగింజలను జాగ్రత్త పెట్టుకొని యుపయోగించుచుందురు. బాగుగ నుడికించినను బిరుసుగ నుండుటచే నీబియ్యము చిత్రాన్నము (పులిహార)కు అనుకూలము. సన్నముగ నుండుటచే క్షీరాన్నమునకుగూడ బ్రశస్తముగ నెంచబడుచున్నది. మరియు నీబియ్యము వరిబియ్యము నుపయోగించు సన్నివిధములుగను నుపయోగింపదగియున్నది.

వెదురుబియ్యపు సంఘట్టనము 1-A అనుబంధమున  
తెలుపబడెను. ఇందు వరిబియ్యములోకంటే మాంసకృత్తులు  
హెచ్చు. కర్బనోదజనితములు తక్కువ. కావున వెదురు  
బియ్యము కొంచె మించుమించు గోధుమలతో సమానమగు  
సంఘట్టనమును గలిగియుండునని చెప్పవచ్చును.



# 1 వ అనుబంధము

## (1) అభివృద్ధికర జొన్న వంగడములు

1. హెచ్. 1 జొన్న: ఇది హగరి వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానము నందు బల్లారి ప్రాంతమునందలి తెల్లజొన్న రకములనుండి ఎంచి తీయబడినది. తర్లపాతము తక్కువగ నుండు బల్లారి, అసంతపురం, కర్నూలు జిల్లాల కృష్ణరేవడి భూములకు మిక్కిలి అనుగుణ్యమైన వంగడము. దంటు రసయుతము. కాలపరిమితి 4½ నెలలు. గుండ్రపు గట్టి ముద్ద చెన్ను. గింజలు తెల్లటి ముత్యపువన్నె. రాలిక 250-300 పౌనులు.

2. యం. 47-3 (బొంబాయిజొన్న): హగరి క్షేత్రమునందు పరిశ్రీంపబడి, బల్లారి ప్రాంతపు తేలిక నల్లరేగడి భూములకు అనుకూలమయిన వంగడము అని తేలినది. వరపునకు తట్టుకొను వంగడము. దంటు రసయుతము. కాలపరిమితి 4 నెలలు. చెన్ను పొడవుగా నుండి జల్లిగానుండును. గింజలు తెల్లముత్యపు వన్నెగలిగి పెద్దగా నుండును. రాలిక 300-400 పౌనులు.

3. యన్. 1 జొన్న: ఇది సంద్యాల వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానము నందు చెరుకుపచ్చ జొన్న రకమునుండి ఏర్పిరితయబడినది. సంద్యాల, కర్నూలు, బనగానిపల్లె, కోయిలకుంట్ల, ఆళ్లగడ్డ, జమ్మలమడుగు, వులివెండల, తాడిపత్రి తాలూకాలలో చెరుకుపచ్చ జొన్న ప్రాంతమునకు చాల అనుకూలమైనది. దంటు రసయుతము. పశువులమేతకు శ్రేష్ఠమైనది. కాలపరిమితి 115 రోజులు. చెన్ను పొడవుగ న్నూపా కారముగ నుండును. గింజలు లావుగ పచ్చని వన్నెగలిగియుండును. రాలిక 600-800 పౌనులు.

4. యన్. 2 జొన్న: ఇది సంద్యాల క్షేత్రమున ఎంచి తీయబడిన గుండుపచ్చజొన్న రకపు వంగడము. కర్నూలు, నందికొట్కూరు, ఆత్మకూరు తాలూకాలకు అనుకూలమైనది. దంటు రసయుతము. కాల

హామితి 120 రోజులు. వెన్ను గుండ్రముగ ముద్దగానుండును. గింజ వన్నె పసుపుపచ్చ. రాలిక 800-1000 పౌనులు.

5. యన్. 3 జొన్న: సంధ్యాలక్షేత్రమునందు ఊలపచ్చజొన్న రకము నుండి ఏర్పి తీయబడినది. ప్రొద్దుటూరు తాలూకాకు అనుకూలమైనది. దంటు ఊల (రసహీనము). కాలపరిమితి 115 రోజులు. వెన్ను పొడవుగా ముద్దగానుండును. గింజ పసుపువర్ణముగలిగి పెద్దగా నుండును. రాలిక 600-800 పౌనులు.

6. యన్. 4 జొన్న: సంధ్యాలక్షేత్రమునందు ఊల పచ్చజొన్న రకము నుండి ఏర్పి తీయబడినది. ప్రొద్దుటూరు తాలూకాకు అనుకూలమైనది. దంటు ఊల. కాలపరిమితి 120 దినములు. గుండ్రపు గట్టి ముద్దవెన్ను. గింజలు పసుపువర్ణము. రాలిక 600-800 పౌనులు.

7. యన్. 5 జొన్న: సంధ్యాలక్షేత్రమునందు ఊల పచ్చజొన్న రకము నుండి ఏర్పి తీయబడినది. కడపతాలూకాకు అనుకూలమైనది. దంటు ఊల. కాలపరిమితి 115 రోజులు. గుండ్రపు గట్టి ముద్దవెన్ను. గింజలు పసుపువర్ణము. రాలిక 600-800 పౌనులు.

8. యన్. 6 జొన్న: సంధ్యాలక్షేత్రమునందు ఊలపచ్చజొన్న రకము నుండి ఎరిచి తీయబడినది. ఆల్లగడ్డతాలూకాలోని చాగలమర్రిప్రాంతమునకు అనుకూలమయినది. దంటు ఊల. కాలపరిమితి 115 రోజులు. గుండ్రపు గట్టి ముద్దవెన్ను. గింజలు పసుపువర్ణము. రాలిక 600-800 పౌనులు.

9. యన్. 7 జొన్న: సంధ్యాలక్షేత్రమునందు గుండుపచ్చజొన్న రకమునుండి ఏర్పి తీయబడినది. సంధ్యాలతాలూకా పోలూరు, బలహనూరు పరిసరములలోనున్న కొన్ని గ్రామములకు అనుకూలమయినది. దంటు రసయుతము. కాలపరిమితి 115 రోజులు. గుండ్రపు గట్టి ముద్దవెన్ను. గింజలు పసుపువర్ణము. రాలిక 800-1000 పౌనులు.

10. యన్. 8 జొన్న: సంధ్యాలక్షేత్రమునందు ఊల పచ్చజొన్న రకమునుండి ఏర్పి తీయబడినది. పులివెందుల తాలూకాలో ఊల పచ్చజొన్న రకమును పండించుప్రాంతములకు అనుకూలమయినది.

దంటు గోల. కాలపరిమితి 115 రోజులు. పొడవైన ముద్దకంకి. నల్ల బొంత. గింజలు పసుపువర్ణము. రాలిక 600-800 పొనులు.

11. యన్. 9 జొన్న: సంద్యాల క్షేత్రమునందు చెరుకుపచ్చజొన్న రకమునుండి ఎంచి తీయబడినది. పులిచెందల తాలూకాలో చెరుకు పచ్చజొన్న పండించు పద్దేశములకు అనుకూలమైనది. దంటు రస యుతము. కాలపరిమితి 115 రోజులు. గుండ్రపు గట్టి ముద్దివెన్ను. గింజలు పసుపువర్ణము. రాలిక 600-800 పొనులు.

12. యన్. 10 జొన్న: సంద్యాల క్షేత్రమునందు ముంగారి పచ్చ జొన్న రకమునుండి ఏర్పడినది. దోబాచలం తాలూకాలోని కొన్ని పద్దేశములకు అనుకూలమైనదని పరీక్షల ఫలితముగా తేలివది. దంటు రసహీనము. కాలపరిమితి 110 రోజులు. కంకి పొడవుగా నుండి కొంచెము ముద్దగా నుండును. గింజలు పసుపు వర్ణము. రాలిక 600-800 పొనులు.

13. యన్. 11 జొన్న: సంద్యాల క్షేత్రమునందు ముంగారి పచ్చ జొన్న రకమునుండి ఎంచి తీయబడినది. దోబాచలము, ప్రత్తికొండ తాలూకాలలోని కొన్ని పద్దేశములకు అనుకూలమైనదని తేలివది. దంటు రసయుతము. కాలపరిమితి 110 రోజులు. కంకి పొడవుగా నుండి కొంచెము ముద్దగా నుండును. గింజలు పసుపు వర్ణము. రాలిక 600-800 పొనులు.

14. యన్. 12 జొన్న: ఇదికూడ సంద్యాల క్షేత్రమునందు ముంగారి పచ్చజొన్న రకమునుండి ఏర్పడినది. దోబాచలం తాలూకా లోను, అనంతపురం, ధర్మవరం, కల్యాణదుర్గము, ఉరవకొండ తాలూకాలలోని ఎర్రనేలలకు, గరుపనేలలకు అనుకూలమైనదని తేలివది. దంటు రసహీనము. కాలపరిమితి 110 రోజులు. వెన్ను ముద్దగను, స్థూపాకారముగను యుండును. గింజలు పసుపువర్ణము. రాలిక 600-800 పొనులు.

15. జి. 1 జొన్న: ఇది గుంటూరు వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానము నందు గుంటూరు వైరుజొన్న రకమునుండి ఎంచి తీయబడినది.

గుంటూరు తాలూకాకు పయర కారునకు అనుకూలమైనది. దీనిని పశువులమేతకు తొలకరిలో వేయదురు. దంటు ఊల. కాలపరిమితి 115 రోజులు. గింజలు పనుపువర్ణము. రాలిక 800-1000 పౌనులు.

16. జి. 2 జొన్న: గుంటూరు శ్రేణిమునందు పయరజొన్న రకము నుండి ఏర్పి తీయబడినది. గుంటూరు, నర్సరావుపేట తాలూకాలలో పయర కారునకు అనుకూలమైనది. కాలపరిమితి 115 రోజులు. దంటు ఊల. రింజ వెన్ను. గింజలు పనుపువర్ణము. రాలిక 1200-1500 పౌనులు.

17. జి. 3 జొన్న: గుంటూరు శ్రేణిమునందు బుద్ధ గిద్ద జొన్న రకము నుండి ఎంచి తీయబడినది. సత్తెవపల్లి, పల్నాడు, వినుకొండ తాలూకాలలోని గరపనేలలకు పునాసకారునకు అనుకూలమైనది. దంటు ఊల. కాలపరిమితి 3 నెలలు. రింజ వెన్ను. గింజలు మట్టి చాయతో కూడిన పనుపు వర్ణము. రాలిక 1000 పౌనులు.

18. జి. 4 జొన్న: గుంటూరు శ్రేణిమునందు ఎర్రజొన్న రకమునుండి ఎంచి తీయబడినది. సత్తెవపల్లి, పల్నాడు, వినుకొండ తాలూకాలలోని గరపనేలలకు పునాసకారునకు అనుకూలమైనది. కాలపరిమితి 85 రోజులు. జి. 3 వంగడముకన్న వారము దినములు ముందుగనే కోతకువచ్చును. పైరు ఎదుగు కాలమునందు వర్షములు కురవని యెడల యీ వంగడమును ముఖ్యముగ నుపయోగించెదరు. దంటు ఊల. ముద్దకంకి. గింజలు ఎరుపువర్ణము. రాలిక 800 పౌనులు.

19. ఎ. కె. పి. 1 జొన్న: ఇది అనకాపల్లి వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానమునందు సాగులోనున్న పచ్చజొన్న రకమునుండి ఏర్పి తీయబడినది ఇది తూర్పు గోదావరి, విశాఖపట్నం జిల్లాలకు పశుగ్రాసమునకు అనుకూలమైనది. మంచిగింజ రాలికనిచ్చు వంగడము. కాల పరిమితి 4 నెలలు. సామాన్యపు ముద్దకంకి. గింజలు పనుపు వర్ణము. రాలిక 1200-1500 పౌనులు.

20. ఎ. కె. పి. 2 జొన్న: అనకాపల్లి శ్రేణిమునందు కొండ జొన్న రకమునుండి ఎంచి తీయబడినది. విశాఖపట్టణము, శ్రీకాకుళం జిల్లాలయందు కొండపొదేశములకు అనుకూలమయినది, దంటు ఊల.

కాలపరిమితి 4 నెలలు, రింజవెన్ను, గింజలు సుత్యపు తెలుపువర్ణము, రాలిక 1000-1200 పౌనులు.

21. ఎ. కె. పి. 3 బొన్న: ఇది కూడ అనకాపల్లి శ్రీశ్రీమునందు స్థానిక పచ్చబొన్న గకమునకు, వంద్యాల్ గకమునకు సంబంధముచేసి తీయబడినది. ఇది తూర్పుగో. వావరి, విశాఖపట్టణము జిల్లాలకు పశు గ్రామమునకు అనుకూలమయినది. దంటు రసముకము. కాలపరిమితి 4 నెలలు, ముద్ద వెన్ను, గింజలు పసుపువర్ణము, రాలిక 800 పౌనులు. పశు గ్రామపు వైరునకు పనికివచ్చును.

22. కో. 2 బొన్న: ఇది కోయంబత్తూరు చిరుధాన్య పరిశోధన కేంద్రమునందు ఏర్పి తీయబడినది చిత్తూరు జిల్లా, ఈందు మెట్టపైరునకు అనుకూలమయినదని పరీక్షల ఫలితముగ జేసినది. కాలపరిమితి 5 నెలలు, దంటు ఊల, రింజవెన్ను, గింజలు తెలుపువర్ణము రాలిక 600-800 పౌనులు.

## (2) అభివృద్ధికర సజ్జ (గంపె) వంగడములు

1. ఎ. కె. పి. 1 సజ్జ: ఇది అనకాపల్లి వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానమునందు రుద్రాక్షగంపెనుండి ఏర్పి తీయబడినది. విశాఖపట్టణము, శ్రీకాకుళం జిల్లాలలో వరిపైరుకుముందుగ పునాసలో నాలువేతను పండించుటకు అనుకూలమయిన వంగడము. పైరు పడిపోకుండా బాగుగా ఎదిగి విరివిగా పలవలుబెట్టి దుబ్బుచేయుచాతి. వెన్ను సామాన్యపు పొడుగు. మొదలు లావుగానుండి చిగురుకు సన్నబడియుండి గట్టిగా ఉండును. కాలపరిమితి. 90 రోజులు, రాలిక 1400-1500 పౌనులు, కాలమానము అనుకూలముగ నున్న చురుచి పంటనిచ్చును.

2. ఎ. కె. పి. 2 సజ్జ: అనకాపల్లి శ్రీశ్రీములో పెద్దగంపెనుండి ఎంచి తీయబడినది. విశాఖపట్టణము, శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు పనికివచ్చును. మెట్టభూములకు అనుకూలము. సామాన్యముగ దుబ్బుగట్టి ఎక్కువ పెరుగుదల గల చాతి. సామాన్యపు గట్టివెన్ను. వెన్ను పెద్దది. గింజలు ఊరుపుగానుండును. కాలపరిమితి 95 రోజులు, రాలిక 1500-1600 పౌనులు. వరపుకుతట్టుకొని పంటనిచ్చును.

2. ఎ. కె. పి. కె. సజ్జ: అనకాపల్లి క్షేత్రములో పూనాగంటె నుండి ఏర్పితీయబడినది. వికాఖ పట్టణము, శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు ఉపయుక్తము. సామాన్యపుష్పము. నాలుగైదు పలవలతో దుబ్బుకట్టును. సామాన్యపు పొడుగుగల గట్టి వెన్ను. గింజలు సామాన్యపుటురువుగలవి. కాలపరిమితి 95 రోజులు. ఆతివృష్టి అనావృష్టులకు పాటింపక కాలభేదము లేకుండా పండును. రాలిక 1250 పానులు.

### (3) అభివృద్ధికర రాగి (చోడి) వంగడములు

1. హెచ్. 1 రాగి: ఇది హగరి వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానమునందు కోయంబత్తూరు 1 నెంబరు రాగిపంటయందు. స్వాభావికపు తారతమ్యముగల మొక్కగా మొదట ఎన్నుకోబడి తదుపరి వృద్ధిచేయబడినది. ఆనంతపురం, కడప, నెల్లూరు జిల్లాలయందు నీటివసతి బాగుగ నున్న పొంతములకు అనుకూలమైనది పెద్ద ముద్దవెన్ను. బాగుగ దుబ్బు చేయును. కాలపరిమితి  $4\frac{1}{2}$  నెలలు. తెల్లవోడి యగుటచే మొక్కయందు ఎచటను ఊచారంగు కనబడదు. గింజ పెద్దది. రాలిక 2,000-3000 పానులు.
2. కో. 1 రాగి: ఇది కోయంబత్తూరు చిరుధాన్య పరిశోధన కేంద్రము నందు సేలంజిల్లా రాశిపురం పొంతములో సాగునందున్న 'గిడ్డ ఆర్యన్' రకమునుండి ఏర్పి తీయబడినది. ఆనంతపురం జిల్లాయందు నీటివసతి బాగుగానున్న పొంతములకు అనుకూలమైనది. చిత్తూరు జిల్లాయందు మెట్టపైరుగ వైరుచేయుదురు. బాగుగా దుబ్బు కట్టి ఏపుగా పెరుగును. వెన్ను పెద్దది. వేళ్ళ చివళ్ళుమాత్రము లోనికి వంగి యుండును. రాలిక 2000-3000 పానులు.
3. కో. 2 రాగి: కోయంబత్తూరు చిరుధాన్య పరిశోధన కేంద్రము నందు, కోయంబత్తూరు జిల్లా ఉడుమలపేట పొంతపు 'మట్టి' రాగి రకమునుండి ఏర్పి తీయబడినది. ఆనంతపురం జిల్లా కదిరి, పెను కొండ, హిందూపురం, ధర్మవరం, ఆనంతపురం తాలూకాలయందు చెరువులు, బావులు నీటి ఆధారమున పండించు తోటభూములకు పయ్యర కాయవకు అనుకూలమైనది. తెల్లవోడి యగుటచే మొక్క

యందెవటను ఊదారంగు కనబడదు కాలపరిమితి 110 రోజులు,  
చిన్న గింజలుగల ముద్దవెన్ను. రాలిక 2000 పానులు.

4. కో. రి రాగి: కో. నుంబ్రూరు చిరుధాన్య కేంద్రమునందు వీర్చి  
తీయబడినది. అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాలయందు నీటివసతియున్న  
తోటధూనులలో పయనకారులగు పైగుచేయుటకు అనుకూలమై  
నది. తెల్లవోడి ముగుటచే మొక్క, యందెవటను ఊదారంగు కన  
బడదు. వెన్ను ఆకారము కో. 1 వలెపండి వేళ్ళు చివరలుమాత్రము  
లోనికి వంగియుండును కాలపరిమితి 110 రోజులు. గింజపెద్దది.  
రాలిక 2000 పానులు.

5. ఎ. కె. సి. 1 రాగి: అనకాపల్లి వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానము  
నగు, విజయనగరం తాలూకా ముయిద గ్రామపు పునాస(బురద)  
చోడి రకమునూడి వీర్చి తీయబడినది. అతి త్వరితముగా ఫలితము  
నిచ్చు వంగడము. కాలపరిమితి 90 రోజులు. మొక్కయందెవటను  
ఊదారంగు కనబడదు. బాగుగా దుబ్బుచేయును స్వభావముకూడి, చిన్న  
గింజలుగల ముద్దవెన్ను. రాలిక 1500-2000 పానులు.

6. ఎ. కె. పి. 2 రాగి: అనకాపల్లి క్షేత్రమునందు పునాస (బురద)  
రకమునూడి వీర్చి తీయబడినది. విశాఖపట్టణము, శ్రీకాకుళం జిల్లా  
లకు పునాసకారులకు అనుకూలమైనది. కాలపరిమితి 85 రోజులు.  
మొక్కయందెవటను ఊదారంగు కనబడదు. పెద్ద ముద్ద వెన్ను.  
బాగుగా దుబ్బుచేయును. గింజ పెద్దది. రాలిక 2000-2500 పానులు.

7. ఎ. కె. పి. 6 రాగి: అనకాపల్లి క్షేత్రమునగు పెద్దవోడి రకము  
నూడి వీర్చి తీయబడినది. విశాఖపట్టణము, శ్రీకాకుళం జిల్లాల  
యందు సాలువేలికు, మెట్టసేద్యమునకు అనుకూలమైన వంగడము.  
విశాఖపట్టణము జిల్లాలో పయనకారుల నీటివసతికిందకూడ పండి  
పంటనిచ్చును. ఇటీవల గురుపగడిన పరీక్షలలో అనంతపురం,  
కర్నూలు జిల్లాలయందు మొదటి పంటకాలమునకు అనగా జూన్-  
జూలై మాసములలో వేయుటకు అనుకూలమైనదని తేలినది. వల్ల  
చోడి రకముగుటచే ఊదారంగు మొక్క ఆకుల చివరలయందును,

కాండమున కణాఫులయందును, వెన్ను కింజల్కములందును, కీలములందును కానవగును. పెద్దముద్దవెన్ను. గింజలు పెద్దవి కాలపరిమితి 105 రోజులు. రాలిక మిట్టను 1200 పౌనులు, నీటి వసతిని 2,000 పౌనులు.

8. ఎ. కె. పి. 7 రాగి: అనకాపల్లి క్షేత్రమునందు పెద్ద పంటరకము నుండి వీర్చి తీయబడినది. విశాఖపట్టణము, శ్రీకాకుళం జిల్లాలయందు సాలువేరకు పనికివచ్చు మెట్టసేద్యమునకు అనుగుణ్యమైన వంగడము. తెల్లవోడి యగుటచే మొక్కయందెచటను ఊదారంగుండను. ముద్దవెన్ను. గింజలు పెద్దవి. రాలిక 1200-1500 పౌనులు.

#### (4) అభివృద్ధికర కొట్ట వంగడములు

1. హెచ్. 1 కొర్ర: ఇది హగరి వ్యవసాయ తరీఖోధన కేంద్రమునందు 'హచ్చుకొర్ర' రకమునుండి ఎంచి తీయబడినది. అనంతపురం జిల్లాలోని తేలిక కృష్ణరేవడి భూములకు, ఎర్రనేలలకు అనుకూలమైనది. బాగుగ దుబ్బుచేయును. కాలపరిమితి 100 రోజులు. వెన్ను సన్నముగా పొడవుగానుండును. వెన్ను మొదటనుండి చివరవరకు ఒకేమాదిరి చిక్కగానుండి కొన మొనదేరి యుండును. గింజలు లేబసిమిరంగు కలిగి యుండును. రాలిక 400-800 పౌనులు.
2. హెచ్. 2 కొర్ర: ఇది కూడ హగరి క్షేత్రమునందు 'బోడికొర్ర' రకమునుండి వీర్చి తీయబడినది. ఆలూరు, ఆదోని, ఉరవకొండ, పత్తికొండ, గుత్తి, తాడిపత్రి తాలూకాలలోని కృష్ణరేవడి భూములకు అనుకూలమైనది. బాగుగా దుబ్బుచేయును. కాలపరిమితి 90-95 రోజులు. వెన్ను సన్నముగానుండి పొడవుగానుండును. వెన్నులు మొదటనుండి చిక్కగానుండి చివరకు పోయిన కొలది మరింత చిక్కగా నుండుటవలన చేతికి గట్టిగా నుండును. గింజలు లేబసిమిరంగు కలిగి యుండును. రాలిక 400-500 పౌనులు.
3. యన్. 1 కొర్ర: ఇది సంజ్యాల వ్యవసాయ తరీఖోధన స్థానమునందు 'సేనకొర్ర' రకమునుండి వీర్చి తీయబడినది. కర్నూలు, కడప జిల్లాలయందు అన్ని రకములనేలలకు అనుకూలమయినది. వెన్ను పొడవుగ



సన్నముగానుండి కొన్ని వంగదేరియునును, విరివిగా దుబ్బుచేయును. ఈవంగడము మాగాణిభూమిలకుండు నిజీరసతితో స్త్రీలచేయుటకు చాల అనుకూలమయినదని గ్రహించు వ్యవసాయవశోధన స్థానము నందు జరిపిన పరీక్షలమూలముగ తేలిగదని గింజలు లేనిసిమిరంగు. రాశిక 100—500 పౌనులు.

4. జి. 1 కొర్ర: ఇది గుంటూరు (లాం) వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానమునందు 'బొచ్చుకొర్ర' గింజనుండి ఎంచు తీయబడినది. గుంటూరు, నర్సరావుపేట, సత్తెనపల్లి, పల్నాడు, వినుకొండతాలూకాలకు అనుకూలమయినది. బాగుగా దుబ్బుచేయును. కాలపరిమితి 100—105 రోజులు. వెన్ను గొడవుగ సన్నముగనుండి చిక్కగుండును. రోమములు వెన్నుంతట పొడవుగ నుండును. గింజలు లేనిసిమిరంగు. రాశిక 500—600 పౌనులు.

### (5) అభివృద్ధికర వరిగ పంగడములు

- వి. 27 వి. 94: ఇవి ఒంగోలు ప్రాంతీయ చిరుధాన్య పరిశోధన స్థానమునందు దేశవాళీరకమునుండి ఎంచితీయబడినవి. గుంటూరుజిల్లాలో గుంటూరు, వినుకొండ, నర్సరావుపేట, పల్నాడు, సత్తెనపల్లితాలూకాలలో జరిగిన పరీక్షలలో స్థానికరకములకన్న అధిక పంటనిచ్చినవి. కాలపరిమితి 80 రోజులు. విరివిగా దుబ్బుచేయును. రాశిక 800—1000 పౌనులు;

## 2 వ య ను బంధము

A. చిరుధాన్యముల సంఘట్టనమును దెలుపు పట్టిక.

చిరుధాన్య జాతి	తే మ	ఖనిజ జము	మాంస కృత్తు లు	చ ము రు	నార పదార్థము	కర్బు నోదజని తములు	పో షక శక్తి*
జొన్నలు A <sup>23</sup>	11.88	1.76	10.42	1.98	—	73.99	101
„ B <sup>24</sup>	10.71	2.05	9.71	3.69	1.54	72.38	105
„ C <sup>1</sup>	9.96	2.87	7.66	3.40	2.24	74.44	105
„ D <sup>25</sup>	12.50	1.70	9.30	3.00	2.20	72.30	100
„ E <sup>35</sup>	11.70	2.10	8.10	3.30	1.40	73.40	102
సగటు	11.85	2.10	9.04	2.86	1.85	73.30	103
గొర్రెలు A <sup>23</sup>	12.41	2.65	11.59	4.99	1.22	67.14	104
„ B <sup>24</sup>	8.77	2.08	9.52	5.33	0.78	73.52	109
„ C <sup>55</sup>	8.00	1.80	10.00	5.40	0.60	74.20	109
సగటు	9.73	2.18	10.37	5.24	0.87	71.62	107
వొళ్ళు A <sup>23</sup>	13.05	2.24	7.10	1.29	—	76.32	98
„ B <sup>24</sup>	11.29	7.45	9.44	4.93	6.56	60.13	99
„ C <sup>54</sup>	12.70	1.52	7.14	1.22	5.68	71.08	98
„ D <sup>55</sup>	9.40	8.00	5.50	1.40	2.50	78.20	98
సగటు	11.61	3.55	7.27	2.21	4.71	71.41	98
కొర్రెలు A <sup>23</sup>	11.28	3.24	12.31	4.65	7.95	60.62	95
„ B <sup>54</sup>	10.02	3.95	11.25	4.32	5.99	65.29	98
సగటు	10.63	3.50	11.78	4.49	6.97	62.96	97
అరికలు A <sup>23</sup>	12.87	2.92	8.31	1.37	8.97	65.66	90
„ B <sup>24</sup>	8.84	4.95	8.04	4.57	7.39	65.20	95
„ C <sup>54</sup>	8.01	4.29	6.25	3.36	8.47	70.86	96
సగటు	9.91	4.39	7.58	3.10	8.28	67.24	94

\* జొన్నకు కాలరీలు (Calories)

చిరుధాన్య జాతి	తే మ	ఖని జము లు	మంస కృత్తులు లు	చ ము రు	నాగ పదా ర్థము	కర్ష నోదజని తములు	పో మక శక్తి
చామలు A <sup>23</sup>	11.46	4.83	7.70	4.71	7.60	63.76	93
,, B <sup>55</sup>	10.20	3.50	9.10	3.60	4.60	69.10	98
సగటు	10.83	4.17	8.40	4.16	6.10	66.43	96
వరిగలు A <sup>23</sup>	11.85	3.39	12.40	1.06	2.16	69.05	95
,, B <sup>54</sup>	8.84	5.95	8.46	4.57	7.39	65.20	95
సగటు	10.35	4.67	10.48	2.82	4.78	67.13	95
జొదలు A <sup>23</sup>	11.87	4.44	6.22	2.28	9.83	65.41	87
,, B <sup>54</sup>	7.92	5.83	7.06	4.39	7.44	67.56	96
,, C <sup>55</sup>	12.00	1.90	8.40	3.00	2.20	72.50	99
సగటు	10.60	4.06	7.23	3.21	6.49	68.49	94
పెడరు							
బియ్యము <sup>55</sup>	13.50	1.40	10.80	0.60	2.10	71.60	98
గోధుమలు <sup>23</sup>	12.27	1.49	11.77	1.45	1.20	71.30	98
వరిబియ్యము <sup>43</sup>							
రకములసగటు	10.00	1.80	7.65	1.01	0.33	79.98	100

## B. కొన్ని చిరుధాన్యములందలి ఖనిజద్రవ్యములను

విటమినుల యొక్కయు పరిమితిని దెలుపు పట్టిక<sup>23</sup>

చిరుధాన్య జాతి	ఖటికము నూటికి	స్ఫురము నూటికి	ఇసుము లక్షకు	విటమినులు		
				A*	B <sub>1</sub> *	B <sub>2</sub>
1. జొన్న	.027	.282	6.18	136	?	స్వల్పము
2. గంటెలు	.049	.352	8.84	220	110	„
3. చోళ్ళు	.334	.272	5.38	70	?	?
4. కొర్రలు	.026	.237	6.25	?	195	?
5. అరికలు	.054	.315	5.34	108	230	+
6. చామలు	.015	.364	7.08	అ.స్వ	?	స్వ
7. వరిగలు	.014	.338	5.72	?	?	?
8. ఊదలు	.019	.282	2.86	?	?	?
9. గోధుమలు	.054	.315	5.34	108	230	+
10. దంపుడు బియ్యము	.007	.165	2.22	—	100	అ.స్వ

మ.రా: చిరుధాన్యపుగింజలలో విటమిను C యుండదు. కాని దానిని మొలక కట్టుచో నీ విటమిను స్వల్పముగ జనించును.

\* అంతర్జాతీయపు ఒంట్లు.

+ ఈగుర్తు ఈ విటమిను కొంచెము గలదని నూచించును.

## C. చిరుధాన్యజాతుల దంటయొక్క సంఘట్టనమును

## దెలుపు పట్టిక

	తే	ఖనిజ	మాంస	చ	కర్బనోద	నార
	మ	ద్రవ్య	కృత్తు	ము	జనిత	పదార్థ
		ములు	లు	రు	ములు	ములు
1. జొన్న ౨౫	9.70	8.24	2.10	1.50	39.67	39.79
2. గంటె ౨౫	7.07	7.08	1.90	1.33	43.99	37.63
3. చొడి ౨౫	14.16	5.24	1.94	0.62	49.11	28.93
,, ౫౦	9.28	12.10	2.19	2.39	45.24	28.12
4. ఆకి ౨౫	8.71	10.05	1.97	2.51	47.92	28.84

### 3 వ అనుబంధము

చిరుధాన్యజాతులు వగైరాలను గురించిన సారస్వతము

1 Hand-book of Indian Agriculture, by N. G. Mukherji

2 The great Millet or Sorghum in Madras, by C. Benson and C. K. Subbarao - Bulletin No. 55 of the Madras Agri. Dept., Old series

3 Chudamani Nighantu - in Tamil

4 Area and yield of Principal crops in India - Published by the Department of Commercial Intelligence and Statistics, India

5 Season and Crop reports, Madras

6 Root Development of Crops - by J. E. Weaver

7 Variability of Indian Sorghums - by G. N. Rangasami Ayengar and others - Indian Journal of Agricultural Science Vol. XII - Part IV

8 Sorghum - the Great Millet, by G. N. Rangasami Ayengar. The Madras Agricultural Journal Vol. XX—1

9 Mendelian Characters in Sorghum, by V. Ramanadha Ayer - The Madras Agricultural Journal, Jan. 1924

10 Intensive Farming in India, by John Kenny

11 Rotation and mixed Crops with Chollam, by G. N. Rangasami Ayengar—The Madras Agri. Jour. Vol XXIX—2

12 The Deleterious after-effects of Sorghum, by K. K. Nambiar - The Madras Agri. Jour. Vol. XXX—9

13 Results of Dry - farming Experiments on the Hagari Agricultural Research Station

14 Results of experiments on the Nandyal Agri. Res. Station

15 Germination tests of Sorghum seed, by G. N. Rangasami Ayyengar. The Madras Agri. Jour., Vol. XXIII—5

16 Entomology of the Sorghum plant in S. India by T. V. Ramakrishna Ayyer. Madras Agri. Jour., Vol. XX—1

17 The Chollam mite, by M. C. Chertan. Madras Agri. Jour. Vol. XXI—1

18 Sorghum diseases in South India, by S. Sundararama Ayyer. Madras Agri. Jour. Vol. 20-2

19 Striga Research in Bombay. Indian Farming Dec. 1940

20 Insect pests of stored agricultural produce and their control, by T. V. Ramakrishna Ayyer. Madras Agri. Jour. Vol. 22—5

21 The Making of Chollam, - Leaflet No. 4 Madras Agri. Dept.

22 Home made malt food - Leaflet No. 5 Madras Agri. Dept.

23 Health Bulletin No. 24 - Govt. of India

24 Agricultural facts and figures, by R. C. Wood

25 Dictionary of Economic Products by Watt

26 Groundnut Oil - cake as manure and cattle feed, by C. M. John-Madras Agri. Jour., Vol. 29-5

27 Juiciness and sweetness in Sorghum stalks, by G. N. Rangasami Ayyengar - Madras Agri. Jour. 23-9

28 Development of pussic acid in chollam, by C. N. Acharya - Indian Jour. of Agri. Science, Vol. III-3

29 Farmer's Bulletin No. 16, U. S. A.

30 Flora of South India, by Gamble

31 Studies in Pennesetum, by G. N. Rangasami Ayyangar - Indian Journal of Agricultural Science, Vol. II-3, and Vol. III-4

32 Brisled cumboo, by (Do. Do.) Madras Agri., Jour. Vol. 24-3

33 Maintenance of the purity of Cumboo seed, by M. A. Balakrishna Ayer. Madras Agri. Jour., Vol. 30-10

34 చమురుగింజలు, ఇతర చమురు దినుసులు - గోపేటి జోగిరాజు

35 Longevity of crop seeds, by K. M. Sonavne - Agri. Jour. of India, Vol. 23-4

36 Commercial Products of India, by Watt

37 Inheritance of characters in Ragi, by G. N. Rangasami Ayyangar, Madras Agri. Jour. Vol. XX-1

38 Bulletin No. 27, Madras Agri. Department

39 Notes on Ragi fermentation - Source not traceable

40 Ragi stored in underground pits, by J. Narasimhan - of the Mysore Agri. and Experimental Union Vol X-P. 107

41 వస్తుగుణప్రకాశిక - వీటూరి వాసుదేవకృష్ణ

42 Millets of the Genus, Setaria - Memoirs of the Imp. Agri. Res. Institute, Pusa, Botanical Series, Vol. IV-1

43 Recent work on the Genetics of Millets in India, by G. N. Rangasami Ayyangar - Madras Agri. Jour. Vol. 22-1



44 Inheritance in the height of the plant in the Italian millet, by Do. Madras Agri. Jour. Vol. xxv-5

45 The Kodo Millet by Do. Do. Vol. xxii-12

46 Kodo smut - Bull-tin No. 201, Imp. Agri. Res. Institute, Pusa

47 Samai, the Little Millet, by G. N. Rangasamy Ayyangar and others - Madras Agri. Jour. Vol. 29-12

48 Studies in the Millet, Panicum Miliaceum, by G. N. Rangasami Ayyangar-Madras Agri. Jour. Vol. 26-5

49 Origin of Cultivated plants in India - De Candolle

50 Studies in Barn yard millet, by G. N. Rangasami Ayyangar - Madras Agri. Jour. Vol. xxx-1

51 A new Millet, Brachiaria ramosa-by K. C. Jacob - Madras Agri. Jour. Vol. 31-1

52 Common water and marsh plants of India and Burma - Health Bulletin No. 28, Govt. of India

53 Adlay (*Coix lacryma jobi*), H. A. Puris-Tropical Agriculturist, Vol. 89-3

54 Dr. Leather's analyses

55 Food Grains of India - Church

56 Influence of Rainfall on fields of Millets in different Regions of Annual Precipitation by B. L. Narasimhamurty, A. A. J. May 1955





## STATE CENTRAL LIBRARY, HYDERABAD

# DUE DATE SLIP

This book should be returned on or before the date marked below. In case of delay an overdue charge of 5 PAISE per day per book will be collected.

Please keep the book clean. Do not tear up or stain the leaves nor make pencil marks upon them.